



مرکز آموزشی درمانی ایزدی

برنامه مرآبینی بیمار بعد از ترخیص

نام: نام خانوادگی: نام پدر: شماره پرونده: بخش: تاریخ بسترسی: تاریخ ترخیص: نام پزشک معالج:

شاپتیرین علت زایمان زودرس عفونت ادراری است، بنابراین مراقبت کامل انجام شود.

مفهوم مصرف داروهای تمپوری شده: ۱. شیاف و داروهای پروژسترونی و ایندوموتاسین توسط پزشک تجویز می‌شود و با کاهش قابل توجه تولدهای زیر^{۳۴} همراه می‌باشد حتی استفاده شود. ۲. ادامه آنتی بیوتیک خوارکی طبق دستورالعمل . ۳. در کسانی که سقط‌های مکرر دارند و یا طول سرویکس آنها کوتاه می‌باشد؛ طبق دستورالعمل انجام سرکلاز، که باعث جلوگیری از زایمان زودرس می‌شود.

بدون مشورت با پزشک فود، مصرف داروها را کاهش یا افزایش ندهید.

تغذیه: خوردن مایعات فراوان و غذاهای معمولی. از کشیدن سیگار و خوردن قهوه زیاد جلوگیری کنید چون باعث زایمان زودرس می‌شود. از مکمل‌های دوران بارداری طبق دستورالعمل استفاده کنید. کمبود ویتامین C باعث زایمان زودرس می‌شود، بنابراین از مركبات مانند: پرتقال، لیمو، نارنگی استفاده شود.

مراقبتهای بعداز ترخیص: بعد از نظر درد، پارگی کیسه آب، علائم عفونت ادراری و عفونت داخل رحمی باید مراقب باشید و بهداشت را رعایت کنید. از نظر عوامل روحی مانند: اضطراب و استرس که باید از خود دور کنید، چون در غیر اینصورت باعث زایمان زودرس می‌شود.

موارد پیگیری: در صورت انقباضات پشت سرهم و منظم، به طوری که ۲۰ دقیقه با درد و یا بدون درد، علائمی همچون احساس فشار در لگن، دردهای شبیه درد قاعده‌گی ، ترشح آبکی از واژن، و درد کمر حتماً مراجعه کنید.

فعالیت (وازان): شرایط کار دشوار و طولانی باعث زایمان زودرس می‌شود، بنابراین پس از بهبودی تان فعالیت روزانه نیز باید به حداقل برسد.

استحمام : هر روز استحمام کنند، مانع ندارد.

استراحت: استراحت کافی داشته باشید. سر پا ایستادن زیاد و یا راه رفتن به مدت طولانی باعث زایمان زودرس می‌شود و استراحت در بستر داشته باشید. این درمان یکی از مداخلاتی است که در طی بارداری تجویز می‌شود، و در این مدت برای جلوگیری از اختلالات ترمبوامبولی در بستر پاها و دستها را مرتباً حرکت دهید.

و (زیل): پس از بهبودی کامل و با اجازه پزشک خود در حد معمولی ورزش اشکال ندارد و می‌تواند ورزش‌های دوران بارداری را داشته باشد.

مسافرت: در صورت نداشتن آبریزش و یا درد و با اجازه پزشک می‌توانید مسافرت داشته باشید.

فعالیت جنسی: پس از بهبودی کامل و با اجازه پزشک می‌توانید در حد معمولی فعالیت جنسی داشته باشید.

جواب آزمایشات

خلاصه پرونده

مدارک تحويلی به بیمار: جواب سونوگرافی

مراجهه بعدی: طبق روتین بارداری، و پس از قطع داروها. ولی اگر درد و یا آبریزش و یا خونریزی پیدا کردید حتماً در اسرع وقت مراجعه نمایید.