

مسمومیت با	آنتی دوت
سموم قلبی (بی حس کننده های موضعی؛ بتابلاکرها؛ مسدودکننده های کانال کلسیم) در بخش NICU و نوزادان می باشد	امولسیون های چرب (مثل اینترالیپید)
مسدود کننده کانال کلسیم؛ سولفات منیزیم؛ هیپروکالمی؛ هیپوکالمی	کلسیم گلوکونات
منوکسید کربن؛ سیانید و هیپوکسمی	اکسیژن
مسمومیت هائی که سبب برادیکاردی می شود مثل بتابلوکرها؛ مسدود کننده کانال کلسیم؛ دیگوکسین	آتروپین
کنترل واکنش های اکستراپیرامیدال ناشی از فنوتیازین ها؛ هالوپریدول و متوکلوپرامید	بی پریدین
نور ترپیتیلین؛ فنوتیازین ها؛ پروکائین آمید؛ فنوباربیتال؛ هیپروکالمی	سدیم بی کربنات
داروهای دپرسان قلب که سبب هایپوتانسیون میشود (مسدود کننده کانال کلسیم)	اپی نفرین
بنزودیازپین ها (دیازپام و ...)	در اتاق عمل می باشد
آتروپین؛ آنتی هیستا مین ها و آنتی کولینرژیک	در اتاق عمل می باشد
نارکوتیک ها؛ اختلال هوشیاری بدون علت شناخته شده	نالوکسان
پتاسیم	انسولین
فنوتیازین (اسکازینا)	دیفن هیدرامین
استامینوفن	در بخش NICU و نوزادان می باشد
هیپارین	در اتاق عمل می باشد
وارفارین؛ کومارین	پروتامین سولفات
اسید فولیک	ویتامین K
هیپوگلیسمی و انسولین	گلوکز هیپرو تونیک
متوترکسات	در بخش تحت نظر می باشد
آتروپین	لوکوپورین
کمیته دارو و درمان	ایندرال

