



Contents

۷.....	مقدمه
۸.....	آب مقطر
۹.....	آتروپین سولفات
۱۰.....	آتنولول
۱۱.....	آ - ث - آ
۱۲.....	آدنوزین
۱۳.....	آزیترومایسین
۱۴.....	آسکلوویر
۱۵.....	آلبومین
۱۶.....	آمپی سیلین
۱۷.....	آملودیپین
۱۸.....	آموکسی سیلین
۱۹.....	آمیکاسین
۲۰.....	آمینوفیلین
۲۱.....	آمیودارون
۲۲.....	آنتی دی ایمونوگلوبولین
۲۳.....	آپوهگزول
۲۵.....	استامینوفن
۲۶.....	استامینوفن کدینه
۲۷.....	استیل سالیسیلیک اسید = ASA
۲۸.....	استیل سیستن
۲۹.....	اسید آسکوربیک - ویتامین C
۳۰.....	اسید فولیک



- ۳۱..... انسولین
- ۳۳..... اپی نفرین
- ۳۴..... اریتروماسین
- ۳۵..... استرادیول والرات
- ۳۶..... استروژن کونژوگه
- ۳۷..... انوکسپارین
- ۳۸..... اکسازپام
- ۳۹..... اکسی توسین
- ۴۱..... امپرازول
- ۴۲..... اندانسترون
- ۴۳..... ایپوروفن
- ۴۴..... ایمی پنم
- ۴۵..... ایمونوگلوبولین یا IVIG
- ۴۷..... ایمونوگلوبولین ضد هپاتیت ب=HBIG
- ۴۸..... ایندومتاسین
- ۴۹..... بتامتازون
- ۵۰..... بتاهیستین
- ۵۱..... بیپریدین
- ۵۲..... بیز اکودیل
- ۵۳..... پاراستامول
- ۵۴..... پانتوپرازول
- ۵۵..... پتاسیم کلراید
- ۵۶..... پتیدین
- ۵۷..... پروپرانولول



- ۵۸..... پروتامین سولفات PROTAMINE SULFATE
- ۶۰..... پروژسترون
- ۶۱..... پرومتازین
- ۶۲..... پرویدون آیداین
- ۶۳..... پیراسیلین
- ۶۴..... تتراسیکلین
- ۶۵..... ترانگزامیک اسید (ترنسید)
- ۶۷..... تریامترن اچ
- ۶۸..... تری فلنوپرازین دی هیدروکلراید
- ۶۹..... جنتامایسین
- ۷۰..... داکسی سایکلین
- ۷۲..... دایمتیکون
- ۷۳..... دکستروز
- ۷۴..... دگزامتازون
- ۷۵..... دوبوتامین
- ۷۶..... دوپامین
- ۷۷..... دیازپام
- ۷۸..... دیازوکساید
- ۷۹..... دی سیکلومین
- ۸۰..... دیفن هیدرامین
- ۸۱..... دیکلوفناک سدیم
- ۸۲..... دیگوکسین
- ۸۳..... رانیتیدین
- ۸۴..... روغن کرچک



- ۸۵..... سالبوتامول
- ۸۶..... سدیم بیکربنات
- ۸۷..... سدیم کلراید
- ۸۹..... سرم رینگر و رینگلاکتات
- ۹۰..... سرم قندی نمکی
- ۹۱..... سرم ۱/۴ و ۲/۴
- ۹۲..... سفازولین
- ۹۳..... سفالکسین
- ۹۴..... سفتازیدیم
- ۹۵..... سفتریاکسون
- ۹۶..... سفیکسیم
- ۹۷..... سولفات منیزیم
- ۹۸..... سولفاستامید (چشمی)
- ۹۹..... سیپروفلوکساسین
- ۱۰۰..... فروس سولفات
- ۱۰۱..... فنازوپریدین
- ۱۰۲..... فلومازینیل
- ۱۰۳..... فنوباربیتال
- ۱۰۴..... فنی تونین
- ۱۰۵..... فورسماید
- ۱۰۶..... فیبری نوژن
- ۱۰۷..... کابتوپریل
- ۱۰۸..... کتورولاک
- ۱۰۹..... کلرپرومازین



- ۱۱۰ کلردiazپوکساید
- ۱۱۱..... کلرفنیرآمین مالنات
- ۱۱۲ کلسیم گلوکونات
- ۱۱۳..... کلوتریمازول
- ۱۱۴..... کلیندا مایسین
- ۱۱۵..... کلوگزاسیلین سدیم
- ۱۱۶..... کنتراسپتیو ORAL CONTRACEPTIVE PILL , OCP
- ۱۱۷..... کوتریموکسازول
- ۱۱۸..... لابتالول
- ۱۱۹..... لوبریکانت
- ۱۲۰..... لوزارتان
- ۱۲۱..... لوکوورین
- ۱۲۲..... لیدوکائین هیدروکلراید
- ۱۲۳..... متفورمین
- ۱۲۴..... مترونیدازول
- ۱۲۵..... متوپرولول
- ۱۲۶..... متوکلوپرامید
- ۱۲۷..... متیل ارگونوین مالنات
- ۱۲۸..... متیل دوپا
- ۱۲۹..... مروپنم
- ۱۳۰..... مژستروول
- ۱۳۱..... مفنایمیک اسید
- ۱۳۲..... مگلو مین کامپاند
- ۱۳۴..... منیزیم هیدروکساید



- ۱۳۵..... مولتی ویتامین
- ۱۳۶..... میدان ولام DORMTCOM
- ۱۳۷..... میزو پروستول (پروستاگلاندین E2)
- ۱۴۰..... ناپروکسن
- ۱۴۱..... نالوکسان
- ۱۴۲..... نوافن
- ۱۴۳..... نورتریپتیلین
- ۱۴۴..... نیتروگلیسرین
- ۱۴۶..... ننوستیگمین
- ۱۴۷..... وارفارین
- ۱۴۸..... والپروات سدیم
- ۱۴۹..... وانکوماسین
- ۱۵۰..... وراپامیل
- ۱۵۱..... ویتامین ب ۶
- ۱۵۲..... ویتامین ب کمپلکس
- ۱۵۳..... ویتامین K۱
- ۱۵۴..... هالوپریدول
- ۱۵۵..... هپارین سدیم
- ۱۵۶..... هیدرالازین
- ۱۵۷..... هیدروکلروتیازید
- ۱۵۸..... هیدروکورتیزون یا کورتیزول
- ۱۵۹..... هیوسین ان بوتیل بروماید
- ۱۶۰..... منابع و مآخذ:



مقدمه

یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین مؤلفه ها در درمان بیماریها، داروست که در مورد بیماران بستری این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می کند.

اجرای دستورات دارویی نوشته شده پزشکان برای بیماران یکی از وظایف مهم پرستاران شاغل در بخش های درمانی است که با توجه به طیف وسیع داروها، داشتن آگاهی و اطلاعات فارماکولوژیکی و کلینیکی تمامی داروها کاری بس دشوار است. با توجه به سیاست گذاری های وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در زمینه مدیریت بخش دارویی بیمارستانها و مراکز آموزشی درمانی، کمیت دارو و درمان در بیمارستانها مسئول تدوین دارونامه بیمارستان و انتخاب داروهای مؤثر - ایمن و با کیفیت بالا و با قیمت مناسب؛ هم چنین بروز رسانی دارونامه مذکور است.

مجموعه حاضر لیستی از داروهایی است که در مرکز آموزشی درمانی ایزدی مورد استفاده هستند و سعی شده به اختصار توضیحات کاربردی و قابل استفاده برای هر کدام از داروها در زمینه موارد مصرف و عوارض ناخواسته دارو ذکر گردد.

قطعاً در صورت نیاز به بازنگری و یا افزایش داروهای جدید به این مجموعه، بر اساس فرآیند پیش بینی شده در دستورالعمل های کمیته دارو و درمان بیمارستان، اقدام خواهد شد.

در تهیه این مجموعه از سرکارخانم دکتر میرزائی؛ جناب آقای دکتر شریفی؛ دفتر پرستاری به خصوص مترون محترم سرکار خانم مسروری و خانم مریم بیدگلی کمال تقدیر و تشکر به عمل می آید.

آقای دکتر غفاری (مدیریت دارویی مرکز ایزدی)



آب مقطر

گروه دارویی: حلال

گروه درمانی: حلال

شکل دارویی: تزریقی

فارماکولوژی: آب مقطر عاری از مواد پیروژن می باشد که برای تهیه محلول های قابل تزریق بکار می رود.

موارد مصرف: حلال جهت تزریق

شرایط نگهداری: در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری گردد.



آتروپین سولفات

نام تجاری: Atropin

گروه دارویی: گروه آنتی کولینرژیک ها

گروه درمانی: ضد برادیکاری و آریتمی و ضد مسمومیت ، ضد مواد سمی ارگانو فسفره (حشره کش ها)

شکل دارویی: قرص و آمپول و قطره چشمی

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: کم کاری قلبی (برادیکاری) و بلوک قلبی و مهار رفلکس واگ (تحریک ناحیه گلو که باعث استفراغ می شود)

میزان مصرف: قبل از عمل ۰.۵ تا ۱ میلی گرم از راه وریدی تزریق می شود و هر ۵ دقیقه حداکثر ۲ میلی گرم تزریق شود. مصرف کمتر از ۰.۵/ میلی گرم موجب برادیکاردی میشود

موارد منع مصرف: حساسیت شدید ، خونریزی حاد ، آب سیاه چشم و در موارد نارسایی کبدی ، کلیوی و قلبی با احتیاط مصرف شود.

عوارض جانبی: خشکی دهان ، تشنگی ، یبوست ، احتباس ادرار ، سر درد و تپش قلب ؛برادیکاردی

توجهات: علائم حیاتی مثل تعداد ضربان قلب و فشار خون را باید کنترل کنید .
*در سالمندان باید میزان کمتری تجویز شود.

آموزش: در صورت علائم خشکی دهان غر غره آب و مصرف آدامس مفید است.

شرایط نگهداری: دارو در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.



آتنولول

نام تجاری: Tenormin

گروه دارویی: مسدود کننده گیرنده های بتا آدرنرژیک

گروه درمانی: ضد آنژین صدری - ضدهیپرتانسیون

شکل دارویی: قرص ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرمی

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: فشار خون (هیپرتانسیون) - دردهای قفسه سینه با منشأ قلبی (آنژین)

موارد منع مصرف: شوک کاردیو ژنتیک (قلبی)، نارسایی قلبی، حساسیت مفرط، برادیکاردی

سینوسی

عوارض جانبی: ضعف عمومی، راش و ضایعات پوستی، ناتوانی جنسی، خشکی چشم ها، اسهال؛

هایپوگلیسمی؛ برونکواسپاسم؛ افت شدید فشارخون، کاهش نبض، سرد شدن انتهای بدن،

بی خوابی، خستگی، گیجی، تهوع، گلودرد، تنگی نفس و خس خس سینه.

توجهات: *در هوای سرد لباس گرم تر بپوشید، چرا که آتنولول ممکن است شما را به سرما حساس تر کند. *از وضعیت خوابیده به نشسته یا ایستاده و یا از حالت نشسته به ایستاده آرام تغییر وضعیت دهید تا دچار سرگیجه، سیاهی رفتن چشم یا غش نشوید. *به مصرف کنندگان این دارو توصیه می شود فشارخون خود را هر شش ساعت کنترل کنند و به کیفیت نبض نیز دقت کنند و در صورت کاهش نبض به کمتر از ۶۰ ضربه، پزشک خانواده تان را مطلع کنید.

*قرص آتنولول پیش از غذا یا در هنگام خواب به صورت خرد شده یا سالم مصرف می شود.

*نکته مهمی که باید درباره این دارو به خاطر بسپارید این است که از قطع ناگهانی دارو خودداری کنید و در صورت نیاز در مدت دو هفته مقدار دارو را به تدریج کاهش دهید.

شرایط نگهداری: دارو در ظروف در بسته و دمای معمولی ۱۵ تا ۳۰ درجه نگهداری شود.



آ - ث - آ

نامتجاری : Excedrin

گروه دارویی: ترکیب استامینوفن + A.S.A + کافئین

گروه درمانی: ضددرد , ضدتب و ضد التهاب

شکل دارویی: قرص

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: دردهای خفیف , تامتوسط , تب

موارد منع مصرف: زخمهای گوارشی , آسم , بیماریهای خونریزی دهنده , فشارخون بالا ,
ونارسایی کلیه و کبد

عوارض جانبی: ناراحتی گوارشی , تهوع و استفراغ , - مهمترین عارضه آسیب کلیوی است

توجهات: *توصیه به مصرف شیر یا آب با دارو

*باداروهای ضد اسید معده مصرف شود

* به دلیل خطر آریتمی زائی کافئین تا ۶ هفته بعد از انفارکتوس میوکارد تجویز و مصرف نشود .

*در صورتیکه دارو بوی سرکه داشته باشد از مصرف آن خودداری کنید.

شرایط نگهداری: در جای خشک نگهداری شود.



آدنوزین

نام تجاری: Adenocard

گروه دارویی: نوکلئوزید

گروه درمانی: ضد آریتمی

شکل دارویی: تزریقی (آمپول)

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: حملات تکیکاردی قلبی (PAT)

میزان مصرف: میزان مصرف اولیه ۶ میلی گرم یک جا و سریع طی ۱ تا ۲ دقیقه و در صورت لزوم تکرار شود.

موارد منع مصرف: حساسیت مفرط، بلوک قلبی درجه ۲ و ۳ و بیماری سینوس بیمار، در مورد بیماران آسمی با احتیاط مصرف شود.

عوارض جانبی: تاری دید، سرگیجه، درد قفسه سینه، و مهمترین عارضه آریتمی قلبی می باشد.

توجهات: *وضعیت بیمار باید تحت مانیتورینگ کنترل شود، *دارو باید بیرنگ و شفاف باشد، *محلول آدنوزین باید فاقد بلور باشد، *این دارو فاقد ماده نگهدارنده است و مانده آن باید دور ریخته شود.

آموزش:

*نوشیدن قهوه بعد از مصرف دارو مفید نیست .
*در صورت بروز درد سینه به پزشک مراجعه شود، پس از مصرف دارو برافروختگی صورت بروز میکند، حملات برونکو اسپاسم ممکن است بروز کند.

شرایط نگهداری: از یخ زدن جلوگیری شود و در زمان مصرف باید در حرارت ۱۵ تا ۳۰ درجه نگهداری شود.



آزیترومایسین

نام تجاری: Zithromax

گروه دارویی: ماکرولید آزاد

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

شکل دارویی: قرص، کپسول 250 و 500mg، سوسپانسیون 100mg/5ml و 200mg/5ml

موارد مصرف: یک آنتی بیوتیک است که برای گلودرد استرپتوکوکی - برونشیت - برخی انواع پنومونی و عفونت های کلامیدیایی مصرف می شود.

عوارض جانبی: اسهال، دردهای شکمی، تهوع و استفراغ، زخمهای دهانی یا زبان، خارش یا ترشح واژن، پلاک های سفید در دهان یا روی زبان، تب و درد مفصلی.

موارد احتیاط: *در صورت سابقه حساسیت به آزیترومایسین، اریترومایسین یا آنتی بیوتیک های دیگر پزشک را مطلع سازید.

*مصرف داروهای دیگر به ویژه کاربامازپین، سیکلوپیرین، ضد انعقادها (رقیق کنند های خون مثل وارفارین)؛ تئوفیلین و آنتی اسیدهای حاوی آلومینیم/ منیزیم، سابقه بیماری کبدی پزشک را مطلع سازید.

*این دارو بهتر است با شکم خالی مصرف شود. (حداقل یک ساعت قبل یا ۲ ساعت بعد از غذا خورده شود).

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.



آسیکلوویر

نام تجاری : Zovirax- avirax

گروه دارویی : نوکلئوزید پورین صناعی

گروه درمانی: ضد ویروس‌ها

اشکال دارویی: قرص، پماد و آمپول

مصرف در دوران حاملگی: خوراکی گروه B - فرم تزریقی و چشمی گروه C

موارد مصرف: درمان تبخال و زونا؛ آبله مرغان؛ هرپس ژنیتال

عوارض جانبی: کما؛ تشنج؛ لکوپنی؛ ترومبوسیتوپنی؛ خونریزی؛ خستگی بیش از حد؛

توجهات :

* دریافت مایعات کافی به میزان ۲ لیتر روزانه از رسوب در کلیه‌ها جلوگیری می‌کند.

* به منظور پیشگیری از پخش شدن ضایعات آنها را لمس نکنید .

* حداقل طی یک ساعت انفوزیون شود.

* این دارو با فراورده‌های خونی (آلبومین)؛ محلولهای حاوی پروتئین و دوپامین؛ دوباتامین ناسازگار است .

* تزریق عضلانی ممنوع است .

* تزریق سریع یا بولوس دارو ممنوع است .

* مصرف دارو در شیردهی ممنوع است .

* فلبیت یا التهاب در محل تزریق از عوارض مهم و نسبتاً شایع آسیکلوویر تزریقی است .



آلبومین

نام تجاری : Albital – Albuman

گروه دارویی : مشتقات خونی.

گروه درمانی : بالا برنده حجم پلاسما

اشکال دارویی : ویال (100ml) 20% - 5% (50ml)

مصرف در دوران حاملگی : گروه C

موارد مصرف : شوک، هیپوپروتئینمی، سوختگی، کاهش آلبومین، درمان نفروز

موارد منع مصرف: این دارو در کم‌خونی شدید، نارسایی قلبی، زیادی حجم خون و خیز ریوی نباید مصرف شود.

عوارض جانبی: نارسایی احتقانی قلب، کاهش قابلیت انقباضی عضله قلب، خیزریوی و احتباس آب و املاح بامصرف این دارو گزارش شده است.

توجهات : *سرعت انفوزیون محلول حاوی آلبومین باید 1-2ml/min باشد.

*باوجود این، سرعت انفوزیون و حجم تام‌آلبومین مورد نیاز باید براساس پاسخ‌همودینامیک بیمار تعیین شود.

*محلول‌های حاوی آلبومین را می‌توان بدون درنظر گرفتن گروه خونی، به بیماران تزریق نمود.

*محلول حاوی آلبومین را می‌توان بدون رقیق نمودن مصرف نمود.



آمپی سیلین

نام تجاری: amcill

گروه دارویی: پنی سیلین ها (آمینوپنی سیلین ها)

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

شکل دارویی: کپسول ، شربت ، ویال تزریقی

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: عفونت های عمومی دستگاه تنفس ، سیستم ادراری ، عفونت پرده مغز (مننژیت)

میزان مصرف: روزانه ۱ تا ۴ گرم از راه خوراکی یا هر ۶ تا ۴ ساعت از راه عضلانی یا وریدی

موارد منع مصرف: حساسیت به پنی سیلین ها و عفونت مونو نوکلئوز

عوارض جانبی: اسهال ، اریتم (قرمزی) پوست ، مشکل خونی ، عارضه کلیوی و تشنج

توجهات: بهتر است محلول تزریقی آماده شده حداکثر طی یک ساعت تزریق شود.

*انفوزیون وریدی طی ۱۰ تا ۱۵ دقیقه صورت گیرد .

تزریق مستقیم وریدی سریع ممکن است منجر به حملات تشنجی گردد. با هر محلول حاوی

دکستروز از جمله محلول های تغذیه داخل وریدی ناسازگاری دارد.

آموزش: بیمار میبایست دوره درمان را کامل کند. بهتر است دارو با معده خالی با یک

لیوان آب مصرف شود. در صورت بروز آلرژی به پزشک اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: کپسول و ویال (محلول تزریقی) در دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه نگهداری

شود.



آملودیپین

نام تجاری: Norvasc

گروه دارویی: بلوک کننده کانال کلسیم

گروه درمانی: ضد آنژین ؛ ضد فشار خون ؛ وازودیلاتور غیر نیترا ته

شکل دارویی: قرص ۵ mg

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: کنترل هایپرتانسیون ، پروفیلاکسی آنژین صدری

موارد منع مصرف: حساسیت شناخته شده به آملودیپین ، ، تنگی پیشرفته آئورت ، نارسایی قلبی ،
اختلال عملکرد کبدی

عوارض جانبی: ادم محیطی ؛ سر گیجه ، سردرد ، گر گرفتگی ، هیپوتانسیون ، ، تهوع ، تاکیکاردی ،
طپش قلب ،

توجهات: *روزانه وزن - جذب و دفع و ادم را در پاها و ساق های پاکنترل کنید .

*هنگام تغییر وضعیت به آهستگی تغییر وضعیت دهید .



آموکسی سیلین

نام تجاری: Amoxil

گروه دارویی: آمینو پنی سیلین

گروه درمانی: آنتی بیوتیک بتا - لاکتام

شکل دارویی: کپسول، قرص، شربت، سوسپانسیون

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: گونوره؛ عفونت های سیستمیک؛ عفونت ادراری؛ عفونت های کلامیدیائی و مایکو پلاسمائی در طی حاملگی و آبسه حاد دندان؛ تورم دهانی؛ لنفادنوپاتی و تب

موارد منع مصرف: حساسیت به پنی سیلین هایا سفالوسپورین ها

عوارض جانبی: تهوع و استفراغ، اسهال و واکنش های حساسیتی است. نوع راش پوستی به شکل ماکولوپاپولر بوده و غیر آلرژیک می باشد و خاص آموکسی سیلین است.

توجهات: *در هنگام مصرف آموکسی سیلین از سایر روشهای جلوگیری از بارداری نیز باید استفاده نمود.

*در صورتی که یک نوبت مصرف دارو فراموش شود، به محض یاد آوردن آن نوبت باید مصرف شود، ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد، از مصرف آن نوبت خودداری کرده و مقدار مصرف بعدی نیز نباید دو برابر گردد.

*آموکسی سیلین را می توان با معده خالی یا پر مصرف کرد.

*بیمار میبایست دوره درمان را کامل کند.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود و سوسپانسیون تهیه شده در یخچال به مدت ۱۴ روز قابل مصرف میباشد.



آمیکاسین

نام تجاری: Amikin

گروه دارویی: آمینو گلیکوزیدها

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

شکل دارویی: آمپول ۱۰۰ و ۵۰۰ میلی گرمی

مصرف در دوران حاملگی: گروه D

موارد مصرف: عفونت های خطرناک دستگاه اداری ، استخوان ، پرده مغز و دستگاه تنفس

میزان مصرف: روزانه ۱۵ میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن از راه عضلانی یا انفوزیون وریدی با ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلی لیتر سرم دکستروز ۵٪ رقیق شده و در مدت ۳۰ تا ۶۰ ثانیه انفوزیون شود (سه بار در روز).

موارد منع مصرف: حساسیت به داروهای گروه آمینو گلیکوزید ها ولی در نا رسایی کلیه و وزوز گوش و کاهش شنوایی و مبتلایان به پارکینسون و کاهش کلسیم و کودکان و سالمندان با احتیاط مصرف شود.

عوارض جانبی: مشکل عضلانی و مهار تنفسی ، مشکلات شنوایی و نارسایی کلیه

توجهات: * مشکل و اختلال تنفسی ممکن است بروز نماید .

* در زمان تزریق ، محلول باید شفاف باشد .

* بیمار پس از دوره درمانی و حین آن از نظر کلیه و شنوایی آزمایش شود.

* هر دوز دارو حداقل در مدت ۶۰-۳۰ دقیقه انفوزیون شود و برای اطفال زمان انفوزیون رابه ۲-۱ ساعت افزایش دهید.

* محل تزریق دارو در هر بار تزریق باید عوض شود .

* از آنجاکه دفع آمینو گلیکوزیدها عمدتاً کلیوی است بیمار باید به اندازه کافی آب یا مایعات مصرف کند تا غلظت زیاد دارو موجب آسیب به مجاری ادراری نشود.

آموزش: در صورت هر گونه سرگیجه و اختلال شنوایی به پزشک اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: در دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه نگهداری شود.



آمینوفیلین

نام تجاری: Amoline

گروه دارویی: مشتقات گزانتین

گروه درمانی: باز کننده ریه (برونش) ، ضد آسم

شکل دارویی: آمپول ۲۵۰mg/10ml

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: آسم ، تنگی راههای هوایی ، نارسایی احتقانی قلب و توقف تنفسی (آپنه) نوزادان.

میزان مصرف: افراد بالغ یک میلی گرم به ازای هر کیلوگرم و در سالمندان ۰.۶ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم به صورت انفوزیون وریدی

موارد منع مصرف: حساسیت مفرط به گروه گزانتین ها ، نا منظمی قلبی ، کاهش کارکرد تیروئید (هیپوتیروئیدی) ولی در بیماران مبتلا به نارسایی کبدی ، بیمار دیابت قندی ، گلوکوم و فشار خون و زخم معده و روده با احتیاط مصرف شود.

عوارض جانبی: افزایش ضربان قلب ، لرزش دست ، تشنج ، ایست قلبی

توجهات: *نباید دارو سریعاً انفوزیون شود زیرا باعث ایست قلبی می شود .
*در صورت تغییر رنگ نباید مصرف شود.

*در صورت افزایش ضربان قلب به پزشک اطلاع دهید زیرا نشانه مسمومیت دارویی است.

آموزش: بیماران باید استعمال سیگار را قطع کنند.

*همزمان مصرف نوشابه و غذا های حاوی گزانتین ممنوع است.

شرایط نگهداری: در دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه نگهداری شود.



آمیودارون

نام تجاری: Cordaron

گروه دارویی: گروه بنزوفوران

گروه درمانی: ضد آریتمی قلب یا دهلیز (قلبی)

شکل دارویی: قرص و آمپول (۲۰۰ و ۱۵۰ میلی گرمی)

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: بی نظمی ریتم قلبی (آریتمی) در بطن یا فوق بطن، فیبریلاسیون یا فلوتر دهلیزی

میزان مصرف: دوز یا میزان برای شروع اولیه روزانه ۸۰۰ تا ۱۶۰۰ میلی گرم از راه خوراکی به مدت یک تا سه هفته و میزان مصرف نگهدارنده ۲۰۰ تا ۶۰۰ میلی گرم در روز

موارد منع مصرف: بلوک قلبی درجه ۲ و ۳ کم کاری قلبی (برادیکاردی) و اختلال عملکرد گره SA ولی در موارد نارسایی کبدی یا ریوی و تیروئید کودکان با احتیاط مصرف شود.

عوارض جانبی: بی نظمی جدید در ریتم قلبی ، آسیب کبدی ، عارضه ریوی نوروپاتی محیطی ، سردرد و حساسیت به نور ، اختلال بینایی

توجهات:

- *در مورد علائم گوارشی در ابتدای درمان هشدار دهید.
- *در مصرف وریدی (انفوزیون) ، اندازه گیری فشار خون بیمار را باید مد نظر قرار داد.

آموزش:

- *به بیمار آموزش دهید تا نبض خود را روزانه اندازه بگیرد.
- *بیمار تا ۴ ماه پس از قطع دارو نباید در معرض نور قرار گیرد .
- *تست ریوی و چشمی بعد از مصرف ضروری است.

شرایط نگهداری: دور از نور و حرارات اتاق نگهداری شود.



آنتی دی ایمونوگلوبولین

نام تجاری: Partobulin- Rhogam - روفیلاک

گروه دارویی: ایمونوگلوبولین انسانی آنتی بادی

گروه درمانی: آنتی بادی ضد Rho(D)

شکل دارویی: آمپول

موارد مصرف: این فرآورده به منظور جلوگیری از ایجاد واکنش به فاکتور Rh و جلوگیری از بیماری همولیتیک نوزادان در بارداری‌های بعدی استفاده می‌شود. - ملاک تجویز دارو در بارداری عبارتند از: مادر Rh منفی باشد و قبلاً نسبت به فاکتور Rh حساس نشده باشد و نوزاد و یا پدر Rh مثبت باشد.

در افراد Rh منفی که اشتباهاً خون Rh مثبت استفاده کرده‌اند نیز برای جلوگیری از واکنش بر علیه فاکتور Rh استفاده از این ایمونوگلوبین توصیه شده است.

موارد منع مصرف: ۱- در افرادی که سابقه واکنش‌های آنافیلاکتیک یا واکنش‌های شدید سیستمیک نسبت به گلوبولین‌های انسانی دارند نباید مصرف شود. ۲- برای نوزادان بعد از تولد افراد Rh منفی که قبلاً نسبت به فاکتور Rh حساس شده‌اند نباید تجویز شود.

هشدار: این دارو باید عضلانی مصرف و ترجیحاً در عضله دلتوئید تزریق شود.

عوارض جانبی: ناراحتی در محل تزریق، تب، درد عضلانی و خواب‌آلودگی از عوارض جانبی این

داروست. **شرایط نگهداری:** در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی‌گراد نگهداری و از انجماد آن جلوگیری شود مگر اینکه در بسته‌بندی دارو شرایط نگهداری خاص دیگری ذکر شده باشد.



آیوهگزول

نام تجاری: امنی پاک (Ominipaque)

گروه دارویی: ماده حاجب (منومریک غیر یونی یددار)

گروه درمانی: ماده حاجب

شکل دارویی: Inj: (10,20,50,100,200ml)240mg/ml

Inj: (10,20,50,100,200ml)300mg/ml Inj: (20,50,100,200ml)350mg/ml

امنی پاک به صورت محلول آبی، استریل، شفاف، بی رنگ یا زرد کم رنگ است

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: میلوگرافی؛ سی تی اسکن به صورت تزریقی؛ آرتروگرافی؛ ERCP؛ آنژیوگرافی قلبی؛ آنژیوگرافی مغز؛ توموگرافی کامپیوتری؛ اوروگرافی.

موارد منع مصرف: سابقه حساسیت به ماده حاجب؛ آسم، بیماریهای نارسایی کلیوی

عوارض جانبی: شامل سه دسته خفیف، متوسط و شدید می باشد؛

خفیف: احساس گرم شدن، احساس طعم فلز در دهان، تهوع و استفراغ

متوسط: علائم پوستی (راش، قرمزی، کهیر و خارش)، درد سینه و درد شکمی، کاهش فشارخون و برادی

کاردی (واکنش وازوواگال)، سردرد، تب

شدید: آنژیوادم، برونکواسپاسم، آنافیلاکسی، ادم ریوی

توجهات: * بیماران دارای سابقه بیماری های کلیوی، قلبی، دیابتی و همچنین سالمندان و کودکان باید هیدراته باشند.



* این دارو ممکن است در نوزادان باعث اختلالات الکترولیت و تغییرات همودینامیکی شوند، بنابراین در این موارد باید با احتیاط مصرف شوند.

* امنی پاک در بیماران با مشکلات پاتولوژیک حاد مغزی مانند تومور، صرع ممکن است باعث تشنج شود.

* تزریق زیر جلدی این دارو در بیماران باعث درد و ادم و ورم ناحیه ای و ... میشود. بنابراین در تزریق ماده حاجب باید نهایت دقت در نظر گرفته شود.

* بیماران دیابتی که متفورمین مصرف می کنند باید ۴۸ ساعت قبل و بعد از تزریق ماده حاجب مصرف آنها باید قطع شود. تا از دچار به اختلال گذرا در عملکرد کلیوی و اسیدوز لاکتیک جلوگیری شود.

* مراقبت از بیمار به دنبال ماده حاجب حداقل تا یک ساعت بعد از تزریق الزامی است.

* ممکن است بروز علائم خفیف نشانه اولیه واکنشهای شدید ماده حاجب باشد بنابراین در صورت بروز علائم اولیه باید تزریق قطع و اقدامات درمانی از قبیل گرفتن رگ و... انجام شود.

* آنتی دوت مشخصی برای این دارو وجود ندارد

* هر ویال یک بار مصرف می باشد باقیمانده دارو باید دور ریخته شود (البته مصرف خوراکی می تواند داشته باشد)

* از ۲ ساعت قبل؛ بیمار نباید به جز مایعات چیزی بخورد .

شرایط نگهداری : این دارو را باید در دمای ۱۵-۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور، رطوبت و داخل جعبه نگهداری کرد.



استامینوفن

نام تجاری: Paracetamol

گروه دارویی: مشتق پارا آمینوفنل

گروه درمانی: ضد درد غیر مخدر ، ضد تب

شکل دارویی: قرص ، شربت ، شیاف ، قطره ، ویال

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: درد های خفیف ، تب

میزان مصرف: بالغین ۳۲۵ تا ۵۰۰ میلی گرم - کودکان ۱۲۰ تا ۲۴۰ میلی گرم

موارد منع مصرف: بیماری های شدید کبدی ، حساسیت دارویی

عوارض جانبی: ضعف ، خواب آلودگی ، زخم دهانی ، راش ، ادرار خونی یا کدر ، درد

شکمی ، مشکلات خونی ، یرقان

توجهات: قرص استامینوفن را میتوان خرد کرد و با مایعات دیگر مخلوط کرد و خورد ، با

شیرینی ها مصرف نشود.

آموزش: دارو با یک لیوان آب مصرف شود.

شرایط نگهداری: شیاف باید در یخچال و بقیه اشکال دارویی در دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه

و دور از نور نگهداری شود.



استامینوفن کدئینه

گروه دارویی: ترکیب استامینوفن + کدئین

گروه درمانی: ضد درد

شکل دارویی: قرص

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: درد خفیف تا شدید

میزان مصرف: ۱ تا ۲ قرص هر ۴ ساعت تا ۶ ساعت

موارد منع مصرف: حساسیت به دارو، بیماری سیروز کبدی و کتواسیدوز دیابتیک

بیماری التهابی روده، زخم روده بزرگ، نارسایی کلیه،

نکته: برای کودکان زیر ۳ سال قابل تجویز نیست.

عوارض جانبی: درد شکم، اسهال، نفخ

توجهات: دارو باید در آغاز غذا مصرف شود.

آموزش: در صورت بروز عارضه گوارشی به پزشک مراجعه شود.

*وزن کردن منظم نیز توصیه می شود (عوارض کلیوی).

شرایط نگهداری: در دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه نگهداری شود.



استیل سالیسیلیک اسید = ASA

نام تجاری: Aspirin

گروه دارویی: سالیسیلات

گروه درمانی: ضد التهاب / ضد درد غیر مخدر / ضد تب / مهار کننده تجمع پلاکتی

اشکال دارویی: قرص / قرص جویدنی / شیاف

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: انواع دردهای متوسط تا خفیف، تب، بیماریهای التهابی همچون روماتوئید آرتریت و کاوازاکی و بعنوان مهار کننده تجمع پلاکتی؛ سکته قلبی حاد؛ بیماری کرونری بدون علامت؛ آنژین پایدار مزمن و آنژین ناپایدار

موارد منع مصرف: آسم؛ حساسیت مفرط؛ زخم معده؛ اختلالات انعقادی خونریزی دهنده؛ آنژیوادم و کهیر

عوارض جانبی: زخمهای گوارشی و جلوگیری از لخته شدن خون و سردرد و پان سیتوپنی و راش

توجهات: * حداقل یک هفته قبل از انجام عمل جراحی باید قطع شود

* اگر بوئی شبیه به سرکه به مشام رسید قرص دور انداخته شود.

* روزانه وزن - جذب و دفع و ادم را در پاها و ساق های پاکنترل کنید

* بهممنظور کاهش عوارض گوارشی دارو با غذا یا شیر میل شود.



استیل سیستن

نام تجاری: Mucomyst , Parvolex

گروه دارویی: موکولیتیک

اشکال دارویی: آمپول، قرص و قرص جوشان.

مکانیسم اثر:

با شکستن باندهای دی سولفیدی موکوپروتئین ها باعث کاهش ویسکوزیته ترشحات می شود. افزایش گلووتاتیون کبدی که برای خنثی سازی متابولیست های سمی ناشی از مصرف بیش از حد استامینوفن ضروری است.

موارد مصرف:

مسمومیت با استامینوفن، برونشیت، پنومونی، سپتیک فیبروزیس، آمفیزم، آتلکتکازی، سل، مشکلات ناشی از جراحی قفسه سینه و جراحی قلب و عروق.



اسید آسکوربیک – ویتامین C

نام تجاری: Ascorbicap

گروه دارویی: ویتامین C

اشکال دارویی: آمپول، قرص و قرص جوشان

موارد مصرف: پیشگیری و درمان اسکوروی، کمک به درمان سوختگی های شدید، بهبودی شکستگی یا زخم، بیماریهای مزمن و اسیدی کردن ادرار.

عوارض جانبی: سرگیجه، درد در محل تزریق، اسهال، سوزش سر دل، کرامپ شکمی، تخریب سلول داسی شکل، افزایش دفع ادرار، سوزش ادرار، کریستالوژی، بی خوابی.



اسید فولیک

نام تجاری: Folvite

گروه دارویی: اسید فولیک (VB₉)

گروه درمانی: ویتامین ها

شکل دارویی: قرص ۵ میلی گرمی و تزریقی

مصرف در دوران حاملگی: گروه A

موارد مصرف: کمبود اسید فولیک ، درمان کم خونی

میزان مصرف: در درمان یک قرص روزانه و در پیشگیری ۰٫۲ میلی گرم در روز مفید است.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی

عوارض جانبی: ضایعات تنفسی و پوستی بروز می کند ولی نادر است.

توجهات: این دارو در آنمی مگالوبلاستیک باید همیشه همراه با ویتامین ب_{۱۲} باشد.

*این دارو در زنان حامله و سالمند بسیار مفید است.

آموزش: دارو را خودسرانه استفاده نکنید.

*در صورت احتمال حساسیت به پزشک اطلاع دهید.

*رنگ ادرار ممکن است به زرد روشن تغییر یابد .

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود. دارو را در ظروف مقاوم به نور نگهدارید



انسولین

نام تجاری: Iletin

گروه دارویی: هورمون ها

گروه درمانی: ضد دیابت (قندی)

شکل دارویی: تزریقی

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: کنترل دیابت قندی ، کتواسیدوز دیابتی ، دیابت ناشی از حاملگی

میزان مصرف: طبق دستور متخصص عمل شود. البته ۰.۵ تا ۱ واحد به ازای هر کیلو گرم وزن معمول است.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی و پایین بودن قند از موارد ممنوعیت حساب می شود.

عوارض جانبی: کاهش قند خون ، تورم ، قرمزی ، درد محل تزریق، ضایعات جلدی آتروفی (لاغری) در محل تزریق ، شوک و حساسیت شدید.

توجهات :

* تنها انسولین رگولار یک ساعت قبل از غذا است .

* هر گاه دو انسولین رگولار و NPH را با هم دیگر می خواهید تزریق کنید همیشه ابتدا انسولین رگولار را به داخل سرنگ بکشید.

* تنها انسولین رگولار رامیتوان وریدی تزریق کرد.

* جهت درمان موثر دیابت لازم است قندخون ناشتا (نرمال : ۷۰-۱۳۰mg/dl) قندخون ۲ساعت بعداز غذا (۸۰-۱۵۰mg/dl) وهموگلوبین گلیکوزیله چک شوند.

* طی دوره بیماری لازم است کتون ادرار کنترل شود طی دوره های استرس بیمار و جراحی نیاز به انسولین افزایش می یابد.



※ در اوج اثر انسولین ممکن است هیپوگلیسمی رخ دهد و تظاهرات زیر را چک کنید:
تعریق؛ ضعف؛ گیجی؛ لرز؛ تهوع؛ نبض سریع و ضعیف؛ خستگی بیش از حد؛ تکیه کاردی؛ اختلالات حافظه
ای؛ اختلال در تکلم؛ قدم برداشتن آهسته و کند؛ اضطراب؛ ترمورو گرسنگی .

※ مراقب تظاهرات هیپرگلیسمی باشید:

استشمام بوی استون از تنفس؛ پلی اوری؛ خستگی بیش از حد؛ گر گرفتگی؛ پوست خشک؛ خواب الودگی
ولتارژی.

آموزش: بهترین زمان تزریق انسولین رگولار یک ساعت قبل از غذا است.

※ سطح قند خون را با دستگاههای خانگی اندازه گیری کنید.

※ بیمار می بایست برای کنترل قند خون رژیم را نیز رعایت کند.

شرایط نگهداری: انسولین را در درجه حرارت اتاق می توان تا یک ماه نگهداری کرد.

دارو نباید در معرض نور خورشید یا حرارت قرار بگیرد. دمای مناسب ۵ تا ۳۸ درجه است.



اپی نفرین

نام تجاری: Adernalin

گروه دارویی: سمپاتومیمیتیک

گروه درمانی: بازکننده ریه ، بالا برنده فشار خون

شکل دارویی: تزریقی

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: ایست قلبی - دراحیای قلب و ریه داروی بسیار حیاتی است و در درمان شوک ناشی از حساسیت دارویی (آنافیلاکسی) یا آسم و حملات ریوی در کودکان و جوانان بسیار مفید است.

میزان مصرف: میزان غلظت آن 0.0001 یا 0.0001 قابل استفاده در آسم به صورت زیر جلدی با غلظت $1/1000$ به میزان 0.1 تا 0.5 میلی گرم تزریق شود.

موارد منع مصرف: آسیب مغزی ، بی نظمی قلب ، نارسایی عروق و حساسیت دارویی

عوارض جانبی: سر درد ، تپش قلب ، تهوع ، افزایش فشار خون ، سنکوپ

توجهات: در تهیه غلظت طبق دستور عمل شود.

* گاهی برای بی حسی موضعی از ترکیب اپی نفرین و لیدوکائین استفاده می شود. این کار را در انتهای اندام ها (دست و پا) نباید انجام داد.
* ضربان قلب و فشار خون را کنترل کنید.

آموزش: افزایش تعداد ضربان قلب جزء عوارض دارویی است .

* از مصرف خودسرانه به ویژه در سالمندی پرهیز کنید .

* در صورت احتمال حساسیت دارویی به ویژه آنتی بیوتیک ، آن را آماده داشته باشید.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.



اریترومایسین

نام تجاری : Erythrocin

گروه دارویی: ماکرولید

گروه درمانی: آنتیبیوتیک

اشکال دارویی: Tablet: 200, 400mg Tablet, Chewable:
Powder, For Suspension: 200mg/5ml Injection: 1g 200mg

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: عفونت دستگاه تنفس فوقانی ، گوش ، عفونت ریوی، عفونت های لگنی ، اورتریت
غیر گونو کوی ، تب رماتیسمی

موارد منع مصرف : حساسیت شدید دارویی ، نارسایی کبدی

عوارض جانبی: تهوع ، استفراغ ، اسهال ، مشکلات شنوایی ، کهیر

توجهات: در حساسیت به گروه پنی سیلین ها اریترومایسین جایگزین مناسبی است.

در صورت مصرف مقادیر زیاد دارو، یرقان انسدادی و عوارض قلبی با مصرف این دارو گزارش شده اند

آموزش: * به منظور کاهش عوارض گوارشی دارو با غذا میل شود.

* عوارض کبدی دارو طی چند هفته ظاهری شوند.

* به همراه آن نباید آبمیوه استفاده شود. برای جذب بیشتر دارو، آن را با یک لیوان پر آب، یک

ساعت قبل و یا دو ساعت بعد از غذا، مصرف کنید .

* این دارو ممکن است موجب رشد بیش از حد قارچها یا باکتریهای غیر حساس شود.

* اگرچه این دارو باکتریو استاتیک است ، ولی ممکن است با مقادیر زیاد بر علیه ارگانیسم های

بسیار حساس باکتری کش باشد.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.



استرادیول والرات

نام تجاری: Dioval

گروه دارویی: استروژن

گروه درمانی: استروژن صناعی غیراستروئیدی

شکل دارویی: آمپول - قرص - ژل

مصرف در دوران حاملگی: گروه X

موارد مصرف: یائسگی، سرطان پستان، سرطان پروستات، واژینیت آتروفیک، خشکی فرج، هیپوگنادیسم، نارسائی اولیه تخمدان، اوارکتومی

موارد منع مصرف: اختلالات ترومبوآمبولیک، سرطان تناسلی، خونریزی ژنیتال غیر طبیعی

عوارض جانبی: خونریزی در اثر قطع دارو، دیسمنوره، کاندیدیازیس واژینال، تغییرات پستانی، ژنیکوماستی، ناتوانی جنسی؛ سرگیجه، سردرد، میگرن، افسردگی. کاهش فشارخون، ترومبوفلیت، ادم دردهای شکمی، راش، کهیر

توجهات: *اندازه‌گیری وزن به‌طور هفتگی و گزارش به پزشک

*کنترل فشارخون هر ۴ ساعت: باید مراقب افزایش فشارخون در نتیجه احتباس آب و نمک بود.

*نسبت I&O: مراقب کاهش برون‌ده ادراری و افزایش ادم باشید.

*گزارش توده‌های پستانی، خونریزی از واژن، ادم، زردی، تیره‌شدن ادرار، مدفوع خاکستری، تنگی نفس، سردرد، تاری دید، درد شکمی، کرختی یا سفتی در پاها، درد سینه، و گزارش ناتوانی جنسی یا ژنیکوماستی در بیمار مرد. *تزریق عضلانی عمیق در عضلات حجیم.
*استفاده همراه غذا یا شیر برای کاهش علائم گواشی در مصرف خوراکی دارو.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.



استروژن کونژوگه

نام تجاری: Estracon یا Premarin

گروه دارویی: استروژن

گروه درمانی: جایگزین استروژن، ضد نئوپلاسم

شکل دارویی: قرص ۰/۶۲۵ و ۱/۲۵ میلی گرمی و آمپول ۲۵ میلی گرم در ۵ سی سی و کرم

واژینال ۰/۶۲۵ میلی گرم در گرم. نوع موضعی: استروژن واژینال

مصرف در دوران حاملگی: گروه X

موارد مصرف: واژینیت آتروفیک، خشکی و چروکیدگی واژن؛ نارسایی اولیه تخمدان، هیپوگنادیسم، اواریکتومی (جراحی برداشتن تخمدان)، پیشگیری از استئوپورز، خونریزی غیرطبیعی رحم (عدم تعادل هورمونی)، بزرگ شدن پستان پس از زایمان، کانسر یا کارسینومای پروستات (در موارد پیشرفته یا پیشرونده و غیرقابل جراحی)،

موارد منع مصرف: سرطان‌های وابسته به استروژن، خونریزی واژینال غیرطبیعی، ترومبوامبولی

عوارض جانبی: سردرد، سرگیجه، ترومبوامبولی، ادم، هیرسوتیسم، آکنه، آمنوره، دیسمنوره، کاهش لیبیدو، آتروفی بیضه، تهوع، اسهال، استفراغ، هیپرگلیسمی

گروهی از عوارض دارو که اغلب با ادامه مصرف آن کاهش می‌یابند: کرامپ یا نفخ شکم، کمبود اشتها، تهوع، احتباس نمک و مایع، تورم و تندر (Tender) شدن پستان به لمس یا فشار در مرد و زن، کاهش یا افزایش وزن.

توجهات: *کنترل قند خون در بیماران دیابتی* استفاده همراه غذا یا شیر برای کاهش علائم

گواشی در مصرف خوراکی دارو. *اندازه‌گیری وزن به‌طور هفتگی و گزارش به پزشک

*کنترل فشارخون هر ۴ ساعت: باید مراقب افزایش فشارخون در نتیجه احتباس آب و نمک بود.

*نسبت I&O: مراقب کاهش برون‌ده ادراری و افزایش ادم باشید.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق و دور از نور نگهداری شود



انوکسپارین

نام تجاری: سلکسان

گروه دارویی: ضد انعقاد از دسته هپارین های با وزن مولکولی پائین

گروه درمانی: ضد انعقاد

شکل دارویی: آمپول زیر جلدی داخل سرنگ در انواع ۲۰۰۰ و ۴۰۰۰ و ۶۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ واحدی

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: پیشگیری از لخته خونی در بیماران با بیماریهای خاص - بیماران تحت جراحی جایگزینی هیپ یا زانو یا جراحی معده - پیشگیری از حمله قلبی در آنژین صدری ناپایدار (درد قفسه سینه) - ترومبوز ورید های عمقی - شرایطی که تشکیل لخته خونی در عروق ساق پا میشود

موارد منع مصرف: اولسرپپتیک ، هموفیلی یا سایر اختلالات هموراژیک ، ترومبوسایتوپنی ، خونریزی اخیر مغزی ، هایپرتانسیون شدید ، بیماریهای شدید کبدی ، حساسیت شدید به هپارین

عوارض جانبی: خونریزی ، هایپرکالمی ، ترومبوسایتوپنی ، نکروز پوست در محل تزریق ، واکنشهای حساسیت مفرط ، استئوپروز در صورت مصرف طولانی

توجهات: *اندازه گیری غلظت پتاسیم سرم قبل از شروع و در طول درمان توصیه می گردد -.

شمارش تعداد پلاکتها در درمانهای طولانی تر از ۵ روز ضروری است و در صورت بروز ترومبوسایتوپنی یا ۵۰٪ کاهش تعداد پلاکت قطع دارو و اجتناب از مصرف مجدد آن توصیه می شود. در صورت بروز خونریزی ناشی از مصرف بیش از حد dosage (over دارو) ، تزریق آهسته داخل وریدی پروتامین سولفات با دوز معین توصیه می شود . *سفتی و درد قرمزی و کبود شدگی در محل تزریق با استفاده از کیسه یخ علائم را برطرف می کند.

شرایط نگهداری: دارو را در ۲۵°C نگهدارید آن را منجمد نسازید



اکسازپام

نام تجاری: Apo - oxazepam

گروه دارویی: بنزودیازپین

گروه درمانی: آرام بخش / خواب آور

اشکال دارویی: قرص ۵ و ۱۰ میلیگرمی

مصرف در دوران حاملگی: گروه D

موارد مصرف: درمان بیخوابی و آرام بخش در درمان اضطراب و علائم محرومیت از الکل استفاده می شود.

موارد منع مصرف: حساسیت مفرط به بنزودیازپین ها، گلوکوم با زاویه تنگ، جنون، کما

عوارض جانبی: وابستگی و تحمل، سرگیجه، سردرد و خواب آلودگی و کاهش فشارخون وضعیتی

توجهات: * به خاطر ایجاد علائم گوارشی دارو با غذا یا شیر مصرف شود.

* آدامس بدون قند، آب نبات سفت، جره های مکرر آب برای خشکی دهان استفاده شود.
روش تهیه / تجویز:

* به هنگام حرکت کردن در شروع درمان به خاطر احتمال ایجاد خواب آلودگی و سرگیجه به بیمار کمک شود.

* اقدامات حفاظتی شامل نرده های کنار تخت فراهم شود.

* بلعیده شدن دارو را چک کنید. مصرف دارو بعد از استفاده طولانی مدت به طور ناگهانی قطع نشود.

* به خاطر احتمال غش کردن به آهستگی بلند شوید.

* خواب آلودگی ممکن است در شروع درمان بدتر شود.



اکسی توسین

نام تجاری: Syntocinon

گروه دارویی: اکسی توسیک

گروه درمانی: محرک انقباض رحم - محرک ترشح شیر

اشکال دارویی: آمپول ۵ و ۱۰ واحدی

مصرف در حاملگی: گروه C

مکانیسم اثر: انقباض عضله صاف رحم را تحریک می کند (تقلید انقباضات طبیعی و خود به خود زایمان). برای افزایش خروج شیر از سینه ها، عضلات صاف پستان را تحریک می کند.

مقدار و روش مصرف:

القاء و تحریک زایمان: ابتدا یک تا دو میلی واحد در دقیقه از راه انفوزیون وریدی تجویز می شود سپس به تدریج با همان مقادیر هر ۱۵ تا ۳۰ دقیقه یک بار افزایش می یابد (به منظور ایجاد الگوی انقباضی مشابه با زایمان خود به خودی) این مقدار نباید از ۲۰ میلی واحد در دقیقه بیشتر شود.

سقط ناکامل و اجتناب ناپذیر: ۱۰ واحد اکسی توسین با سرعت ۲۰-۱۰ میلی لیتر در دقیقه انفوزیون می شود.

کنترل خونریزی بعد از زایمان، ۱۰ تا ۴۰ واحد (حداکثر ۴۰ واحد در یک لیتر)، با سرعت ۲۰ تا ۴۰ میلی واحد در دقیقه پس از خروج نوزاد از کانال زایمان، انفوزیون می شود یا ۱۰ واحد پس از زایمان جفت از راه عضلانی تزریق می شود.

شروع اثر این دارو در تزریق وریدی بلافاصله بعد از تزریق بوده و مدت زمان اثر در تزریق وریدی یک ساعت است و در کبد و کلیه، متابولیزه و تخریب می شود.

**موارد منع مصرف:**

حساسیت به دارو، عدم تناسب آشکار سری- لگنی یا قرار گرفتن نامطلوب جنین در رحم مادر، پره ماچوریتی سر راهی، جراحی قبلی رحم یا سرویکس، وضعیت های مستعد کننده آمبولی ترومبوپلاستین، زایمانهای متعدد.

عوارض جانبی:

در جنین: برادیکاردی و سایر آرتیمی ها، هیپوکسی، خونریزی داخل جمجمه، تروما ناشی از خروج سریع از لگن، یرقان نوزاد.

مادر: حساسیت مفرط منتهی به هیپرتونیسیتی رحم، پارگی رحم، خونریزی بعد از زایمان، آرتیمی- های قلبی، هماتوم لگن، تهوع، استفراغ، خونریزی زیر عنکبوتیه، افزایش جریان خون.

توجهات: سولفات منیزیم بالای سر بیمار باشد.

*سرم را تکان ندهید تا محتویات آن مخلوط شود بلکه باید آن را بچرخانید.

*به پرزانتاسیون جنین و اقطار لگنی توجه کرده در صورتیکه تغییری در ضربان قلب جنین پدید آمد مادر را به پهلوی چپ بخوابانید.

*ریتم وعمق تنفس و نبض و فشار خون را اندازه گرفته و تغییرات آن را از نظر خونریزی مد نظر داشته باشید.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.

به توصیه های کارخانه سازنده توجه شود



امپرازول

نام تجارتي: Omeazole

گروه داروئی: مشتقات بنزایمیدازول

گروه درمانی: ضد زخم پپتیک. / سرکوبگر اسید معده

اشکال دارویی: کپسول ۲۰ میلی گرمی

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: درمان زخم دئودنوم - درمان ازوفازیت شدید - درمان ریفلاکس گاستروازوفازیتال شدید - درمان سندرم زولینگر-الیسون - درمان زخم معده

موارد منع مصرف: حساسیت مفرط نسبت به دارو و ترکیبات آن

عوارض جانبی: سردرد، اسهال، بثورات جلدی، کهیر و سرگیجه

توجهات: * در صورت بروز سوءهاضمه، اسهال و کهیر طی درمان، به پزشک مراجعه شود.

* در صورت اثبات وجود سرطان معده از مصرف این دارو باید خودداری گردد.

* کپسول دارو باید بلافاصله قبل از غذا و ترجیحاً در صبح مصرف شود

* در صورت ایجاد سرگیجه و خواب‌آلودگی از رانندگی و دیگر فعالیت‌های همراه با حادثه، بپرهیزد.



اندانسترون

نام تجاری: Zofran

گروه دارویی: آنتاگونیست گیرنده سروتونین

گروه درمانی: ضد استفراغ .

اشکال دارویی: قرص روکش دار ۴ میلی گرمی، محلول خوراکی ۴ میلی گرم در ۵ سی سی، آمپول ۲ میلی گرم در سی سی، ۲ سی سی، و ۴ سی سی.

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: جلوگیری و درمان تهوع و استفراغ، بعد از: عمل جراحی، رادیوتراپی، و شیمی درمانی کانسر

موارد منع مصرف: حساسیت مفرط نسبت به دارو .

در نارسایی کبد باید اندانسترون را، با احتیاط تجویز کرد.

عوارض جانبی: سردرد، خستگی، بدحالی، خواب آلودگی، اضطراب، آژیتاسیون، سرگیجه، سندرم خارج هرمی، تشنجات گراندمال (نادر)، سنکوپ (نادر)، یبوست، دل درد، احتباس ادرار، آریتمی، آنژین

توجهات:

۴۸ ساعت بعد از رقیق سازی در درجه حرارت اتاق قابل نگهداری است .



ایبوپروفن

نام تجاری : Brufen

گروه دارویی : ضدالتهاب غیراستروئیدی

گروه درمانی : ضد درد غیر مخدر، ضد تب، ضدالتهاب

اشکال دارویی : قرص های ۲۰۰ و ۴۰۰ mg ، سافت ژل ۲۰۰ و ۴۰۰ mg و شربت

خوراکی ۱۰۰ mg/5ml

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف : آرتریت روماتوئید، استئوآرتریت، دیس منوره اولیه، نقرس، درد دندان، اختلالات عضلانی-اسکلتی؛ کاهش تب

موارد منع مصرف : حساسیت مفرط به آسپرین با داروهای ضدالتهاب، سندروم پولیپ نازال، آنژیوادم، واکنش برونکواسپاسم نسبت به NSAIDs (داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی)، عفونت درمان نشده، مشکلات کلیوی، خونریزی گوارشی

عوارض جانبی: مصرف دراز مدت بروفن مانند سایر ضدالتهاب های غیراستروئیدی خطر حمله

قلبی را بالا می برد؛ تهوع، استفراغ، دل درد، خونریزی دستگاه گوارش

توجهات : *بیمار مواردی مانند تاری دید، صدای زنگ یا غرش در گوش ها را ممکن است به دلیل مسمومیت دارویی باشد گزارش کند.

*در صورت ایجاد سرگیجه و خواب آلودگی از رانندگی و دیگر فعالیت های همراه با حادثه، بپرهیزد.

*گزارش کردن تغییرات ادراری، افزایش وزن، ادم، افزایش درد مفاصل، تب، خون در ادرار که

می توانند به علت اثر سمیت کلیوی دارو باشند.* اگر ایبوپروفن را برای درد یا تب می خورید و درد

ظرف ۱۴ روز و تب ظرف ۳ روز بهتر نشده یا حتی بدتر شده است با پزشکتان مشورت کنید.

شرایط نگهداری : این دارو در دمای C ۱۵-۳۰ و دور از نور نگهداری شود.



ایمی پنم

نام تجاری: Primaxin – تاینام

گروه دارویی: آنتی بیوتیک (واجد بتالاکتام)

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

شکل دارویی: ویال های ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلی گرم

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: در درمان عفونت های ریوی ، عفونت های اداری – استخوانی ، ضایعات

پوستی ، عفونت زنان و زایمان، آلودگی میکروبی کلیه ها یا دریچه های قلبی

میزان مصرف: برای تزریق عضلانی حداکثر ۱۵۰۰ میلی گرم در ۲۴ ساعت و در نوع

وریدی نباید بیش از ۵۰۰ میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن باشد.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی ، شوک و یا بلوک قلبی.

عوارض جانبی: تهوع ، استفراغ ، اسهال ، لرزش دست ، سردرد ، خارش و کهیر

توجهات: * احتمال واکنش حساسیت شدید با تشنج را در حین تزریق در نظر بگیرید

تزریق این دارو در کودکان دچار مننژیت اکتیدامنوع است.

* دوزهای کمتر از ۵۰۰ میلی گرم رادر مدت ۳۰ – ۲۰ دقیقه و دوزهای بیشتر از ۷۵۰ میلی گرم

را در مدت ۶۰ – ۴۰ دقیقه انفوزیون وریدی تزریق کنید.

* ایمی پنم بارینگر لاکتات ناسازگاری دارد و نباید با فرآورده های حاوی لاکتات رقیق شود

* از تزریق سریع داخل وریدی خودداری شود .

* در صورت بروز حالت تهوع و استفراغ سرعت انفوزیون داخل وریدی را کاهش دهید.

آموزش: تاریخچه حساسیتی دارویی خود را به اطلاع پزشک برسانید.

* مصرف داروی ضد تشنج در بیماران با سابقه تشنج ضروری است.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.



ایمونوگلوبولین یا IVIG

نام تجارتي : Gamimune N

گروه دارویی : ایمونوگلوبولین

گروه درمانی : ایمنی سازی پاسیو

شکل دارویی : Inj : 1, 2.5, 5, 6, 10g

مصرف در دوران حاملگی : گروه C

موارد مصرف: درمان نگهدارنده در بیمارانی که بدن آنها قادر به تولید مقادیر کافی آنتی بادی‌های IgG انمی باشد. درمان انواع ایدیوپاتیک پورپورای ترومبوسیتوپنیک ایمونوگلوبولین

در برخی از موارد عفونت حاد مانند بیماری کاوازاکی و عفونت HIV در اطفال و نیز سندرم گیلن باره، مفید واقع می‌شود.

موارد منع مصرف: حساسیت مفرط نسبت به ایمونوگلوبولین‌ها - کمبود اختصاصی IgA

عوارض جانبی: تهوع - استفراغ - کهیر - آنژیوادم - تب و لرز - سردرد

توجهات :

*IVIG باعث مهار پاسخ بدن به واکسن‌های حاوی ویروس زنده مانند آبله مرغان، سرخجه و اوریون می‌شود. بنا بر این در صورت دریافت این واکسن‌ها تا ۳ ماه IVIG تزریق نشود و واکسن نیز حداقل ۱ ماه و ترجیحاً ۳ ماه پس از یک دوره IVIG تزریق شود. دارو تاثیری بر سایر واکسن‌ها ندارد.

*ویال‌های نیمه استفاده قابل استفاده مجدد نیستند.

* داروی خریداری شده باید کاملاً شفاف و بی‌رنگ و بدون وجود رسوب یا ذرات شناور باشد.



*معمولا تزریق ۳-۶ ساعت طول می کشد. دفعات تزریق و نوبت بعدی توسط پزشک تعیین می شود.

*اندازه گیری میزان ادرار و انجام آزمایشات کلیوی (Bun,Cr) مرتب انجام شود

*کاهش ادرار، افزایش ناگهانی وزن یا ورم پاها، می تواند نشانه ای از واکنش های کلیوی به دارو باشد.

*در صورت وجود درد، تورم، قرمزی یا برآمدگی در محل تزریق در دست یا پا به پزشک اطلاع دهید.

*ادرار قهوه ای یا قرمز و پوست زرد نشانه های عوارض کبدی دارو است

*هنگام تزریق فشار خون، درجه حرارت و نبض را چک می کند.

شرایط نگهداری :

دارو باید در دمای ۲-۸ درجه نگهداری شود. از انجماد آن جلوگیری شود

در هنگام تزریق دمای آن را به دمای بدن می رسانند.



ایمونوگلوبین ضد هپاتیت ب=HBIG

نام تجاری: Immuno HBS

گروه دارویی: ایمونوگلوبین ضد ویروس هپاتیت ب

گروه درمانی: ایمنی سازی پاسیو

مصرف در دوران حاملگی : گروه C

اشکال دارویی: ویالهای ۱۸۰-۲۳۰ و ۵۴۰ واحدی

موارد مصرف: برای پیشگیری از ابتلای نوزاد متولد شده از مادر دارای هپاتیت B

حداکثر تا ۷۲ ساعت بعد از تولد تزریق ایمونوگلوبین با دوز ۱۸۰ یا ۲۳۰ ضروری است.

البته تزریق نوبت‌های بعدی واکسن هپاتیت در ۳ دوره نیز توصیه می‌شود.

هم‌چنین در مواردیکه افراد با وسایلی برنده که به خون افراد مشکوک به هپاتیت آغشته

شده باشد تماس داشته باشند. (بخصوص پرستاران - کادر درمان شاغل در مراکز

درمانی- افراد شاغل در اتاق عمل - آزمایشگاه و ...) تزریق ایمونوگلوبین آنتی هپاتیت

۵۴۰ واحدی حداکثر تا ۷۲ ساعت بعد از تماس با خون مشکوک یا آلوده ضروری است.

شرایط نگهداری: در دمای بین ۲ تا ۸ درجه سانتی‌گراد باید نگهداری شود.



ایندومتاسین

نام تجاری : Indocid

گروه دارویی: ضدالتهاب غیراستروئیدی (NSAIDs)

گروه درمانی: ضددرد (غیر مخدر) ، ضدالتهاب

شکل دارویی: Cap : 25mg Tab : 75mg Supp : 50,100 mg

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: در درمان دردهای خفیف تا متوسط ، ضدالتهاب در بیماری های التهابی و رماتیسمی ، آرتروز ، تورم مفاصل

موارد منع مصرف: خونریزی حاد گوارشی ، آسم و حساسیت شدید دارویی

عوارض جانبی : اختلالات گوارشی، تهوع و اسهال، سردرد ؛ سرگیجه، بیخوابی ؛ عوارض کلیوی، مشکلات خونی

توجهات: *بیماران ممکن است دچار زردی شوند وادرار آنها سبز شود که میبایست دارو را قطع کرد و تست های کبدی انجام داد.

*دارو با شیر یا شربت آلومینیوم میل شود. *قرص نباید جویده شود .

*این دارو در بیماران با ضایعات فعال دستگاه گوارش و تاریخچه عود آن نباید مصرف شود.

*NSAIDs از جمله ایندومتاسین ممکن است باعث پنهان ماندن علائم عفونت گردند. بنابراین در فرد مبتلا به عفونت، باید با احتیاط کامل مورد مصرف قرار گیرند.

شرایط نگهداری : این دارو را باید در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور، رطوبت و داخل جعبه نگهداری کرد.



بتامتازون

نام تجاری: Celestone

گروه دارویی: گلکوکورتیکوئید (کورتون)

گروه درمانی: ضد التهاب ، مهار ایمنی

شکل دارویی: قرص ؛ آمپول؛ پماد ؛ کرم و قطره

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: التهاب شدید و مهار سیستم ایمنی ، نارسایی کورتکس آدرنال

میزان مصرف: روزانه $0/6$ تا $7/2$ میلی گرم به صورت خوراکی یا $0/5$ تا 9 میلی گرم

وریدی

موارد منع مصرف: عفونت های قارچی و حساسیت شدید

عوارض جانبی: سردرد ، افزایش اشتها ، ضعف ، افزایش وزن ، پرمویی صورت ، بی

خوابی و بی قراری

توجهات: قطع داروی استروئیدی باید به تدریج و طی یک هفته صورت گیرد.

آموزش: بتامتازون خوراکی را باید همراه غذا یا شیر استفاده کرد.

شرایط نگهداری: در جای خشک و خنک نگهداری شود.



بتاهیستین

نام تجاری: Betaserc

گروه داروئی: آنالوگ هیستامین

گروه درمانی: ضد سرگیجه و ضد منییر

مصرف در دوران حاملگی : گروه C

شکل داروئی: قرص ۸ میلی گرمی

موارد مصرف: بیماری Menier's (سرگیجه، وزوز گوش، کاهش شنوایی) ؛ درمان سرگیجه

موارد منع مصرف: فئوکروموسیتوما ؛ زخم گوارشی فعال

عوارض جانبی: اختلالات گوارشی، سردرد، بثورات پوستی و خارش

توجهات: *در صورت ابتلا بیمار به آسم، سابقه زخم گوارشی با احتیاط مصرف شود.

*این دارو مشابه هیستامین عمل میکند و نباید با آنتی هیستامین تجویز شود .

*باید همراه غذا یا شیر استفاده کرد



بیریدین

نام تجاری: آکینتون - Nimuscar- (Akinetone)

گروه دارویی: آنتی کولینرژیک

گروه درمانی: ضد پارکینسونیسم

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

شکل دارویی: قرص 2 mg و آمپول 10 میلی گرم

موارد مصرف: در درمان پارکینسون و برطرف کردن عوارض اکستراپیرامیدال داروها به کار می رود.

عوارض جانبی: اغتشاش شعور - چشم درد - تاری دید - گرفتگی عضلات - گیجی و منگی

توجهات: * از قطع ناگهانی دارو اجتناب ورزید .

* برای برطرف شدن خشکی دهان از آدامس ؛ آب نبات و نوشیدن جرعه های مکرر آب استفاده نمائید .

* این دارو میزان تعریق را کاهش میدهد.

* مراقب سوء مصرف این دارو جهت ایجاد کردن سرخوشی باشید .



بیزاکودیل

گروه دارویی: ملین

گروه درمانی: ملین محرک

اشکال دارویی: شیاف ۵ و ۱۰ میلی گرمی و قرص.

موارد مصرف: به عنوان ملین یا مسهل محرک جهت درمان کوتاه مدت یبوست، تخلیه رکتوم و کولون قبل از انجام آزمایش و یا جراحی به کار می رود.

موارد منع مصرف: آپاندیسیت یا وجود نشانه های آن، خونریزی و التهاب رکتوم، انسداد روده

عوارض جانبی: اسهال، تهوع و تحریک مخاط روده، ضربان نامطلوب قلب، کرامپ های عضلانی



پاراستامول

نام تجاری: Apotel

گروه دارویی: ضد درد ، ضد تب

شکل دارویی: آمپول تزریقی محتوی ۱ گرم پاراستامول در ۶,۷ میلی لیتر محلول تزریقی

مصرف در دوران حاملگی : گروه B

موارد مصرف: تسکین موقتی درد های خفیف تا متوسط خصوصا بعد از اعمال جراحی - درمان سریع
الایر تب - تسکین اورژانسی هیپرترمی و درد وقتی تجویز اشکال دارویی دیگر، ممکن نباشد.

علائم مسمومیت: معمولا بعد از ۲۴ ساعت آغاز می شود و شامل: تهوع ، استفراغ ، بی اشتها ، رنگ
پریدگی و درد شکمی. تجویز آنتی دوت ان - استیل سیستئین به صورت خوراکی یا وریدی ، بسته به
میزان مسمومیت، به فواصل زمانی ۱۰ ساعت انجام می شود.

عوارض جانبی: کاهش فشار خون ، تنگی نفس، افزایش سطح ترانس آمیناز

توجهات: *در افراد با نارسائی کبدی و کلیوی با احتیاط مصرف شود.

*در افراد الکلیسم ، دچار سوء تغذیه و دهیدراته با احتیاط مصرف شود.

*در افراد حساس به پاراستامول منع مصرف دارد.*در افراد با نارسائی کبدی حاد منع مصرف دارد.

*دوزهای بالاتر از میزان تجویز باعث ایجاد مسمومیت و صدمات جدی به کبد می شود. اولین علائم
مسمومیت ۲ یا ۴ تا ۶ روز بعد از تجویز مشاهده می شود. بعد از مشاهده علائم مسمومیت باید آنتی
دوت تراپی سریع انجام شود.

*محلول تزریقی باید در زمان بیشتر از ۱۵ دقیقه انفوزیون گردد.

*در صورتی که مصرف دارو فراموش شد و زمان مصرف دوز بعدی رسید ، لازم به دو برابر کردن میزان
مصرف نمی باشد.



پانتوپرازول

نام تجاری: Pantozol

گروه دارویی: مهار کننده پمپ پروتون

گروه درمانی: کاهنده اسید معده

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

شکل دارویی: قرص 20 mg - 40 mg و ویال 40 mg و کپسول 15 mg, 40 mg, 20 mg

موارد مصرف: درمان و پیشگیری رفلکس معده، مری، درمان زخم معده و اثنی عشر

موارد منع مصرف: در صورت هرگونه حساسیت به ماده مؤثر و یا سایر اجزاء قرص مصرف آن منع شده است.

عوارض جانبی: اسهال - سردرد - حساسیت - درد قفسه سینه - تنگی نفس - زردی



پتاسیم کلراید

گروه داروئی : جانشین پتاسیم

گروه درمانی : اصلاح الکترولیتی

اشکال داروئی : Tablet: **500-600 mg** ، وپال $1\text{mEq}/10\text{ml}$, $2\text{mEq}/10\text{ml}$

مصرف در حاملگی: گروه A

موارد مصرف : مسمومیت مزمن با دیگوکسین؛ هیپوکالمی همراه یا بدون آلكالوز متابولیک ؛ اسهال، استفراغ طولانی

هشدار : این دارو در موارد زیر باید با احتیاط مصرف شود: اسهال طولانی یا شدید، اختلال در عملکرد مری، طولانی بودن زمان تخلیه معده، انسداد روده، فلج دوره‌ای، انسداد شدید یا کامل قلب و زیادی پتاسیم خون یا حالاتی که منجر به زیادی پتاسیم خون می‌شود.

عوارض جانبی : ضربان نا منظم یا آهسته قلب، بیحسی یا گزگز در دستها، پا یا لب، اشکال در تنفس، اضطراب، خستگی یا ضعف، ضعف یا احساس سنگینی در پاها

توجهات :

- * دوره درمان باید کامل شود، بویژه اگر از داروهای مدر یا دیگوکسین استفاده می‌شود.
- * در صورت بروز علائم خونریزی گوارشی، مراجعه فوری به پزشک ضروری است
- * غلظت‌های پلاسمائی بیش از $5/5\text{mEq/L}$ بعلت احتمال بروز آریتمی خطرناک است.
- * پیگیری دقیق وضعیت بیمار، بررسی الکتروکاردیوگرام و اندازه گیری غلظت پتاسیم ممکن است ضروری باشد.
- * در صورت بروز اختلال در عملکرد کلیه (کم ادراری یا افزایش کراتینین سرم)، انفوزیون کلرور پتاسیم باید فوراً قطع شود.



پتیدین

نام تجاری: Dolantin

گروه دارویی: فنیل پیریدین

گروه درمانی: مخدر

شکل دارویی: تزریقی ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم

مصرف در دوران حاملگی: گروه B و گروه D در حوالی زمان زایمان

موارد مصرف: درد متوسط و شدید و قبل از عمل و کمک بیهوشی

میزان مصرف: ۲۵ تا ۱۰۰ میلی گرم عضلانی؛ زیر جلدی یا آهسته وریدی هر ۴ ساعت

موارد منع مصرف: در آسم، حساسیت شدید دارویی، تشنج، افراد پیر و نارسایی کبد و کلیه

عوارض جانبی: خواب آلودگی، یبوست، تشنج، خشکی دهان؛ آسیستول؛ دپرسیون

تنفسی؛ تشنج؛ دیس ریتمی قلبی و هیپوتانسیون شدید

توجهات: تزریق زیر جلدی به علت درد توصیه نمی شود.

*علائم حیاتی بیمار را کنترل کنید.

*برای تزریق وریدی سرم در نرمال سالین یا سرم دکستروز رقیق کنید.

آموزش: *به علت خواب آلودگی کار دقیق و رانندگی ممنوع است.

*به منظور جلوگیری از بروز آتلکتازی بیمار را تشویق به سرفه، تنفس عمیق و چرخش در تخت نمائید.

*برای جلوگیری از هیپوتانسیون وضعیتی از تغییر وضعیت ناگهانی پرهیز نمائید.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.



پروپرانولول

نام تجاری: Inderal

گروه دارویی: مهار کننده گیرنده بتا_۲

گروه درمانی: ضد فشار خون ، ضد میگرن

شکل دارویی: قرص ، آمپول

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: فشار خون ، بی نظمی ریتم قلبی، درمان درد قلبی ، پیشگیری سردرد عروقی

میزان مصرف: در فشار خون ۴۰ میلی گرم ۲ بار در روز و در آریتمی ۰,۲ میلی گرم به ازای هر

کیلوگرم

موارد منع مصرف: در مورد شوک قلبی ، نارسایی احتقانی قلبی، آسم ریوی ممنوع است.

عوارض جانبی: خستگی ، کاهش فشار خون ، درد قفسه سینه ، وزوز گوش ، اشکال در صحبت

کردن، تهوع ، اسهال، شب ادراری ، کاهش میل جنسی ، عفونت مجاری ادراری ، درد کلیوی ، درد

مفاصل و کمر درد و ضایعات پوستی

توجهات: فشار خون و نوار قلب بیمار باید کنترل شود. *دارو به همراه غذا تجویز شود.

آموزش: *مصرف دارو نباید به طور ناگهانی قطع شود.

*این دارو در سالمندان با احتیاط مصرف شود.

*در موارد اضطراب و تپش قلب هم کاربرد دارد.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.



پروتامین سولفات Protamine Sulfate

گروه دارویی: آنتی دوت

گروه درمانی: آنتاگونیست هیپارین

مصرف در حاملگی: گروه C

شکل دارویی: **1000 UAH/ml (5ml)** **10mg/ml Injection**

موارد مصرف: در مصرف بیش از حد هیپارین به شکل زیر استفاده می شود:

بالغین و کودکان: دوزاژ براساس بررسیهای انعقادی خون وریدی تعیین می شود. **1mg** پروتامین برای خنثی کردن **90U** هیپارین بدست آمده از نسج ریه یا **115U** هیپارین بدست آمده از مخاط روده، از راه وریدی تزریق می شود. تزریق باید به صورت آهسته و در خلال **یک** تا **۳** دقیقه انجام شود. حداکثر دوزاژ، **50mg** در هر دوره **۱۰** دقیقه ای است.

مکانیسم اثر: این دارو وقتی در حضور هیپارین تجویز شود. با هیپارین ترکیب شده و یک کمپلکس پایدار تشکیل می دهد و مانع اثرات هیپارین می شود.

موارد منع مصرف: حساسیت به ماهی ؛ بیماریهای قلبی و عروقی ؛ کودکان

عوارض جانبی: افت ناگهانی فشارخون، برادیکاردی ؛ برافروختگی گذرا، احساس گرمی، تنگی نفس، خونریزی، حساسیت مفرط.

تجویز:



از آنجایی که پروتامین نیمه عمر طولانی‌تر از هپارین داشته و همچنین خود نیز دارای اثرات ضدانعقادی است، دوزاژ دارو را بدقت تعیین نمایید.

دارو را می‌توان در محلول نرمال سالین یا دکستروز **5%** رقیق نمود.

توجهات:

* پروتامین را نباید در موارد خونریزی جزیی بدنبال درمان با هپارین تجویز کرد، زیرا این موارد بدنبال قطع هپارین ظرف چند ساعت برطرف خواهند شد.

* فشارخون و نبض بیمار را هر دقیقه یکبار حداقل تا **۳** ساعت بعداز تجویز هر دوز دارو کنترل کنید.

* تست‌های انعقادی را می‌توان **۱۵-۵** دقیقه بعداز تجویز پروتامین سولفات اندازه‌گیری کرد.

* هر یک ساعت که از تجویز هپارین بگذرد؛ دوز محاسبه شده پروتامین سولفات نصف می‌گردد.

* حساسیت به ماهی را سوال کنید در صورت وجود حساسیت دارو باید با احتیاط مصرف شود.

آموزش بیمار / خانواده:

به بیمار توصیه کنید تا برطرف شدن خطر خونریزی از فعالیتهایی که منجر به خونریزی می‌گردد پرهیز نماید.

مصرف در دوران شیردهی:

عوارضی برای آن در انسان ثابت نشده، با این وجود منافع دارو باید در برابر ضررهای احتمالی آن سنجیده شود.

شرایط نگهداری: پروتامین سولفات را باید در درجه حرارت **15-30C** نگهداری نمود. از یخ زدن دارو جلوگیری نمایید.



پروژسترون

نام تجاری: Cyclogest

گروه دارویی: هورمون

گروه درمانی: پروژستین

شکل دارویی: آمپول ۲۵ و ۵۰mg، شیاف ۴۰۰mg و ۲۰۰

مصرف در دوران حاملگی: گروه X

موارد مصرف: هورمون درمانی در زمان یائسگی، اختلالات هورمونی که باعث قطع یا

عدم قاعدگی شوند، خونریزی بدون علت رحمی، درمان نارسایی جسم زرد تخمدانی

میزان مصرف: ۵۰ تا ۱۰ میلی گرم به مدت ۶ تا ۱۰ روز در اختلال قطع قاعدگی

موارد منع مصرف: سابقه ترومبوآمبولی (لخته شدن خون در اندام ها به ویژه ساق و

لگن)، نارسایی کبد و خونریزی و سرطان تخمدان و حساسیت مفرط

عوارض جانبی: ایست قلبی مهمترین عارضه است ولی سرگیجه، سردرد میگرنی، فشار

خون بالا، تهوع، قاعدگی، تغییر رنگ پوست و هیپرگلیسمی

توجهات: در اختلالات قاعدگی (ماهانه) ابتدا از استروژن استفاده کنید. در صورت تزریق

عضلانی، عمیق تزریق شود. قند خون در عده ای بالا می رود. ممکن است مشکلات

چشمی بروز کند. در بیماران دیابتی گلوکز خون را چک کنید.

آموزش: در صورت سرگیجه، درد ساق یا تورم اندام تحتانی به پزشک اطلاع دهید.

*مشکلات بینایی هر چند کوچک را به پزشک اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: آمپول در دمای معمولی نگهداری شود. شیاف در ۸-۲^oC نگهدارید.



پرومتازین

نام تجاری: Phenergan

گروه دارویی: فنوتیازین ها

گروه درمانی: آرام بخش ، ضد حساسیت ؛ ضد سرگیجه

شکل دارویی: قرص و شربت و آمپول

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: حساسیت و خارش پوستی ، بی خوابی ، تهوع ، استفراغ

میزان مصرف: در بالغین یک قرص و کودکان یک قاشق شربت ۰.۱ میلی گرم هر ۶

ساعت

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی ، صرع ، حملات حاد فشار خون

عوارض جانبی: عوارض خونی ، زردی ، تشنج ، کوما ، سرگیجه ، بی قراری و بی

اشتهایی ، یبوست ، خشکی دهان ، مشکلات تنفسی ، استفراغ

توجهات: داروی خوراکی با غذا یا شیر یا آب میوه استفاده شود.

*وضعیت تنفسی بیمار باید کنترل شود.

*مرگ ناگهانی در نوزادان و شیر خواران گزارش شده است.

آموزش: به علت خواب آلودگی از رانندگی اجتناب شود.

*بدون تجویز پزشک مصرف نشود.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.



پوویدون آیداین

نام تجاری: بتادین

طبقه بندی درمانی: ضد عفونی کننده موضعی

طبقه بندی مصرف در حاملگی: گروه D

اشکال دارویی: دهانشویه ۱٪، بتادین اسکراب ۷/۵٪، محلول موضعی ۱۰٪ در بسته بندی های مختلف، ژل و دوش واژینال ۱۰٪، پماد موضعی ۱۰٪

موارد مصرف: پیشگیری و درمان عفونت های سطحی، به عنوان ضد عفونی کننده موضعی برای سوختگی ها، بریدگی ها و سایر جراحات کوچک و درمان واژینیت

موارد منع مصرف و احتیاط: حساسیت به ید، مصرف به عنوان آنتی سبتیک مهبل در حاملگی (گروه D)، در سوختگی های وسیع به ویژه در بیماران دچار اسیدوز متابولیک یا اختلال عملکرد کلیه باید با احتیاط مصرف شود.

عوارض جانبی: اسیدوز متابولیک، اختلال فعالیت کلیه.



پیراسیلین

نام تجاری: Tazocin - zosyn

گروه درمانی: آنتی بیوتیک های بتالاکتام

اشکال دارویی: $2\text{gr}/250\text{mgr}$ گرم پیراسیلین و 250mgr میلی گرم تازوباکتام

$3\text{gr}/375\text{mg}$ گرم پیراسیلین و 375mg میلی گرم تازوباکتام

$4\text{gr}/500\text{mgr}$ گرم پیراسیلین و 500mgr میلی گرم تازوباکتام

نوع تزریق: انفوزیون وریدی - تزریق عضلانی

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: عفونت های تنفسی، پوست، دستگاه ادراری و استخوان، سوزاک و پنومونی

عوارض جانبی: آنمی، افزایش زمان سیلان، مهار فعالیت مغز استخوان، تهوع، استفراغ، اسهال

اولیگوری، پروتئینوری، هماچوری، بی حالی، توهم، اضطراب، افسردگی، پرش، اغماء، تشنج.

هیپوکالمی، هیپوناترمی.

توجهات: انفوزیون داخل وریدی در مدت حداقل ۳۰ دقیقه انجام شود.

*نباید با داروهای دیگر مخلوط شود.

*با رینگر لاکتات به دلیل ناسازگاری نباید رقیق شود.

*به فراورده های خونی یا آلبومین اضافه نشود.

*هر ۴۸ ساعت محل تزریق وریدی باید تعویض گردد.

*به علت بالا بودن محتوی سدیم در نارسایی کلیوی؛ بیماران سیروزی؛ ادماتوز با احتیاط مصرف شود



تتراسایکلین

نام تجاری: Tetracycl

گروه دارویی: تتراسایکلین

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

شکل دارویی: کپسول ۲۵۰ میلی گرمی، پماد چشمی ۱٪ و پماد جلدی ۳٪

مصرف در دوران حاملگی: گروه D

موارد مصرف: عفونت های عمومی خفیف تا متوسط، بیماری عفونی لگن، عفونت گونوکوکی، بیماری های مقاربتی، سفلیس، عفونت مجاری ادراری در زنان

میزان مصرف: یک تا ۲ کپسول ۴ بار در روز

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی

عوارض جانبی: تهوع، استفراغ و اسهال جزء عوارض گوارشی آن می باشد. ناراحتی شدید گوارشی و زخم مری ممکن است بروز کند. اختلالات خونی نیز از عوارض مهم است.

توجهات: ابتدا از کشت و آنتی بیوگرام می بایست مطمئن شوید.

*عوارض گوارشی را با خوردن غذا با دارو کاهش دهید.

آموزش: بیمار نباید در معرض نور قرار بگیرد.

*این دارو نباید تاریخ گذشته باشد زیرا باعث عوارض شدید کلیوی می شود.

*اسهال را جدی بگیرید و به پزشک اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.



ترانگزامیک اسید (ترنسید)

نام تجاری : cyklokapron

گروه دارویی : ضد فیبرینولیز

گروه درمانی : آنتی هموراژیک

مصرف در دوران حاملگی : گروه B

اشکال دارویی: کپسول 500mg و آمپول 50mg

موارد مصرف: خونریزی بعد از جراحی دندان در بیماران مبتلا به هموفیلی (پیشگیری و درمان) - خونریزی بعد از اعمال جراحی - مخروط برداری از بافت گردن رحم - برداشت پروستات یا جراحی رحم - خونریزی ناشی از هیپرفیبرینولیز - خونریزی از بینی - هیپرمنوره - خونریزی درون اتاقک چشم - کهیر غول آسای ارثی

پخش: غلظت دارو در شیر مادر تقریباً یک درصد غلظت سرمی است پیوند پروتئینی این دارو بسیار کم است. ترانگزامیک اسید به آلبومین سرم پیوند نمی یابد.

موارد منع مصرف: وجود لخته فعال داخل عروق (خطر تشکیل ترمبوز شدید و حتی کشنده وجود دارد).

عوارض جانبی: کمی فشار خون (سرگیجه یا منگی، خستگی یا ضعف غیرمعمول) ممکن است از تزریق سریع وریدی باشد - تاری دید یا سایر تغییرات بینایی - اسهال - تهوع - استفراغ - ناراحتی غیرمعمول در قاعدگی (ناشی از لخته شدن خون قاعدگی)



تداخل های دارویی: مصرف همزمان با کمپلکس ضد مهار انعقادی یا فاکتور IX

کمپلکس ممکن است خطر بروز عواقب ترومبوتیک را افزایش دهد.

مصرف همزمان با داروهای خوراکی جلوگیری کننده از بارداری حاوی استروژن ممکن است خطر تشکیل ترومبوز را افزایش دهد.

اسید ترانگزامیک متضاد داروهای ترومبولیتیک (مانند استرپتوکیناز، یا اورکیناز) است. اسید ترانگزامیک ممکن است در درمان خونریزی شدید ناشی از داروهای ترومبولیتیک مؤثر باشد

توجهات :

※انجام اقدامات زیر در پیگیری وضعیت بیمار اهمیت دارند:

※معاینات چشمی از جمله آزمونهای صحت بینایی، بینایی رگها، ته چشم و میدان بینایی

※قبل و در حین درمان؛ عملکرد کبدی بیمار را کنترل کنید .



تریامترن اچ

نام تجاری: دیازید

گروه دارویی: دیورتیک نگهدارنده پتاسیم

گروه درمانی: دیورتیک

اشکال دارویی: Tablet: Triamterene 50 mg+Hydrochlorothiazide 25 mg

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: نارسایی احتقانی قلب، سیروز کبدی، سندرم نفروتیک؛ هیپرتانسیون اولیه؛
دردرمان کمی پتاسیم خون؛ مدر

موارد منع مصرف: آنوری، بی کفایتی حاد یا مزمن کلیه، نفروپاتی دیابتی؛ حساسیت مفرط
شناخته شده نسبت به این دارو یا مشتقات سولفونامیدها.

عوارض جانبی: سرگیجه - کمی فشار خون در حالت ایستاده - خشکی دهان - آنافیلاکسی -
کم خونی مگالوبلاستیک

توجهات: * برای کاهش تحریکات گوارشی، دارو را با غذا یا شیر مصرف نمایید. از قرار گرفتن بیش
از حد در معرض آفتاب خودداری کنید.

* باید از مصرف مسهل ها خودداری شود، زیرا دفع مایعات و الکترولیتها را افزایش می دهد.

* احتمال بروز کمی یا زیادی پتاسیم خون وجود دارد. میزان مصرف پتاسیم غذا پیگیری شود. رژیم
غذایی نباید بدون مشورت پزشک تغییر یابد.

* این دارو زیادی فشار خون را درمان نمی کند، اما آن را کنترل می کند

* در صورت تجویز دارو به صورت یک بار در روز، توصیه می شود بیمار آن را هنگام صبح مصرف کند
تا از افزایش دفعات دفع ادرار در شب جلوگیری شود.



تری فلنوپرازین دی هیدروکلراید

نام تجاری: Triflurin-Skazina

گروه دارویی: ضد سایکوز فنوتیازینی (آرام بخش)

اشکال دارویی: قرص های ۱-۲-۵ میلی گرمی و آمپول ۱mg/ml

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: درمان تظاهرات و اختلالات سایکوتیک، در کنترل اضطراب و تنش زیاد همراه با نورز یا وضعیت های سوماتیک، احتمالاً مؤثر است.

موارد منع مصرف: حساسیت مفرط به فنوتیازین ها، حالات اغمایی، دسیکرازیه های خونی، کودکان کمتر از ۶ سال، بیماری قلبی، کبدی.

عوارض جانبی: احتقان بینی، خشکی دهان، تعریق، تاری دید، خواب آلودگی، بی خوابی، سرگیجه، پریشانی، حساسیت به نور، راش پوستی، یبوست، تاکیکاردی



جنتامایسین

نام تجاری: Garamycin

گروه دارویی: آمینو گلیکوزید ها

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

شکل دارویی: تزریقی ۲۰ ، ۴۰ ، ۸۰ میلی گرم، پماد و قطره چشمی

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: عفونت های گرم منفی و برخی از گونه های استاف زخم جراحی ، عفونت ادراری ، عفونت ناحیه لگن

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی

عوارض جانبی: عوارض کلیوی که بسیار خطرناک است، مشکلات شنوایی، ضعف عمومی، تشنج ، عوارض پوستی ، خارش ، زخم دهان ، راش ، کهیر
توجهات: در اختلال عملکرد کلیه میزان آن کاهش یابد یا تنظیم شود.
* اسهال و خارش جلدی را جدی بگیرید.

* در مدت ۶۰-۳۰ دقیقه انفوزیون شود تا موجب کاهش احتمال انسداد عصبی-عضلانی شود.
* بیمار باید به اندازه کافی آب یا مایعات مصرف کند تا غلظت زیاد دارو موجب آسیب به مجاری ادراری نشود.
* کلیرانس کراتینین و غلظت سرمی دارو باید به صورت منظم و دوره ای چک شود.
* دارودارای سمیت کلیوی و شنوایی میباشد.

آموزش: دارو ها را طبق دستور پزشک مصرف کنید و عوارض جدی را اطلاع دهید.
* در نوع موضعی جنتامایسین ، بیمار نباید در معرض نور باشد.

نکته: نوع موضعی و چشمی را در عفونت های پوست ، زخم و سوختگی می توان به کار برد.

شرایط نگهداری: در جای خشک و خنک نگهداری شود.



داکسی سایکلین

نام تجاری: vibramycin - doxy - doryx

گروه دارویی: تتراسیکلین.

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

اشکال دارویی: Tablet: 100mg (As Hyclate or Monohydrate

Capsule: 50, 100mg (monohydrate

مصرف در دوران حاملگی: گروه D

موارد مصرف: عفونتهای ناشی از ارگانوسمهای حساس - اسهال مسافرتی - بیماریهای التهابی حاد لگن (PID)

آنتراکس پوستی - درمان کمکی آکنه شدید - ضایعات التهابی (پاپول و پوسچول) - عفونتهای ناشی از کلامیدیا تراکوماتیس، التهاب غیرگونوکوکی پیشابراه، عفونتهای بدون عواقب رکتوم، گردن رحم، پیشابراه

موارد منع مصرف: حساسیت مفرط به دارو - در کودکان کمتر از ۸ سال - در نیمه دوم حاملگی

عوارض جانبی: تغییرات در بینایی شما. اسهال آبکی یا خونی. کبودی یا خونریزی. بی اشتها. تغییر رنگ ناخن. تغییر رنگ دندان. سمیت کلیوی برگشت پذیر

مسمومیت و درمان :

تظاهرات بالینی: اختلالات گوارشی.

درمان: شامل مصرف آنتی اسیدها یا تخلیه معده یا شستشوی معده طی چهار ساعت بعد از بلعیدن دارو می شود.

توجهات: *در ضمن بارداری نیز از این دارو استفاده نشود. چون باعث تأثیرات مخرب روی دندان، رشد عضلانی و استخوانی جنین می شود.



* داکسی سایکلین را می‌توان در بیماران مبتلا به اختلال عملکرد کلیه مصرف کرد، زیرا این دارو در بدن تجمع نمی‌یابد و موجب افزایش بارز غلظت‌های ازت اوره خون (BUN) نمی‌شود

* در صورت بروز علائم مسمومیت، حساسیت مفرط یا عفونت ثانویه، بروز اریتم بعد از قرار گرفتن در معرض نور خورشید یا در صورت بروز اسهال شدید که نشان دهنده کولیت سودوممبران باشد، باید مصرف دارو قطع شود.

* کودکان نباید هرگز از داکسی سایکلین استفاده کنند زیرا این دارو می‌تواند باعث زردی دائم در کودکان کمتر از ۸ سال شود.

* حتی در صورت احساس بهبودی، دارو تا انتها مصرف کنید تا عفونت‌تان درمان شده، از عود جلوگیری شود.

* روزی ۸ لیوان آب بنوشید، مگر اینکه پزشکتان دستور دیگری داده باشد.

از نور خورشید بین ساعت ۱۰ صبح تا ۳ بعد از ظهر و از لامپ‌های آفتابی و وسایل برنزه کننده اجتناب کنید. مناطق در معرض نور را با کرم‌های ضدآفتاب با قدرت محافظت‌کنندگی (SPF) حداقل ۱۵ بپوشانید.

* اگر قرص ضدبارداری مصرف می‌کنید، درحین استفاده از داکسی سایکلین یک روش جلوگیری دیگر را به تنهایی یا در کنار قرص ضدبارداری بکارگیرید.

* داکسی سایکلین تاریخ مصرف گذشته را دور بریزید. این دارو وقتی فاسد شود سمی می‌شود.

* شیر، محصولات لبنی، آنتی‌اسید، مکمل کلسیمی، مکمل آهن یا ملین‌های حاوی منیزیم مصرف کنید. این مواد غذایی یا داروها را حداقل ۲ ساعت قبل یا ۲ ساعت بعد از مصرف داکسی سایکلین استفاده کنید.



دایمتیکون

نام تجاری : Aeropa, Mylicon

گروه داروئی : مشتق متیل سیلوکسان

گروه درمانی : ضداسپاسم / ضدنفخ

اشکال دارویی : Drops or Solution: 40 mg/ ml -41.2mg/m l Tablet: 40 mg

مصرف در دوران حاملگی : گروه C

موارد مصرف: نفخ شکم , درمان کمکی در زخم معده , روده تحریک پذیر , کولیک شیرخوارگی ؛

داروی کمکی در سونوگرافی و رادیوگرافی روده

موارد منع مصرف: مورد خاصی وجود ندارد.

عوارض جانبی: عارضه خاصی وجود ندارد.

توجهات : به بیمار بیاموزید که هنگام مصرف قرص‌ها را کاملاً بجود.

*بهتر است دارو بعد از غذا و هنگام خواب مصرف شود

*هرگز دوز دارو را دو برابر نکنید.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود



دکستروز

گروه درمانی: جانشین مایعات، تأمین کننده کالری

گروه دارویی: محلولهای کریستالوئید جهت جبران کاهش مایعات یا الکترولیتها

طبقه بندی مصرف در حاملگی: گروه C

اشکال دارویی: محلولهای تزریقی ۵٪ و ۱۰٪، محلولهای تزریقی دکستروز همراه کلرور سدیم، ویالهای ۲۰٪ و ۵۰٪

موارد مصرف: سرم قندی ۵٪: ایزوتونیک بوده، فاقد الکترولیت در بسته های ۵۰۰ و ۱۰۰۰ cc وجود دارد. موارد استفاده: ورزش های طولانی مدت که گلوکز پلاسما کاهش می یابد. - درمان back pain - تأمین انرژی به دنبال فقر غذایی - جراحی ها - درمان دهیدراتاسیون هیپرتونیک - NPO **سرم قندی ۱۰٪:** فاقد الکترولیت و خاصیت دیورتیک

موارد استفاده: تأمین انرژی - درمان هیپوگلیسمی - بیماران نارسایی کلیوی - مسمومیت با پتاسیم همراه با انسولین - بیمار با تب - ادم ریوی - جانشینی مایع **سرم قندی ۲۰٪ و بالاتر:**

کاملاً هیپرتونیک در بیماران آنوری ممنوع است. موارد استعمال: در شوک هیپوگلیسمی، در مسمومیت با آب، ادم ژنرالیز دارند؛ جهت تأمین کالری در حداقل حجم آب و محلول؛ محلول ۱۰٪ و ۲۰٪ و ۵۰٪ به صورت همراه با سایر مایعات جهت انفوزیون وریدی مرکزی

موارد منع مصرف: هذیان، بیماران دهیدراته، اغمای دیابتی، خونریزی داخل جمجمه ای یا داخل ستون مهره ای، در دیابت ملیتوس با احتیاط مصرف شود. استفاده در اختلالات آب و الکترولیت به تنهایی ممنوع می باشد

عوارض جانبی: سندروم هیپراسمولار، افزایش فشار خون و نارسایی احتقانی قلب - ادم ریوی، دیوز اسموتیک، گلیکوزوری؛ ترومبوز، التهاب موضعی ورید های محیطی از عوارض شایع تزریق محلول های قندی هیپرتونیک می باشد.

از نکاتی که باید به آن توجه شود تاریخ مصرف و باقی مانده محلول مصرف نشود. تزریق زیر جلدی ممنوع چون دردناک است. قبل از تزریق فشار خون کنترل شود این محلول ها در افراد دیابتی به همراه انسولین باید مصرف شود.



دگزامتازون

گروه دارویی: آدرنوکورتیکوئید

گروه درمانی: ضد التهاب، مهار ایمنی

شکل دارویی: آمپول ۸mg، قرص ۵mg/قطره چشمی

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: التهاب دهان، داروی مخصوص تست تشخیص بیماری‌های غده فوق کلیه، ورم مغزی، استفراغ، التهاب مفاصل، درمان کمکی در مننژیت باکتریال، ورم مجاری هوایی

میزان مصرف: در التهاب مغزی یک تا ۲ آمپول هر ۶ تا ۱۲ ساعت - در مننژیت ۰/۶ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم هر ۶ ساعت در روز اول تا چهارم درمان یا ۱۰ میلی گرم تزریق وریدی و سپس هر ۴ میلی گرم هر ۶ ساعت

موارد منع مصرف: مشابه دیگر کورتون‌ها

عوارض جانبی: زخم دستگاه گوارش، بیخوابی، احساس انرژی و سرخوشی، تشنج

توجهات: قطع داروی استروئیدی باید به تدریج و طی یک هفته صورت گیرد.

آموزش: قرص خوراکی را باید همراه غذا یا شیر استفاده کرد.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.



دوبوتامین

نام تجاری: Dobutrex

گروه دارویی: آدرنرژیک ها

گروه درمانی: محرک قلب

شکل دارویی: تزریقی (انفوزیون وریدی)

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: درمان نارسایی حاد قلبی و در شوک قلبی یا عفونی یا جراحی قلب و افزایش مدت ضربان قلب

میزان مصرف: ۲ تا ۵ میکروگرم به ازای هر کیلوگرم در دقیقه (انفوزیون وریدی) تا به ۱۰ تا ۱۵ میکروگرم به ازای هر کیلوگرم برسد.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی و بیماری تنگی هیپرتروفیک تحت آئورتی (IHSS)

عوارض جانبی: حملات آسم ، کاهش فشار خون ، حساسیت شدید، تهوع ، سردرد ، تپش قلب ، تنگی نفس

توجهات: مایعات کافی باید برای بیمار تامین شود.

*نوار قلب و فشار خون بیمار کنترل شود.

آموزش: در صورت تشدید علائم به پزشک اطلاع داده شود.

*ممکن است در محل تزریق درد ایجاد شود، در این صورت به پرستار اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: محلول تهیه شده در جای خنک (۲ تا ۱۵ درجه) نگهداری شود.



دوپامین

نام تجاری: Dopastat

گروه دارویی: سمپاتومیمیتیک

گروه درمانی: تنگ کننده عروق

شکل دارویی: تزریقی

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: محرک قلبی است و در درمان کاهش یا افت فشار خون و شوک قلبی و نارسایی قلبی و نارسایی کلیه مفید است.

میزان مصرف: ۴۰۰ تا ۸۰۰ میلی گرم دوپامین در ۲۵۰ سی سی محلول و با غلظت ۱۶۰۰ تا ۳۲۰۰ میکروگرم در هر میلی لیتر انفوزیون شروع شود.

موارد منع مصرف: در بیماری های فئوکروموسیتوما یا آریتمی فیبریلاسیون بطنی یا تاکی آریتمی ممنوعیت مصرف دارد.

عوارض جانبی: تهوع ، استفراغ ، درد قفسه سینه ، تشدید حمله آسمی

توجهات: از مخلوط کردن دوپامین با محلول سرم بی کربنات سدیم یا فنی توئین سدیم خودداری شود.

* کنترل علائم حیاتی و مونیتورینگ نوار قلبی ضروری است.

* برای تزریق از ورید های بزرگ استفاده کنید.

آموزش: در محل تزریق ممکن است درد ایجاد شود و در صورت بروز این عارضه به پرستار اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.



دiazپام

نام تجاری: Valium

گروه دارویی: بنزودیازپین ها

گروه درمانی: آرام بخش ، ضد اضطراب

شکل دارویی: قرص، آمپول و شیاف

مصرف در دوران حاملگی: گروه D

موارد مصرف: درمان اضطراب ، تشنج ، ضد لرزش ، ضد حملات ترس (پانیک) در

اسپاسم عضلانی (به عنوان شل کننده عضلات ، اسپاسم در بیماران مبتلا به کزاز)

میزان مصرف: به نوع بیماری بستگی دارد (۲ تا ۲۰ میلی گرم) Diazپام (IV - IM -)

موارد منع مصرف: حساسیت شدید ، کسانی که در مسمومیت شدید با الکل در کما

هستند. آب سیاه چشم (گلوکوم زاویه بسته)

عوارض جانبی: خواب آلودگی شدید ، گیجی خشکی دهان ، یبوست ، زردی ، درد

عضلانی ، تنگی نفس ، کم خونی ، اختلالات سلول های خونی و کاهش فشار خون

توجهات: خواب آلودگی شدید از جمله علائم مسمومیت است.

*قطع دارو به طور ناگهانی خطر ناک است.

آموزش: *در تجویز وریدی احتمال کاهش فشار خون و وقفه تنفسی می رود.

*می بایست بیمار از مصرف داروهای آرام بخش دیگر به طور همزمان پرهیز نماید.

*پس از مصرف دارو از انجام کار های نیاز مند دقت و رانندگی خودداری شود.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.



دiazوکساید

نام تجاری: Proglycem

گروه دارویی: مشتق تیازیدی

گروه درمانی: ضد هیپرتانسیون - ضد هیپوگلیسمی

شکل دارویی: کپسول - آمپول

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: درمان هیپرتانسیون - درمان هیپوگلیسمی ناشی از افزایش انسولین

موارد منع مصرف: حساسیت مفرط به این دارو - تنگی‌آئورت

عوارض جانبی: تاکی کاردی، افزایش قندخون، احتباس آب و سدیم؛ بی‌اشتهایی، تهوع،

استفراغ، افزایش اوره خون، کاهش فشارخون و آریتمی؛ احساس سبکی سر

توجهات: *آزمایش خون و پیگیری فشارخون بیمار در طول درمان دراز مدت با این دارو ضروری است. *بیمارانی که به نسبت به مدرهای تیازیدی و سولفونامیدها عدم تحمل نشان می‌دهند، ممکن است این دارو را نیز تحمل نکنند. *بهتر است دارو هرروز در یک‌زمان معین مصرف شود.

*انتخاب دقیق رژیم غذایی، به کنترل بیماری کمک می‌کند. *میزان قند ادرار خون و همچنین کتون در ادرار باید تعیین گردد. *دiazوکساید تزریقی برای درمان سریع زیادی شدید فشار خون ناشی از بیماری کلیوی مصرفی شود. *برای جلوگیری از نشت دارو به بافت‌های اطراف رگ، هنگام تزریق وریدی باید دقت کامل بعمل آید، چون ممکن است منجر به سلولیت و درد شود. در صورت نشت دارو به بافت‌های اطراف رگ، درمان با کمپرس سرد توصیه می‌شود. *به منظور جلوگیری از بروز آریتمی قلبی، توصیه می‌شود Diazوکساید فقط به داخل ورید محیطی تزریق شود.



دی سیکلومین

نام تجاری: Dilomine

گروه دارویی: ضد درد موسکارینی (آنتی کولینرژیک)

گروه درمانی: ضد اسپاسم دستگاه گوارش

شکل دارویی: قرص ، شربت ، آمپول

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: دردهای دستگاه گوارش ، درمان کمکی در اسهال ، روده تحریک پذیر ،

درد شکمی (کولیک) در شیر خواران

میزان مصرف: 1 تا 4 قرص در روز و در کودکان 10 میلی گرم 3 تا 4 بار در روز که

معادل چهار قاشق مربا خوری است.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید ، تشنج ، سنکوپ و اختلال هوشیاری

عوارض جانبی: تپش قلب ، بی خوابی ، سرگیجه ، خستگی ، تاری دید ، یبوست ،

اتساع شکم

توجهات: مایعات دریافتی و خروجی را کنترل کنید.

* این دارو با آنتی هیستامین ها تداخل عملکرد دارد.

آموزش: دارو را با غذا میل کنید.

* در نوع تزریقی ، بیمار پس از تزریق در وضعیت دراز کش بخوابد و به طور ناگهانی تغییر

وضعیت ندهد.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.



دیفن هیدرامین

نام تجاری: Diphen

گروه دارویی: آنتاگونیست گیرنده H_1 از مشتقات اتانول آمین

گروه درمانی: آرام بخش - خواب آور ، ضد دیسکنزی (آنتی کولینرژیک)

شکل دارویی: آمپول - قرص - الگزیر

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: رینیت آلرژیک؛ واکنشهای آلرژیک نسبت به خون یا پلاسما (آنتی هیستامین)

؛ بی خوابی ؛سرفه ؛ بیماری حرکت (motionsickness) یا سرگیجه

موارد منع مصرف: حساسیت مفرط به این دارو و سایر آنتی هیستامین ها با ساختمان شیمیایی

مشابه ، حمله حاد آسم ، مصرف همزمان با مهارکننده های منوآمین اکسیداز.

عوارض جانبی: خواب آلودگی؛ هیپوتانسیون، طپش قلب، تاکیکاردی، کهیر؛ خشکی بینی و حلق

تهوع، استفراغ، اسهال، یبوست

توجهات: * به بیمار توصیه کنید دارو را مطابق دستور مصرف نموده و از زیاد نمودن دوز تجویز

شده پرهیز نماید.

* به بیمار تذکر دهید در طی درمان از مصرف داروهای تضعیف سیستم اعصاب مرکزی پرهیز نماید.

* بیماران مسن نسبت به اثرات آرام بخش دارو و هیپوتانسیون ناشی از آن حساس تر هستند.

* در صورت تجویز وریدی دارو در افرادی که مشکلات فشارخون دارند، لازم است بیمار را بدقت تحت

کنترل قرار داد.

* بهتر است دارو را همراه با غذا و یا شیر تجویز نمائید

شرایط نگهداری: محلول تزریقی و الگزیر دارو را باید در ظروف مقاوم به نور نگهداری نمود.

دارو را باید در درجه حرارت $15^{\circ}C - 30^{\circ}C$ نگهداری نمود.



دیکلوفناک سدیم

نام تجاری: Voltaren

گروه دارویی: اسید فنیل استیک

گروه درمانی: ضد درد ، ضد التهاب

شکل دارویی: قرص ، شیاف ، آمپول ؛ژل پوستی و قطره چشمی

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: آرتروز (استئوآرتریت) ، رماتیسم مفصلی، التهاب بورس و تاندون ها ، درد کلیوی

میزان مصرف: یک تا ۲ قرص یا یک شیاف یک تا ۴ بار در روز

موارد منع مصرف: حساسیت به دارو ، زخم معده فعال ، بیماری پورفیری

عوارض جانبی: تشنج ، فشار خون بالا و افزایش قند خون ، خونریزی از دستگاه گوارش

، کهیر و عوارض پوستی ، تنگی نفس

توجهات: برای کاهش تحریک معده قرص را با یک لیوان آب مصرف کنید.

*برای جذب بهتر دارو آن را تا ۱ ساعت قبل یا بعد از غذا مصرف کنید.

*از مصرف همزمان داروهای ضد درد دیگر مثل آسپیرین خودداری کنید.

آموزش: *از رانندگی به علت خواب آلودگی ناشی از مصرف دارو پرهیز شود.

*مصرف به شکل تزریقی با فلج عصب سیاتیک همراه است و به جزء در موارد ضروری و در

بیمارستان

شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.



دیگوکسین

نام تجاری: Lanoxine

گروه دارویی: گلیکوزید ها

گروه درمانی: ضد آریتمی قلبی، نارسایی قلبی

شکل دارویی: قرص ، آمپول ، قطره ، شربت

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: نارسایی قلبی ، بی نظمی های ریتم قلبی (نوع سوپراونتریکولار)

میزان مصرف: در نوزادان تا بالغین میزان مصرف متفاوت است. و برای شروع درمان باید میزان خاصی را تجویز کرد که به آن دیزیتال یزاسیون بیمار گفته می شود.

موارد منع مصرف: در صورت ابتلای بیمار به آریتمی قلبی و مسمومیت با گلیکوزید قلبی منع مصرف دارد.

عوارض جانبی: عوارض گوارشی ، تغییر بینایی ، ترس از نور و هذیان جزء عوارض شدید دارویی است.

توجهات: * غذا هیچ اثری بر میزان جذب دارو ندارد.

* در صورت کاهش تعداد ضربان قلب (برادیکاری) تزریق را متوقف کنید .

* اغلب برای پیش گیری از مسمومیت دارویی ۱ تا ۲ روز در هفته مصرف دارو حذف می شود. (مثلا دو شنبه و جمعه)

آموزش: به دستور پزشک توجه کافی شود.

* بیمار از سبزی کافی و سیب زمینی استفاده کند.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.



رانیتیدین

نام تجاری: Zantac

گروه دارویی: مهار کننده گیرنده H_2

گروه درمانی: ضد زخم معده ؛ ضد ترشح اسید

شکل دارویی: قرص، آمپول و شربت

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: زخم های معده و دوازدهه ، برگشت مواد اسید معده به مری، زخم مری

میزان مصرف: میزان مصرف آن ۲ قرص روزانه می باشد و فرم تزریقی با توجه به دستور

پزشک مصرف می شود.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی

عوارض جانبی: سردرد ، سرگیجه ، اسهال ، درد عضلانی ، مشکلات خونی

توجهات: *بهبتر است ۲ ساعت قبل از غذا مصرف شود.

*میزان تجویز در نارسایی کلیه کاهش یابد.

*تجویز B12 در درمان دراز مدت ضروری است .

*تست های کبدی ضروری است.

آموزش: دارو منظم استفاده شود.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود



روغن کرچک

روغن کرچک از فشردن دانه‌های بدون پوسته گیاه Ricinus Communisl در سرما به دست می‌آید که پس از تصفیه، بی‌رنگ کردن و عبور بخار آب تبدیل به روغن کرچک دارویی می‌شود

اشکال دارویی: روغن - کپسول

موارد مصرف: روغن کرچک عمدتاً به‌عنوان مسهل به ویژه در تخلیه روده قبل از معاینه کولون یا عکس‌برداری از حفره شکمی یا سونوگرافی و به عنوان ملین در درمان یبوست حاد نیز کاربرد دارد.

موارد منع مصرف: روغن کرچک در بیماری‌های التهابی حاد روده، انسداد روده، آپاندیسیت و دردهای شکمی با منشاء ناشناخته منع مصرف دارد و مصرف آن در دوران بارداری، شیردهی و در اطفال زیر ۱۲ سال نیز توصیه نمی‌شود.

عوارض جانبی: مصرف کپسول روغن کرچک در دوزهای توصیه شده توسط پزشک و در کوتاه مدت عوارض جانبی ندارد. مهم‌ترین عارضه مصرف طولانی مدت این دارو مختل شدن حرکات طبیعی روده و ایجاد حالت وابستگی به ملین برای اجابت مزاج است.



سابوتامول

نام تجاری: Ventolin

گروه دارویی: تحریک سمپاتیک

گروه درمانی: باز کننده مجاری هوایی ریه

شکل دارویی: قرص ، شربت ، تزریقی ، اسپری ونبولایزر

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: آسم (به ویژه حملات حاد آسم)، بیماری های انسدادی ریه ، برونشیت ، پیشگیری از زایمان زودرس

میزان مصرف: اسپری آن هر ۶ ساعت یک پاف ، در آسم مزمن ۴ میلی گرم شربت هر ۶ تا ۸ ساعت میزان مصرف فرم تزریقی بر اساس نیاز

موارد منع مصرف: در بی نظمی های ریتم قلبی - حساسیت مفرط - هیپرتانسیون - BPH

عوارض جانبی: تهوع ، لرزش دست ، بی قراری ، خشکی دهان ، بی خوابی ، تپش قلب ، افزایش ضربان قلب ، استفراغ

توجهات: *به بیمار تذکر داده شود که با مصرف این دارو لرزش دست شایع است.
*بی خوابی گاهی مشکل آفرین است.

آموزش: در صورت عدم اصلاح مشکل تنفسی بیمار به پزشک اطلاع دهید.

*احتمال سرگیجه و منگی را به بیمار تذکر دهید. از تماس دارو با چشم ها اجتناب شود و در صورت لزوم به هنگام استنشاق آئروسول، چشم ها بسته شود. در صورت تماس اتفاقی با چشم ها ممکن است باعث تحریک یا تیرگی دید شود. در این صورت چشم ها باید با آب سرد شسته شوند .

*تکان دادن آن قبل از مصرف (آماده سازی پمپ اسپری با ۷ بار تحریک کردن آن)

*ایجاد فاصله یک دقیقه ای بین فواصل استنشاقی دارو.

*روزانه وسایل استنشاقی به کار رفته را با آب داغ شستشو دهید .

شرایط نگهداری: قرص و شربت در دمای معمولی و نوع اسپری آن را دور از نور نگهداری کنید.



سدیم بیکربنات

نام تجاری : سودوبیکا

گروه داروئی : قلپا

گروه درمانی : قلیائی کننده ادراری و سیستمیک

مصرف در دوران حاملگی : گروه C

اشکال داروئی : ویال ۷/۵٪

موارد مصرف : قلیائی کردن ادرار ؛ CPR ؛ اسیدوز متابولیک شدید اسیدوز متابولیک غیر اورژانس

موارد منع مصرف : افزایش فشارخون، زخم پپتیک، بیماری کلیوی؛ هیپوکلسمی

عوارض جانبی : تشکیل سنگ؛ ترمور؛ نفخ ؛ تشنج ناشی از آلكالوز؛ احتباس آب ؛

توجهات: * در نارسائی احتقانی قلب، سیروز، مسمومیت خونی، بیماری کلیوی با احتیاط مصرف شود.

* نشت خارج عروقی را در تجویز وریدی دارو بررسی کنید (بافت مرده، زخم شدن و نکروز بافت)
* توزین روزانه با شروع درمان.

* در طی درمان، الکترولیتها، PH خون، PO₂ و بی کربنات را بررسی کنید.

* تعداد تنفس و تعداد ضربان قلب، ریتم و عمق تنفس را بررسی کنید و در صورت غیرطبیعی بودن، پزشک را آگاه کنید .

* با شیر نباید مصرف شود زیرا احتمال بروز سندرم شیر قلپا وجود دارد .

شرایط نگهداری : دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری گردد. از یخ زدگی محافظت گردد.



سدیم کلراید

گروه دارویی: کلرید سدیم

گروه درمانی: شستشو دهنده و جانشین سدیم و کلر

اشکال دارویی: sol for Irrigation = 0/9% nasal drops = 0/65% inf=0/45% (500ml – 1000ml)
(inf = 0/9% (500ml – 100ml – 5ml) inf = 5% (50ml – 500ml)

نوع شستشو:

موارد مصرف:

این محلول استریل و آپیروژن است که برای شستشوی حفرات بدن، بافت یا زخم، لوله-های درناژ در جراحی هم‌چنین برای شستن وسایل و نمونه‌های آزمایشگاهی و به طور کلی در مواردی که شستشو با محلول استریل و آپیروژن حاوی الکترولیت مجاز باشد مصرف می‌شود. هم‌چنین برای رقیق کردن یا به عنوان حامل داروهایی که برای شستشو به کار می‌رود نیز استفاده می‌شود و شستشوی بینی جهت حفظ رطوبت و رفع احتقان بینی

موارد منع مصرف:

- ۱- در جراحی‌هایی که مستلزم به کاربردن جریان الکتریکی هستند نباید استفاده شود.
- ۲- نباید به بیمار تزریق شود.

**نوع تزریقی: (جانشین سدیم و کلر)**

محلول ایزوتونیک (محلول ۰/۹٪ به عنوان جانشین شونده در حالاتی که با از دست رفتن کلرور سدیم یا آب بدن همراه است مصرف می‌شود. محلول هیپرتونیک (۵٪) در کمی سدیم خون و کمی کلرو خون به علت از دست رفتن الکترولیت‌ها، رقیق شدن شدید مایعات بدن به علت مصرف بیش از حد آب و همچنین در درمان فوری تخلیه شدید نمک بدن به کار می‌رود.

مقدار مصرف:

بر حسب نیاز بیمار توسط پزشک معالج مشخص می‌شود.

موارد منع مصرف:

محلول ۵٪ در صورت افزایش و یا حتی طبیعی بودن غلظت سرمی سدیم و کلر نباید استفاده شود.

نارسائی احتقانی قلب - اختلال کلیوی شدید - سیروز - ادم همراه با احتباس سدیم

عوارض جانبی: تحریک پذیری - سردرد - سرگیجه - ادم - هیپرتانسیون - هیپرناترمی

توجهات: * جهت جلوگیری از بروز ادم ریوی و عوارض موضعی محلول هیپرتونیک را آرام انفوزیون کنید

* در صورت تجویز محلول های فاقد پتاسیم ؛ احتمال بروز علائم هیپوکالمی را در نظر داشته باشید

* ست تزریق وریدی را حداقل هر ۴۸ ساعت یکبار تعویض کنید



سرم رینگر و رینگر لاکتات

گروه دارویی: محلولهای کریستالوئید جهت جبران کاهش مایعات یا الکترولیتها

اشکال دارویی: باکسترهای ۵۰۰ml و ۱۰۰۰ml

محلول تزریقی رینگر:

محلول تزریقی رینگر با غلظت ایزوتونیک $CA, K, NaCl$

موارد مصرف: در بیماران گاسترو آنتریت، شوک هیپوولمیک و جلوگیری از هیپوکالمی، جایگزین مایعات از دست رفته در حین عمل جراحی (در صورت نبودن رینگر لاکتات) در تغذیه پارانتال کوتاه مدت به همراه سایر محلول ها.

نکات قابل بررسی: در صورت تغییر رنگ و کدر بودن منع مصرف دارد.

افزودن محلول هیپرتونیک بیکربنات سدیم به داخل رینگر ممنوع است چون باکلسیم در رینگر رسوب کلسیم می دهد.

محلول رینگر لاکتات:

این سرم چند الکترولیتی CA, K, Na, CL ، لاکتات.

(محتویات محلول رینگر لاکتات تشابه بیشتری با محتوی خون دارد یون لاکتات موجود در این فراورده که به سرعت به یون بی کربنات متابولیزه می شود، در تنظیم تعادل اسید - باز دخالت دارد و اثر آن طی ۱-۲ ساعت کامل می شود).

موارد مصرف: در بیماران NPO استفاده می شود؛ اختلال تعادل آب و الکترولیت ها؛ قبل و پس از جراحی، اسیدوز، اسهال و سوختگی ها

موارد منع مصرف: نارسایی کبدی، کلیوی، قلبی، هیپاتیت، خیز، اسیدوز متابولیک و آلکالوز، در هیپوکالمی (چون لاکتات به بیکربنات تبدیل می شود و بیکربنات باعث انتقال K از خارج به داخل می شود).



سرم قندی نمکی

سرم قندی نمکی : dextrose saline

گروه دارویی : محلولهای کریستالوئید جهت جبران کاهش مایعات یا الکترولیتها

اشکال دارویی : سرم ۵۰۰ یا ۱۰۰۰ سی سی

مصرف در دوران حاملگی : مصرف در بارداری و شیردهی مجاز است

موارد مصرف : دکستروز سالین ۵٪ ایزوتونیک است و از نظر ترکیب شیمیایی مثل قندی ۵٪ و مانند نرمال سالین ۹٪ حاوی کلرید سدیم است تفاوت در حجم آب تزریقی می باشد. تامین آب و الکترولیت های مورد نیاز؛ گاستروآنتریت و مسمومیت ها ؛ انفوزیون این محلول در حین اعمال جراحی بیماران از احتباس سدیم مصنوعی خواهند بود. در اطفال بیشتر کاربرد دارد

مکانیسم اثر : این سرم شامل الکترولیت های سدیم، کلر و گلوکز می باشد. این میزان در ترکیبات مختلف متفاوت است مثلاً در سرم یک سوم دو سوم دکستروز ۳،۳٪ و سدیم کلراید ۰،۳٪ است. این نسبت در سرم قندی نمکی دکستروز ۵٪ و سدیم کلراید ۰،۹٪ است.

موارد منع مصرف : در بیمارانی که دچار ادم هستند، در هیپرناترمی، نارسایی کبدی و قلبی و کلیوی، در مورد بیماران کلیوی چیز خاصی دیده نشدو بیماران تحت درمان با کورتون و دیابتی ممنوع است..



سرم ۲/۳ و ۱/۳

گروه دارویی: محلولهای کریستالوئید جهت جبران کاهش مایعات یا الکترولیتها

اشکال دارویی: سرم ۵۰۰ یا ۱۰۰۰ سی سی

مصرف در دوران حاملگی: مصرف در بارداری و شیردهی مجاز است

۳/ ۱ نرمال سالین و ۲/۳ دکستروز ۵٪ ایزوتونیک است

موارد مصرف: دیابتی ، نارسایی کلیوی ، کبدی ، قلبی ، انفزیون این محلول در حین اعمال جراحی بخصوص اطفال از خطر احتباس NA مصون خواهند بود.



سفازولین

نام تجاری: Kefzol

گروه دارویی: سفالوسپورین نسل اول

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

شکل دارویی: آمپول (ویال)

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: عفونت های تنفسی ، دستگاه ادراری ، پوستی ، مجاری صفراوی ، عفونت

خون (سپتی سمی)، عفونت دریچه قلبی و پیشگیری قبل از عمل

میزان مصرف: ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلی گرم هر ۸ ساعت وریدی یا ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلی گرم هر

۶ تا ۸ ساعت عضلانی

موارد منع مصرف: حساسیت شدید به گروه پنی سیلین ها

عوارض جانبی: واکنش حساسیت ، عوارض کلیوی ، عوارض خونی ، توهم ، تشنج

توجهات: بیمار بعد از مصرف سفالوسپورین مستعد خونریزی می شود.

*تزیق وریدی سریع دارو علاوه بر آسیب به جدار رگ باعث تهوع و استفراغ شدید می شود .

*کنترل کردن سطح BUN – Crat بیمار

آموزش: هر گونه خون دماغ شدن را به پزشک اطلاع دهید.

* هر گونه اسهال و علائم عفونت ثانویه را اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.



سفالکسین

نام تجاری: Keflex

گروه دارویی: سفالوسپورین نسل اول

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

شکل دارویی: کپسول و شربت

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: عفونت های تنفسی ، عفونت های گوش میانی ، عفونت های پوستی
استخوان و مفاصل و عفونت ادراری – تناسلی

میزان مصرف: روزانه ۱ تا ۴ گرم : هر ۶ ساعت ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلی گرم معمول است.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید به پنی سیلین ها

عوارض جانبی: آلرژی ، کهیر ، اسهال ، خارش

توجهات: در صورت مصرف طولانی مدت عملکرد کلیه و کبد کنترل شود .

*بیمار از نظر واکنش آلرژیک مانند خارش و کهیر بررسی شود.

آموزش: هر گونه علائم نشان دهنده حساسیت را به پزشک اطلاع دهید.

* دارو را در ساعات معین مصرف کنید.



سفتازیدیم

نام تجاری: ceftazid- Fortum

گروه دارویی: سفالوسپورین نسل سوم

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

شکل دارویی: ویال ۰/۵ و یک و دو گرم

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: عفونت ریوی ، عفونت ادراری - پوستی ، عفونت استخوان ، آبسه های داخل شکم ، عفونت پرده مغز (مننژیت)

میزان مصرف: ۰/۵ تا ۱ گرم سفتازیدیم از راه عضلانی

موارد منع مصرف: حساسیت شدید ، افراد مستعد خونریزی ، ولی در افراد با سابقه کم خونی و تشنج یا مشکلات کلیوی با احتیاط مصرف شود.

عوارض جانبی: خارش ، کهیر ، ادم ، عارضه کلیوی، درد محل تزریق

توجهات: در صورت اسهال شدید دارو را قطع کنید.

*دارو باید در زمان خاصی مصرف گردد .

*دورهء درمان باید رعایت شود.

آموزش: هر گونه عفونت در محل جدید را به پزشک اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: در دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه نگهداری شود.



سفترياکسون

نام تجاری: Rocephin

گروه دارویی: سفالوسپورین نسل سوم

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

شکل دارویی: ویال ۲۵۰ میلی گرمی، ۵۰۰ میلی گرمی، و ۱ گرمی

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: عفونت های تنفسی، عفونت پوست و استخوان و کلیه

میزان مصرف: ۱ تا ۲ گرم هر ۱۲ ساعت تا ۴ گرم حداکثر مصرف روزانه است. در مورد عفونت

گنوره تزریق یک بار ۱۲۵ تا ۲۵۰ میلی گرم به همراه مصرف ۷ روز داکسی سیکلین

موارد منع مصرف: حساسیت شدید، افراد مستعد خونریزی، ولی در افراد با سابقه کم خونی و تشنج یا مشکلات کلیوی با احتیاط مصرف شود.

عوارض جانبی: آلرژی، عوارض خونی، اسهال، ضایعات کیسه صفرا، درد محل تزریق

توجهات: این دارو تمایل به خونریزی را افزایش می دهد. *نباید با محلولهای حاوی کلسیم

ماندیرینگر رقیق شود. *محلولهای حاوی کلسیم تا ۴۸ ساعت پس از آخرین دوز سفترياکسون مصرف نشود.

*انفوزیون وریدی در نوزادان حداقل طی ۶۰ دقیقه و در سنین بالاتر حداقل طی ۳۰ دقیقه انجام شود.

* تزریق این فراورده صرفاً در مراکز مجهزه سیستم احیا انجام گردد.

*مصرف همزمان سفترياکسون با محلولهای حاوی کلسیم حتی به صورت انفوزیون از رگهای متفاوت

ممنوع میباشد. *در نوزادان هیپربیلیروبینمی به ویژه در نوزادان نارس منع مصرف دارد.

*در صورت نیاز به مصرف همزمان سفترياکسون با داروهائی مانند وانکومايسين؛ سفالوسپورینها؛ پنی

سیلین و آمینو گلیکوزیدها باید در دو محل جداگانه (دورگ مجزا) تزریق شوند.

آموزش: هر گونه اسهال یا شل شدن مدفوع را به پزشک اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.



سفیکسیم

نام تجاری: Cephoral

گروه دارویی: سفالوسپورین نسل سوم

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

شکل دارویی: کپسول - سوسپانسیون - قرص

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: سوزاک، عفونت گوش میانی، فارنژیت، عفونت های بخش تحتانی دستگاه تنفس و عفونت های مجاری ادراری

موارد منع مصرف: در صورت وجود سابقه حساسیت به پنی سیلین ها ، سفالوسپورین ها یا پنی سیلامین یا ابتلای به پورفیری این دارو نباید مصرف شود .

عوارض جانبی: درد شکم - کاهش اشتها - تهوع - استفراغ - کهیر - راش - واژینیت - خارش تناسلی - تب دارویی - آنافیلاکسی

توجهات: *در صورت اسهال شدید دارو را قطع کنید.

*دارو باید در زمان خاصی مصرف گردد .

*دارو باید به مدت ۱۴-۱۰ روز ادامه یابد تا از ریشه کن شدن میکروارگانیسم و عدم سوار شدن عفونت ثانویه اطمینان حاصل گردد .

*سوسپانسیون این دارو را قبل از مصرف خوب تکان دهید و تا ۱۴ روز در یخچال قابل نگهداری است



سولفات منیزیم

نام تجاری: Sulmages

گروه دارویی: سولفات منیزیم

گروه درمانی: ضد تشنج (به ویژه در حاملگی)

شکل دارویی: ویال

مصرف در دوران حاملگی: گروه D

موارد مصرف: در مسمومیت حاملگی (کلامپسی و پره اکلامپسی) ، در خانم حامله و کسانی که از راه دهان تغذیه نمی کنند و مجبوریم دارو و مواد ضروری را از راه ورید های محیطی به آنها برسانیم.

میزان مصرف: در کنترل تشنج و پیشگیری آن ۴ گرم محلول ۱۰ یا ۲۰ درصد در عرض ۳ تا ۴ دقیقه در بدن یا در سرم دکستروز طی نیم ساعت انفوزیون وریدی شود.

موارد منع مصرف: در انفارکتوس قلبی و بلوک قلبی منع مصرف دارد.

عوارض جانبی: سردرد ، گرگرفتگی ، کاهش فشار خون ، فلج تنفسی ، تعریق ، تهوع ، خواب آلودگی ، احساس تشنگی

توجهات: علائم حیاتی بیمار حین تزریق کنترل شود.

* سطح سرمی منیزیموم بررسی شود.

* حتما آمپول کلسیم گلوکونات وریدی را در دسترس و آماده داشته باشید.

* هنگام تزریق وریدی این دارو علائم حیاتی را هر ۱۵ min چک کنید.

* برون ده ادراری در هر ۴ ساعت باید حداقل ۱۰۰ CC باشد.

* از بین رفتن رفلکس زانو پاتالاولین علامت مسمومیت دارویی است.

آموزش: در صورت بروز تهوع و استفراغ ، مشکلات قلبی و تنفسی اطلاع به پزشک ضروری است چون علائم مسمومیت است.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.



سولفاستامید (چشمی)

نام تجاری: AK-Sulf

گروه دارویی: سولفاستامید

گروه درمانی: آنتی بیوتیک چشمی

شکل دارویی: قطره چشمی

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: عفونت چشمی ، کراتیت چشمی

میزان مصرف: ۱ تا ۲ قطره هر ۱ تا ۳ ساعت

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی و عفونت های ویروسی آبله مرغان و تب

خال ، عفونت قارچی چشم

عوارض جانبی: سر درد ، تورم ، حساسیت موضعی چشم ، حساسیت جلدی

توجهات: یک آنتی بیوتیک وسیع الطیف است.

آموزش: طی شیردهی و حاملگی با احتیاط تجویز شود.

شرایط نگهداری: در جای خنک (۱۵ تا ۸ درجه) و دور از نور نگهداری شود.



سیپروفلوکساسین

نام تجاری: Ciproxin

گروه دارویی: فلوروکینولون

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

شکل دارویی: قرص و تزریقی

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: عفونت های ادراری، عفونت ریوی، پوستی و التهابی مجاری ادراری و استخوانی.

موارد منع مصرف: حساسیت به فلوروکینولونها و نالیدیکسیک اسید

عوارض جانبی: عوارض گوارشی مثل سوء هاضمه، تهوع، تشنج، خواب آلودگی، ضایعات پوستی مثل راش، آسیب کلیوی، کندی بالا رفتن فشار خون، کم خونی

توجهات: در صورت بروز اسهال باید بیمار را از نظر آب و الکترولیت اداره کرد. *مصرف مایعات کافی به همراه دارو توصیه می شود. *در نارسایی کلیه میزان دارو باید کاهش یابد.

*انفوزیون سایر داروها در حین انفوزیون سیپروفلوکساسین باید قطع شود .

*دارو حساسیت به نور می دهد در طول مصرف دارو از معرض قرارگیری در مقابل نور مستقیم خورشید پرهیز نموده ویا از ضد آفتاب و لباس پوشیده استفاده شود.

*در صورت بروز هرگونه واکنش روانی – نورولوژیک یا حساسیت مفرط با مصرف اولین مقدار دارو مصرف آن را باید قطع کرد .

بین مصرف سیپرو و آنتی اسید باید ۴ ساعت فاصله باشد. *افرادی که سابقه تشنج (صرع) دارند قبل از مصرف دارو با پزشک مشورت کنند.

شرایط نگهداری: در دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه نگهداری شود.



فروس سولفات

نام تجاری: Apo – Ferrous sulfate

گروه دارویی: ترکیب آهن

گروه درمانی: ضد کم خونی

شکل دارویی: قرص ، شربت ، قطره

مصرف در دوران حاملگی: گروه A

موارد مصرف: به عنوان مکمل غذایی، خونساز و کم خونی فقر آهن

میزان مصرف: در درمان کم خونی فقر آهن یک قرص ۲ تا ۴ بار در روز برای پیشگیری یک قرص روزانه استفاده شود.

موارد منع مصرف: هموکروماتوزیس و هموسیدوز ، زخم حاد معده، بیماری کرون

عوارض جانبی: دل درد ، بی اشتهاپی ، اسهال

توجهات: *ویتامین C جذب آهن را افزایش می دهد.

*این دارو در کم خونی طی حاملگی کاربرد وسیع دارد.

آموزش: بهتر است قرص را با آب میوه یا شربت معده میل کنید.

*مصرف همزمان آهن با تخم مرغ ، قهوه ، یا چای جذب آن را کاهش می دهد.

*برای جلوگیری از تغییر رنگ دندان ها ، شربت را با نی مصرف کنید.

*میزان اندک دارو (چند تا قرص) هم میتواند باعث مسمومیت در کودکان شود.

*برای جلوگیری از یبوست با غذا سبزی بیشتری مصرف کنید.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.



فنازوپیریدین

نام تجاری: phenazodine

گروه دارویی: رنگ آزو

گروه درمانی: ضد درد مجاری ادرار

شکل دارویی: Tablet: 100mg

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: رفع درد ناشی از عفونت یا تحریک مجاری ادرار

موارد منع مصرف: حساسیت مفرط نسبت به فنازوپیریدین، نارسایی کلیه، گلومرولونفریت، هپاتیت شدید، پیلونفریت حین بارداری.

عوارض جانبی: تغییر رنگ ادرار به نارنجی متمایل به قرمز، سرگیجه، سردرد، سوءهاضمه، درد یا کرامپ معده، متهموگلوبینمی، ضعف یا خستگی غیرعادی، زرد شدن چشمها یا پوست، افزایش فشارخون.

توجهات: *فنازوپیریدین را باید تنها به عنوان یک داروی ضد درد تجویز کرد.

*این دارو را می توان همراه با یک آنتی بیوتیک، برای درمان عفونتهای مجاری ادرار استفاده کرد.
*در صورت زرد شدن اسکلرا مصرف دارو باید قطع گردد.

*این دارو ممکن است رنگ ادرار را به رنگ قرمز یا نارنجی تغییر دهد و موجب لک شدن لباسها شود.
لک روی لباسها را می توانید با محلول ۰/۲۵ درصد سدیم دی تیونات یا هیدروسولفیت پاک کنید.
*در صورت فراموش کردن یک نوبت مصرف دارو، به محض به یاد آوردن، آن را مصرف کنید و از دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی خودداری نمایید.

*در طول مصرف فنازوپیریدین از لنزهای تماسی استفاده نکنید، زیرا می تواند در لنزهای تماسی لکهای رنگی ایجاد نماید. *فنازوپیریدین را بیشتر از دو روز استفاده نکنید، مگر اینکه پزشک به شما توصیه کند.



فلومازنیل

نام تجاری: Anexate

گروه دارویی: آنتاگونیست بنزودیازپین.

گروه درمانی: آنتی دوت

مصرف در دوران بارداری: گروه C

شکل دارویی: Injection: 0.1 mg/ml, (5ml)

موارد مصرف: درمان مسمومیت با بنزودیازپین ها ؛ آنسفالوپاتی کبدی و رفع اثر بنزودیازپینها پس از پایان بیهوشی

موارد منع مصرف: حساسیت مفرط به فلومازنیل یا بنزودیازپینها؛ وجود علائم مصرف بیش از حد ضدافسردگیهای سه حلقه‌ای

عوارض جانبی: تهوع ، استفراغ ، سردرد ، سرگیجه ، تشنج ، بی نظمی ریتم قلب ، لرزش دست و پا ، خواب آلودگی

توجهات: *بیمار می بایست از نظر عملکرد کبدی بررسی شود.

* محل تزریق ممکن است درد ناک باشد.

*بعد از دریافت دارو ، از رانندگی اجتناب کنید

*در زمان مصرف ممکن است تشنج رخ دهد، امکانات لازم را آماده نمایید مخصوصا بیمارانی که تحت درمان با آرام بخش ها بوده و به طور ناگهانی قطع کرده اند .

*واکنش های آلرژیک رامد نظر داشته باشید : گرگرفتگی ؛ راش ؛ کهیر و خارش .

*بررسی بیمار از نظر افزایش ICP ویا تروما به سر لازم است .

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.



فنوباربیتال

نام تجاری: luminal

گروه دارویی: باربیتورات ها

گروه درمانی: ضد تشنج

شکل دارویی: قرص و آمپول

مصرف در دوران حاملگی: گروه D

موارد مصرف: درمان تشنج (صرع)، تشنج نوزادی یا تشنج به دنبال ضربه، تشنج زمان

حاملگی و به عنوان بی حس کننده موضعی

میزان مصرف: در کنترل تشنج ۱۵ تا ۲۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم طی ۱۰ تا ۳۰

دقیقه انفوزیون شود.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، نارسایی کلیه و کبد، پورفیری

عوارض جانبی: اختلال هوشیاری، خواب آلودگی، اختلال خونی، ضایعات حساسیتی

موضعی، سردرد، بی قراری، اضطراب

توجهات:

*کاهش فشار خون و اختلال تنفس و افزایش ضربان قلب جزء علامت مسمومیت است.

*قرص نباید جویده شود.

آموزش: نوع تزریقی برای افرادی استفاده می شود که قادر به استفاده خوراکی نیستند.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.



فنی توئین

نام تجاری: Dilantin

گروه دارویی: هیدانتوئین ها

گروه درمانی: ضد تشنج - ضد صرع

شکل دارویی: شربت ، کپسول ، آمپول

مصرف در دوران حاملگی: گروه D

موارد مصرف: تشنج ، بی نظمی های ریتم قلبی (آریتمی) ، تشنج در حاملگی ، سکسکه مقاوم

نکته: کامپاند آن ترکیب فنی توئین و فنوباریتال می باشد. نوع کرم موضعی آن در زخم بستر ، خراش پوستی و آبسه های بزرگ مفید است.

میزان مصرف: در انواع صرع متفاوت است.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، اختلال قلبی (بلوک قلبی)، نارسایی کبدی

عوارض جانبی: تزریق عضلانی آن به علت درد و آسیب محل تزریق توصیه نمی شود. مهار توانایی مغز و کاهش فشار خون ، سردرد ، کاهش اشتها

توجهات: * بدون تجویز پزشک نباید مصرف شود.

* جا به جایی دارو های ضد تشنج باید طبق دستور پزشک انجام شود.

* در انفوزیون وریدی فقط میتوان با سرم نرمال سالین رقیق و انفوزیون نمود (مابقی سرمها رسوب تشکیل می شود).

آموزش: شربت را قبل از مصرف به خوبی تکان دهید.

* این دارو باعث خواب آلودگی می شود.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی و دور از نور نگهداری شود.



فورسماید

نام تجاری: Lasix

گروه دارویی: دیورتیک

گروه درمانی: ضد فشار خون

شکل دارویی: قرص ۴۰mg و آمپول ۴۰mg و ۲۰mg

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: کنترل فشار خون، نارسایی مزمن کلیوی، سیروز کبدی، نارسایی احتقانی قلب

میزان مصرف: ۰/۵ تا یک قرص روزانه استفاده شود. در ادم ریوی شدید به صورت وریدی با یک آمپول شروع و اثر آن بررسی می شود. در فشار خون بالا حداکثر میزان مصرف ۶۰۰ میلی گرم در روز است.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی و افرادی که امکان ادرار کردن ندارند. (آنوری دارند)

عوارض جانبی: سردرد، سرگیجه، تاری دید، دل درد، اسهال، بی اشتهایی، اختلال الکترولیت ها، زردی، ضایعات پوستی، مشکلات خونی و نارسایی کبد.

توجهات: این دارو ادرارآور سریع الاثر است.

*بیمار باید وزن شود. *در صورت تهوع یا استفراغ شدید به پزشک اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: دور از نور و در دمای اتاق نگهداری شود.



فیبرینوژن

نام تجاری: plasmin - Elase

گروه دارویی: مشتق خون

گروه درمانی: عامل انعقاد خون

شکل دارویی : Injection, Powder: 1g

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: موارد مصرف: برای کنترل خونریزی، در خونریزی ناشی از DIC یا جدا شدن زودرس جفت در حاملگی و پس از جراحی قلب و ریه به کار می رود. در بیماران با کمبود ارثی فیبرینوژن

میزان مصرف: ۳ تا ۸ گرم فیبرینوژن با سرعت ۵ تا ۱۰ میلی لیتر در دقیقه انفوزیون شود.

موارد منع مصرف: بیماران با سابقه حساسیت شدید (آنافیلاکسی) به این فرآورده

توجهات: * بیماران با کمبود ارثی فیبرینوژن در معرض خطر ترومبوز قرار دارند، به دنبال تجویز فرآورده نیز احتمال واکنش های ترومبوتیک وجود دارد.

* از آنجا که این فرآورده از پلاسمای انسانی به دست می آید، احتمال انتقال برخی بیماری های عفونی ضمن تجویز آن وجود دارد. * ویال محتوی فرآورده، توسط ۵۰ میلی لیتر آب استریل جهت تزریق رقیق شود. جهت حل شدن فرآورده، ویال بین دو دست چرخانده شده و از تکان دادن آن پرهیز کنید. محلول رقیق شده باید شفاف باشد.

* محلول رقیق شده به مدت ۲۴ ساعت در دمای ۲۵-۲۰ درجه سانتی گراد پایدار است.

* ویال رقیق نشده فرآورده، در دمای ۲۵-۲۰ درجه سانتی گراد به مدت ۳۰ ماه قابل نگهداری است.

شرایط نگهداری: در یخچال نگهداری شود.



کاپتوپریل

گروه دارویی: ضد هیپرتانسیون، داروی کمکی در درمان نارسایی احتقانی قلب.

اشکال دارویی: قرص ۲۵mg و ۵۰mg

مصرف در حاملگی: گروه C

مکانیسم اثر: این دارو با مهار آنزیم آنژیوتانسین فشار خون (از مسیر مربوط به عروق کلیه) را پایین می آورد.

مقدار مصرف: در فشار خون بالغین ۲۵mg-۶/۲۵ از راه خوراکی سه بار در روز ممکن است تا ۵۰mg سه بار در روز افزایش یابد.

موارد منع مصرف: در حاملگی گروه C است. مصرف بی ضرر در دوران شیردهی و کودکان ثابت نشده است.

عوارض جانبی: سردرد، سرگیجه، بی خوابی، خستگی، افزایش خفیف سرعت ضربان قلب، تهوع، استفراغ، درد شکمی، یبوست، اسهال، خشکی دهان، کم اشتها، هیپرکاپنی، بثورات پوستی، درد مفاصل



کتورولاک

شکل دارویی: قرص 10mg و آمپول 30mg

مصرف در بارداری: جزو گروه C

موارد مصرف:

این دارو از دسته داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی (NSAIDs) مهارکننده سیکل اکسیژناز می باشد که برای درمان کوتاه مدت (نهایتاً ۵ روز) دردهای نسبتاً شدید و حاد که نیاز به مسکن هایی در سطح داروهای مخدر دارند استفاده می شود. هم چنین اثربخشی این دارو در درمان حملات حاد و شدید میگرن نیز مشاهده شده است.

میزان مصرف:

بیماران با سن کمتر از ۶۵ سال: یک دوز دارو به مقدار 60 mg به صورت عضلانی یا 30 mg به صورت وریدی حداقل در مدت ۱۵ ثانیه تزریق می شود.

بیماران با سن بیشتر از ۶۵ سال: افراد با وزن کمتر از 50 kg و افراد مبتلا به نارسایی کلیوی تک دوز دارو به مقدار 30 mg به صورت عضلانی یا 15 mg به صورت وریدی در مدت ۱۵ ثانیه تزریق می شود.

موارد منع مصرف:

- ۱- حساسیت به آسپرین یا سایر داروهای NSAIDs که می توانند شامل آسم - آنژیوادم - کهیر و رنیت باشد.
- ۲- بیماری انعقادی
- ۳- بیماری قلبی - عروقی از قبیل نارسایی قلب - بیماریهای ایسکمیک قلب - اختلالات عروقی مغز و اختلال شریانهای محیطی
- ۴- بیماران دارای علائم نارسایی کلیوی - یا کبدی شدید و بیماران مبتلا به فشار خون بالا

عوارض جانبی:

(شدید) خونریزی رکتوم - خونریزی یا زخم های درشت در ناحیه لب - سیاه شدن لبها و ناخن ها - درد قفسه سینه - تشنج - ضعف شدید - کوتاه شدن تنفس - تنفس سریع، نامنظم و صدادر (در صورت بروز این علائم مصرف دارو باید قطع شود)
عوارض خفیف تر شامل: تورم در نقاط مختلف بدن - تب - درد شکم یا معده - تهوع - آبریزش بینی - بی قراری و ...



کلرپرومازین

نام تجاری: Largactile

گروه دارویی: فنوتیازین ها

گروه درمانی: ضد سایکوز، آرامبخش ؛ ضد استفراغ

شکل دارویی: قرص و آمپول

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: اختلالات شدید روانی (سایکوز) یا حملات حاد مانیا و به عنوان آرامبخش ، رفع سسکه مقاوم، بی اشتهایی عصبی ، میگرن و فشار خون حاملگی ، درمان وابستگی به مخدر ها و در نوزادان دیستونی گردنی

میزان مصرف 25: میلی گرم عضلانی تزریق شود و در صورت لزوم تکرار شود. در تهوع و استفراغ ۱۰ تا ۲۵ میلی گرم هر ۴ تا ۶ ساعت خوراکی

موارد منع مصرف:

حساسیت شدید، حالت کوما منع مصرف دارد ولی در بیماران تنفسی و کبدی و تشنجی یا مصرف کنندگان داروهای همزمان اعصاب و روان با احتیاط مصرف شود.

عوارض جانبی: خواب آلودگی ، کاهش فشار خون ، عوارض چشمی ، کهیر ، آسم ، تورم حنجره ، تغییر رنگ پوست

توجهات: * پزشک می بایست سابقه بیماران مبتلا به آسم ، تشنج و کهیر را بررسی کند.

* داروهای اعصاب و روان دیگر تجویز نکند. * علائم حیاتی بیمار باید توسط پرستار کنترل شود.

* در صورت نیاز به ملوگرافی (رادیو گرافی نخاع با ماده) ۴۸ ساعت قبل دارو را قطع کنید.

آموزش: از رانندگی و کارهای دقیق خودداری شود. * استفاده از الکل و داروهای خواب آور همزمان اجتناب شود. * خشکی دهان از عوارض شایع است، مایعات بیشتر مصرف شود. * بیمار باید در انجام آزمایش های حین درمان همکاری کند. * بیمار نباید در گرما و یا سرما قرار بگیرد.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق و دور از نور نگهداری شود.



کلردیازپوکساید

نام تجاری: Librium

گروه دارویی: بنزودیازپین‌های طول‌الاثر

گروه درمانی: ضد اضطراب - آرام بخش - خواب آور

شکل دارویی: قرص

مصرف در دوران حاملگی: گروه D

موارد مصرف: اضطراب و بیخوابی - قطع مصرف الکل - اضطراب قبل از جراحی

موارد منع مصرف: حساسیت مفرط ؛ شوک ؛ کوما ؛ گلوکوم ؛ نوزادان

عوارض جانبی: سرگیجه، خواب‌آلودگی، سردرد، تحریک‌پذیری، ضعف و خستگی، یبوست، خشکی دهان، تهوع، استفراغ، بی‌اشتهایی، خارش، کاهش فشارخون، تاری دید و وزوز گوش

توجهات: * پس از مصرف دارو، از رانندگی و کارهایی که نیاز به دقت و هوشیاری دارد، خودداری کنید.

* در صورتی که هنگام مصرف کلردیازپوکساید دچار مشکلات گوارشی می‌شوید، سعی کنید دارو را با غذا یا شیر میل کنید.

* همچنین اگر بیمارتان نمی‌تواند قرص کامل را بلع کند، آن را خرد کنید.

* در صورت خشک شدن دهان متعاقب مصرف دارو، از آب‌نبات، آدامس و یا مزه‌مزه کردن آب استفاده کنید.

* از وضعیت خوابیده به نشسته یا ایستاده و یا از حالت نشسته به ایستاده آرام تغییر وضعیت دهید تا دچار سرگیجه، سیاهی رفتن چشم یا غش نشوید.



کلرفنیر آمین مالتات

گروه دارویی: الکیل آمین

گروه درمانی: ضد حساسیت، ضد تهوع؛ آرام بخش

شکل دارویی: قرص و فرم تزریقی

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: درمان علامتی حساسیت‌ها، کهیر، آنژیوادم، آب ریزش و بیماری‌های

التهابی پوستی

میزان مصرف: ۴ میلی‌گرم هر ۴ تا ۶ ساعت و نوع تزریقی ۱۰ تا ۲۰ میلی‌گرم تزریق

شود.

موارد منع مصرف: حساسیت به آنتی‌هیستامین‌ها ولی در آسم با احتیاط مصرف شود.

عوارض جانبی: خواب‌آلودگی، گیجی، خشکی دهان، مشکلات خونی و گوارشی

توجهات: در افراد با زخم معده، آب سیاه‌چشم و احتباس ادراری با احتیاط مصرف شود.

آموزش: * این دارو را می‌بایست به میزان کمتری در سالمندان استفاده کرد.

* رانندگی بعد از مصرف دارو ممنوع است.

* مصرف همزمان داروهای خواب‌آور ممنوع می‌باشد.

* از مایعات کافی استفاده شود.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.



کلسیم گلوکونات

نام تجاری: Kalciumate

گروه دارویی: جایگزین کلسیم

گروه درمانی: اختلالات الکترولیتی

شکل دارویی: قرص و آمپول

مصرف در دوران حاملگی: گروه A

موارد مصرف: درمان کمبود کلسیم حاد، بالا بودن پتاسیم، بالا بودن منیزیم، ایست قلبی

میزان مصرف: روزانه ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلی گرم خوراکی

موارد منع مصرف: بالا بودن کلسیم خون و سنگ کلیوی

عوارض جانبی: یبوست، خشکی دهان، بی‌اشتهایی

توجهات: *در صورت مشاهده رسوب دارو را تزریق نکنید. *در ایست قلبی توصیه نمی شود مگر اینکه هیپرکالمی یا هیپوکالمی وجود داشته باشد. *تزریق وریدی در اطفال باید با احتیاط صورت بگیرد. *تزریق باید با استفاده از سوزنی دهانه باریک؛ درون وریدی بزرگ تزریق گردد؛ *در صورتی که نشأت به وجود آید ممکن است نکرóz ایجاد شود. *بعد از تزریق داخل وریدی به مدت نیم ساعت بیمار را در وضعیت به پشت خوابیده نگه دارید.

آموزش: در صورت ناراحتی گوارشی نیم ساعت بعد از غذا دارو را مصرف کنید. *مواد غذایی غنی از کلسیم (لبنیات؛ گوشت ماهی؛ سبزیجات برگ سبز) بکاربرید و مواد غذایی سرشار از اگزالات و روی (لوبیا؛ عدس؛ نخود؛ شکلات؛ اسفناج) را بکار نبرید.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی و در جای خشک نگهداری شود.



کلوتریمازول

نام تجاری : Lotrimin

گروه دارویی: مشتق صنعتی ایمیدازول

گروه درمانی: ضدقارچها

شکل دارویی: قرص واژینال، کرم جلدی و واژینال

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: کاندیدیاز Vulvovaginitis؛ کاندیدیاز پوستی؛ کچلی تنه / پا/ ران

عوارض جانبی :

کلوتریمازول به ندرت موجب عوارض جانبی می شود. کرم های پوستی و شیاف های واژن گاهی اوقات سوختگی یا تحریک موضعی ایجاد می کنند.

موارد منع مصرف: حساسیت مفرط

توجهات : قبل و بعد از بکارگیری دارو موازین آسپتیک را رعایت کنید و دست هارا بشوئید .

*به منظور پیشگیری از عفونت مجدد دوره درمان را کامل کنید .

شرایط نگهداری: در دمای معمولی و در جای خشک نگهداری شود.



کلیندا مایسین

نام تجاری: Dalacin

گروه دارویی: آنتی بیوتیک

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

شکل دارویی: کپسول ، محلول و پوستی و آمپول، کرم و شیاف واژینال

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: عفونت های ریوی ، پوستی و استخوانی ، درمان کمکی ایدز و عفونت های میکروبی واژن و مالاریا

موارد منع مصرف: حساسیت شدید، نارسایی کلیه

عوارض جانبی: ضایعات پوستی ، خارش ، تهوع ، استفراغ ، کاهش وزن ، التهاب مری و معده ، اسهال شدید ، احساس طعم فلز در دهان

توجهات: * کلیندامایسین را هیچگاه نباید به سرعت وارد ورید بیمار کرد (بولوس) .

* تست های کبدی برای بیمار می بایست انجام شود. * تست های شمارش سلول خون انجام شود. * کنترل BP و تعداد ضربان قلب اهمیت دارد و چون دارو باعث هیپوتانسیون میشود. * افت فشار خون جزء عوارض احتمالی است مد نظر داشته باشید . تزریق عضلانی باید به شکل عمیق صورت گیرد * سرعت تجویز وریدی دارو نباید بیشتر از ۱۲۰۰ میلی گرم در ساعت تجاوز کند هرچه سرعت تزریق کمتر باشد خطر آریتمی قلبی کاهش می یابد. * مصرف در نوزادان و زنان باردار ممنوع است . * طی درمان شیردهی باید متوقف شود. * از مصرف همزمان اریترومایسین و کلیندامایسین خودداری شود. * محل تزریق وریدی مرتباً تعویض شود.

آموزش: دارو (کپسول) را با یک لیوان کامل آب مصرف کنید. * دوره درمانی خوراکی یا تزریقی را کامل کنید. * بروز اسهال را به پزشک اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: محلول را در یخچال نگهداری کنید . کپسول را در دمای اتاق نگهداری کنید.



کلوگز اسیلین سدیم

نام تجاری: Orbenim

گروه دارویی: آنتی بیوتیک

گروه درمانی: پنی سیلین مقاوم به پنی سیلیناز

شکل دارویی: کپسول و تزریقی

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: عفونت های میکروبی با استاف طلائی (میکروبی است که تولید کننده

پنی سیلیناز است)، عفونت های پوستی و دستگاه تنفس

میزان مصرف: ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلی گرم هر ۶ ساعت

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی

عوارض جانبی: کهیر ، تهوع و اسهال و عوارضی دیگر مشابه پنی سیلین ها

توجهات:

* دوره درمان می بایست کامل باشد.

* تاریخچه حساسیت به پنی سیلین ها را از بیمار بپرسید.

* در دوره مصرف طولانی مدت آزمایش های خونی انجام شود.

* عملکرد کلیوی می بایست بررسی شود.

* اثربخشی قرص های ضد بارداری را کاهش می دهد.

* آنفوزیون وریدی باید در مدت بیش از ۴۰ دقیقه انجام گردد.

شرایط نگهداری :

داروی خشک را در دمای زیر ۳۰^{OC} درون جعبه و دور از نور نگهداری شود.



کنتراسپتیو OCP , Oral contraceptive pill

نام تجاری : Marvelon - Yasmin

گروه دارویی : استروژن و پروژستین

گروه درمانی: ضد بارداری

اشکال دارویی: قرصهای: LD- HD -مارولون - یاسمین

مصرف در دوران حاملگی: گروه X

موارد مصرف: جلوگیری از حاملگی

موارد منع مصرف: بیماری قلبی - عروقی ، بیماری عروقی مغز، بیماری حاد کبد، سرطان پستان و رحم، خونریزی رحمی با علت ناشناخته، شک به وجود بارداری

عوارض جانبی: لکه بینی و بی نظمی عادت ماهانه، تهوع، سردردهای خفیف، دردناک شدن پستانها، مختصری افزایش یا کاهش وزن و تغییر خلق و خو.

توجهات: * خوردن قرص بعد از شام و قبل از خواب معمولاً به جلوگیری از بروز این عارضه ها کمک می کند. *قرصها نباید یکماه در میان یا دو ماه در میان و یا چند روز در میان مصرف شوند. *در هفته اول استفاده از "قرص" که هنوز مقدار هورمون در خون به حد مطلوب نرسیده است برای اطمینان بیشتر، علاوه بر "قرص" باید از روش دیگری نیز (مثل کاندوم) استفاده کرد. *اگر یک شب خوردن قرص را فراموش کند به محض اینکه متوجه این نکته شد باید قرص را بخورد. اگر تا شب بعد به یادش نیامد، (فراموشی دو شب) شب بعد سه قرص بخورد و برای اطمینان تا تمام شدن قرصهای آن بسته از روش دیگری (کاندوم) نیز استفاده کند. اگر سه شب پشت سرهم (یا بیشتر) خوردن قرص فراموش شده باشد باید از خوردن بقیه قرصها خودداری گردد و از روش دیگری برای جلوگیری از حاملگی استفاده شود تا قاعدگی آغاز گردد. سپس از روز پنجم قاعدگی خوردن قرصهای بسته جدید آغاز شود. توصیه: دارو را در محیط تاریک نگهدارید.



کوتریموکسازول

نام تجاری : Bac ter im

گروه دارویی : سولفونامید و آنتاگونیست اسید فولیک

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

اشکال دارویی: قرص، شربت ؛ آمپول 400mg/5ml

مصرف در دوران حاملگی: گروه B-در اواخر حاملگی گروه D

موارد مصرف: آنتی بیوتیک پرمصرفی است که اغلب در درمان عفونتهای ادراری ؛ گوارشی و تنفسی ، اوتیت میانی ؛ اسهال مسافران ؛ وبا

دوز معمول آن در بزرگسالان دو قرص هر دوازده ساعت است. کوتریموکسازول به طور کامل در دستگاه گوارش جذب شده و پس از چهار ساعت به اوج اثر می رسد.

منع مصرف :در مبتلایان به فاویسم و آنمی مگالوبلاستیک باید اجتناب کرد

عوارض جانبی : سندرم استیون جانسون

توجهات : * محلول در مدت ۹۰-۶۰ دقیقه تجویز شود .

* با سایر داروها ناسازگاری دارد .

* نباید در دمای یخچال نگهداری شود .

* از تزریق بولوس یا سریع دارو اجتناب کنید .

* در زمان مصرف دارو از قرار گرفتن در معرض نور آفتاب خودداری کرده ویا از ضد آفتاب استفاده نموده.

* مایعات فراوان میل نمائید.



لابتالول

دسته داروئی: ضد فشار خون

شکل داروئی: (5mg/mL) آمپولکه می توان آن را وریدی ، بصورت تزریق یکباره (bolus) یا

انفوزیون مداوم مصرف نمود وقرص

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: افزایش فشار خون حاملگی علاوه بر آن در زنان حامله ای که افزایش فشار خون به

همراه proteinuria دارند نیز موثر بوده و proteinuria را کاهش داده و از تشنج حاملگی

(eclampsia) نیز جلوگیری می کند. -لابتالول وریدی در بیماران دارای فشار خون شدید در

اورژانس ها استفاده می شود. -کنترل کاهش فشار خون طی بیهوشی :لابتالول وریدی از طریق

کاهش خونریزی حاصله از عمل جراحی باعث کنترل کاهش فشار خون می شود. آنژین صدری -

Tetanus در نارسایی قلبی -عروقی شامل افزایش فشار خون ، تاکی کاردی وافزایش مقاومت

سیستم شریانی در بیمارانی که دارای انقباض متداوم عضلانی هستند بسیار مؤثر است.

عوارض جانبی: سرگیجه یا حواس پرتی ، خواب آلودگی (خفیف)،اختلال در خواب ،خستگی و

ضعف غیر طبیعی؛ هیپوتانسیون ارتواستاتیک ؛ تضعیف میوکارد ؛ برونکواسپاسم ؛ بیمارانی که دچار

نارسایی قلب یا آسم

منع مصرف : وجود حساسیت به دارو- در شوک کاردیوژنیک- وجود ضربان قلب کند حاد- وجود

آسم یا سابقه هر گونه بیماری انسدادی مجاری تنفسی- ایست قلبی وخیم-نارسائی قلبی کنترل

نشده- وجود فشار خون خیلی پائین و منع مصرف در شیردهی دارد .

توجهات : * دارو رابعد از غذا میل نمائید.* به هنگام تغییر وضعیت از حالت های خوابیده یا

نشسته به حالت ایستاده به خصوص در دوزهای اولیه ممکن است سرگیجه رخ دهد.لذا با احتیاط

تغییر وضعیت صورت گیرد.

*لابتالول در بیماران دارای آنژین صدری نباید ناگهانی قطع گردد زیرا باعث تشدید آنژین ،حمله

قلبی یا ضربان غیر طبیعی در بیمار می گردد .



لوبریکانت

اشکال دارویی: ژل

ژل لوبریکانت: شفاف-قابل حل در آب است و به جهت روان کنندگی در معاینات و عمل های جراحی زنان استفاده میگردد . مناسب برای انواع معاینات پزشکی -توشه واژینال و رکتان-سونداز-الکترو تراپیو...می باشد .

این ژل به بافت بدن آسیب نمیرساند و حساسیت ایجاد نمیکند و از همه مهم تر باعث سقط جنین نمی شود



لوزارتان

نام تجاری : Losar

گروه دارویی : آنتاگونیست رسپتور آنژیوتانسین II

گروه درمانی: ضد هایپرتانسیون

اشکال دارویی: قرص

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: درمان هایپرتانسیون - نقره پاتی در دیابت های تیپ ۲ - کاهش خطر سکتة مغزی

در بیماران مبتلا به هایپرتانسیون و هیپرتروفی بطن چپ

عوارض جانبی: سرگیجه - اسهال - درد عضلانی - سرفه - سینوزیت

موارد منع مصرف: بارداری ، شیردهی ، حساسیت به لوزارتان

توجهات: * کنترل غلظت پتاسیم سرم بخصوص در بیماران مسن و بیماران دچار نارسایی کلیوی توصیه می شود.

* کاهش دوز دارو در نارسایی کبدی توصیه می شود.

* کلیه رانندگان و افرادی که کارهای پرمخاطره انجام می دهند باید هنگام مصرف این دارو از فعالیت های مربوطه دست بکشند.

* روزانه وزن - جذب و دفع و ادم را در پاها و ساق های پانکترل کنید .

* هنگام تغییر وضعیت به آهستگی تغییر وضعیت دهید .

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود



لوکورین

نام تجاری: Folinic Acid – Calcium folinate

گروه دارویی: مشتق آمینوپیریدین (آنتاگونیست اسید فولیک).

گروه درمانی: آنتی دوت

اشکال دارویی: قرص، آمپول

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: مسمومیت با آنتگونیست های اسیدفولیک مانند پیریمتامین، متوترکسات یا تری متوپریم - کم خونیهای مگالوبلاستیک - مسمومیت شدید ناشی از مصرف بیش از اندازه متوترکسات در برنامه های شیمی درمانی سرطان

موارد منع مصرف: کم خونی پرنیسیوز یا کمبود ویتامین **B12**

عوارض جانبی: بثورات ، کهیر، خارش و خس خس سینه ناشی از مصرف دارو و واکنش آنافیلاکسی

توجهات: * در نقص کار کلیه به علت اشکال در دفع متوترکسات خطر مسمومیت افزایش خواهد یافت و ممکن است منجر به تضعف شدید مغز استخوان و التهاب مخاط ها گردد .

* لوکورورین ممکن است دفعات بروز حملات صرعی را در کودکان مستعد افزایش دهد

* جهت کاهش عوارض گوارشی دارو همراه با غذا تجویز شود و روزانه ۳ لیتر مایعات بنوشد.

شرایط نگهداری: در دمای °C ۸-۲ نگهداری شود.



لیدوکائین هیدروکلراید

نام تجاری: Xylocaine

گروه دارویی: مشتقات آمیدها

گروه درمانی: بی حس کننده موضعی

شکل دارویی: تزریقی، پماد، اسپری

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: بی حس کننده منطقه‌ای، بلوک اعصاب محیطی و بلوک عصب سمپاتیک

در بی حسی‌های نخاعی (اسپانیال) و ترکیبات مخدر و آریتمی قلبی.

میزان مصرف: بنا بر ضرورت متفاوت است.

نکته: این دارو با اپی نفرین، پریلوکائین مخلوط هم می‌شوند.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، این دارو با داروهای ایندرال، سایمتدین،

فنی توئین، باربیتورات‌ها، دیوریتک‌ها و مهارکننده‌های مغز و اعصاب تداخل دارویی دارد.

عوارض جانبی: تهوع، استفراغ، تشنج، انقباض مردمک

توجهات: *تجویز مقدار زیاد آن باعث تشنج می‌شود.

آموزش: *در مصرف دندانپزشکی بلع غذا را مختل می‌کند.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.



متفورمین

نام تجاری: glucophage

گروه دارویی: مشتق بی گوانید

گروه درمانی: ضد دیابت

اشکال دارویی: Tablet: 500mg F.C. Tablets: 500 mg

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: متفورمین به عنوان کاهنده قند خون در درمان دیابت نوع دو (دیابت غیروابسته به انسولین) بکار می‌رود. متفورمین در اختلال متابولیسم کربوهیدرات و درمان سندرم تخمدان پلی کیستیک نیز تجویز می‌شود.

موارد منع مصرف: کتواسیدوز - کمای دیابتی - نارسائی قلبی - سکته قلبی - هیپوکسی

توجهات:

*از برنامه غذایی توصیه شده توسط پزشکتان پیروی کنید.

*از نظر واکنش‌های هیپوگلیسمیک نظیر تعریق؛ ضعف؛ گیجی؛ اضطراب؛ لرزش و گرسنگی بیمار را مد نظر قرار دهید

*قرص‌ها را می‌توان خرد نمود و برای بیماران دچار مشکلات بلع با مایعات و یا غذا مخلوط کرد.

*فراورده‌های تاخیری دارو را خرد نکنید و آنها را نجوید



مترونیدازول

نام تجاری: Flagyl

گروه دارویی: نیترو ایمیدازول

گروه درمانی: ضد باکتری ، ضد آمیب

شکل دارویی: شربت ، آمپول ، ژل پوستی ، شیاف واژینال ، ویال تزریقی

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: عفونت های میکروبی (بی هوازی) ، اسهال خونی ، اندوکاردیت ، عفونت شکمی

میزان مصرف: ۱۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم طی یک ساعت به عنوان میزان اولیه و ۷٫۵ میلی

گرم به ازای هر کیلوگرم طی ۶ ساعت و حداکثر مصرف ۲۴ ساعت ۴ گرم می باشد.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی ، اختلالات خونی یا بیماری مغز

عوارض جانبی: مشکلات کبدی و کلیوی ، تهوع ، احساس سوزش مجاری ادراری ،

سرگیجه ، سنکوپ ، ضایعات پوستی ، کهیر

توجهات: *آزمایشهای خونی باید انجام شود.* این دارو با لیتیوم تداخل دارویی دارد.

*در شیردهی با احتیاط کامل مصرف شود.

*تزریق وریدی به آرامی با سرعت کم در طی یک ساعت انجام شود.

*نگهداری آن در دمای یخچال احتمال رسوب دارد

*مترونیدازول تزریقی فقط باید به صورت انفوزیون آهسته وریدی مصرف شود که

در این صورت انفوزیون محلولهای سرمهای دیگر باید قطع شود.

آموزش: بهتر است دارو با معده خالی مصرف شود.* در عفونت زنان با میکروب

(تريکوموناس) می بایست همسر وی نیز درمان شود.* تشنج و علائم منگی نشانه

مسمومیت بیمار است، به پزشک مراجعه شود.

شرایط نگهداری: محلول مترونیدازول به مدت سه شبانه روز قابل نگهداری در دمای

معمولی است.



متوپرولول

نام تجاری: متورال

گروه دارویی: بتا بلاکر

گروه درمانی: ضد هیپرتانسیون - درمان کمکی در MI حاد

شکل دارویی: قرص ؛ آمپول

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف : درمان آنژین صدری مزمن، کنترل زیادی فشا رخون و پیشگیری از انفارکتوس مجدد میوکارد ؛ درمان کمکی در MI حاد

موارد منع مصرف : این دارو در شوک قلبی، نارسایی آشکار قلب، بلوک قلبی درجه دو یا سه دهلیزی - بطنی ، برادی کاردی سینوسی و کاهش فشار خون سیستولیک به کمتر از ۱۰۰ میلی متر جیوه (برای پیشگیری از انفارکتوس مجدد میوکارد) نباید مصرف شود.

عوارض جانبی: برادی کاردی علامتی (سرگیجه)، اسپاسم برونش (اشکال در تنفس یا خس خس سینه)، نارسایی احتقانی قلب (تورم مچ و اندامهای تحتانی)، تنگی نفس، افسردگی روانی و کاهش گردش خون محیطی (سردی دستها و پاها)

توجهات: * اگر بعد از یک دوره درمان طولانی با این دارو قطع مصرف آن ضرورت پیدا کند، باید بتدریج و حداقل طی سه روز تا دو هفته مصرف دارو قطع شود.

* در طول مصرف این دارو، پیگیری عملکرد قلب، تعیین نبض، اندازه گیری فشار خون و ثبت نوار قلبی و اندازه گیری ضربان قلب ضروری است.

* به علت احتمال بروز سرگیجه، خواب آلودگی و منگی ، هنگام رانندگی یا کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری دارند، باید احتیاط نمود.

* در طول مصرف این دارو لازم است وزن کنترل شده ؛ رژیم غذایی و برنامه ورزشی رعایت گردد.



متوکلوپرامید

نام تجاری: Plasil

گروه دارویی: پاراسماتومیمیتیک

گروه درمانی: ضد تهوع ، ضد استفراغ

شکل دارویی: قرص ، آمپول و قطره

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: برگشت اسید معده به مری ، درمان یا پیشگیری از استفراغ و شیمی درمانی

میزان مصرف: یک قرص هر ۸ ساعت

موارد منع مصرف: خونریزی ، انسداد روده ، تشنج

عوارض جانبی: علائم پارکینسون ، سردرد ، بی خوابی ، تشنج ، توهم ، اسهال ، تکرر ادرار ، علائم چشمی و مغزی

توجهات: * در صورت تکرار تزریق باید دارو رقیق شود.

*رنگ دارو قبل از تزریق نباید عوض شود.

آموزش: رانندگی بعد از مصرف دارو خطر ناک است.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.



متیل ارگونوین مالتات

نام تجاری: Methergine

گروه دارویی: اکسی توسیک

اشکال دارویی: قرص و آمپول

مکانیسم اثر: انقباضات رحمی را تحریک کرده و خونریزی را کاهش می دهد.

موارد مصرف: درمان خونریزی بعد از زایمان یا سقط

میزان مصرف:

تزریق عضلانی 0.2mg هر ۲ تا ۵ ساعت حداکثر ۵ دوز، تزریق وریدی 0.2mg که در مدت یک دقیقه تجویز می شود؛ 0.2mg - 0.4mg خوراکی هر ۶ تا ۱۲ ساعت به مدت ۲ تا ۷ روز بعد از دوز اولیه عضلانی یا وریدی

موارد منع مصرف: حساسیت شدید به فرآورده های ارگوت، اندیکاسیون های زایمان، قبل از خروج جفت بیماری تنفسی - قلبی و بیماری عروق محیطی

عوارض جانبی: سردرد، سرگیجه، درد قفسه سینه، طپش قلب، افزایش فشار خون، تعریق



متیل دوپا

نام تجاری: Aldomet

گروه دارویی: آنتی آدرنرژیک

گروه درمانی: ضد فشار خون

شکل دارویی: قرص ۲۵۰ میلی گرمی

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: فشار خون ، سندرم رینود

میزان مصرف: ۱ تا ۳ قرص روزانه مصرف شود.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی ، بیماران کبدی

عوارض جانبی: خواب آلودگی ، اسهال ، درد قلبی، زردی ، درد عضله و مفصل

توجهات: * فشار خون بیمار باید کنترل شود.

* آزمایشهای خونی بررسی شود.

نکته: در بیماری رینود به علت مشکل عروقی در انتهای (دست و پا) در تماس با آب

سرد یا هوای سرد تغییر رنگ اندام ایجاد می شود.

آموزش: خشکی دهان با مصرف مایعات یا آدامس بر طرف می شود.

* ضعف و سرگیجه ، اسهال یا یبوست علائم مسمومیت اند، به پزشک اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.



مروپنم

نام تجاری دارو : Meronem

گروه دارویی : مشتق کارباپنم

گروه درمانی : آنتی بیوتیک

اشکال دارویی : ویال 500-1000mg

مصرف در بارداری: گروه B

موارد مصرف : آپاندیسیت ؛ پریتونیت ؛ مننژیت باکتریائی

عوارض جانبی : واکنش های افزایش حساسیت ؛ سپسیس ؛ شوک ؛ آپنه

منع مصرف : هرنوع حساسیت به پنی سیلین ها، سفالوسپورینها و سایر مشتقات آن

توجهات : * در صورت داشتن اختلالات کلیوی (دوز دارو باید محاسبه و تنظیم گردد). * در صورت داشتن سابقه صرع، بیماریهای مغزی، کلیوی، کبدی و آسمبه پزشک اطلاع داده شود* تزریق این فرآورده باید در مراکز درمانی مجهز به امکانات لازم برای درمان های اورژانس انجام گیرد. * از مخلوط نمودن این دارو با سایر آنتی بیوتیک ها از جمله آمینوگلیکوزیدها به منظور تزریق وریدی خودداری گردد* در صورت بروز حساسیت (آسم، اگزما، تب و کهیر) فوراً مصرف دارو را قطع و اقدامات لازم برای درمان و مقابله با شوک آنافیلاکتیک انجام گیرد. * به واکنش های آلرژیک که ممکن است چند روز پس از اتمام درمان بوجود بیاید توجه داشته باشید

* انفوزیون وریدی مروپنم در عرض ۳۰-۱۵ دقیقه انجام شود .

* مروپنم شبیه ایمی پنم بوده اما عوارض عصبی و افزایش ریسک تشنج ناشی از آن بسیار کمتر از ایمی پنم است.

* در مننژیت ها برخلاف ایمی پنم قابل استفاده است

* در صورت وقوع تشنج دوز را کاهش یا متوقف کنید.



مژسترویل

نام تجاری دارو: Apo Megestrol

گروه داروئی: پروژسترون صناعی (پروژستین)

گروه درمانی: ضد نئوپلاسم

اشکال داروئی: solu=40mg/ml tab =40mg

مصرف در بارداری: گروه X

موارد مصرف: درمان تسکینی سرطان پستان و سرطان آندومتر

منع مصرف: حساسیت مفرط - حاملگی - سابقه ترومبوفلیت

عوارض جانبی: تهوع و استفراغ، ادم، لکه بینی، راش، خارش، ترومبوفلیت، تنگی نفس، سرفه و هایپرگلیسمی. افزایش وزن و اشتها

توجهات:

*خونریزی واژینال را گزارش کنید

*به طور مداوم سینه ها را معاینه کنید

*طی درمان و تا ۴ ماه بعد از خاتمه درمان لازم است از روش های ضد بارداری خوراکی استفاده شود.



مفناهیك اسید

گروه دارویی: ضد التهاب غیر استروئیدی

اشكال دارویی: کپسول ۲۵۰ میلی گرمی

موارد مصرف:

- جهت برطرف کردن کوتاه مدت (حداکثر ۷ روز) قاعدگی دردناک و درد
- حملات حاد نقرس یا بیماری نقرس کاذب
- دردهای همراه با التهاب غیر روماتیسمی
- سردردهای عروقی و پیشگیری از میگرن همراه با قاعدگی
- ضد التهاب و ضد درد برای برطرف کردن علائم آرتریت روماتوئید و دردهای عضلانی
- درد در اثر ضربه، دندان درد، دردهای پس از اعمال جراحی و پس از زایمان

موارد منع مصرف: حساسیت به دارو، آسم، کهیر، آلرژی، در بیماران با زخم ها یا التهاب های مزمن در دستگاه گوارش و در بیماران با سابقه بیماری های کلیوی

مصرف در دوران بارداری مجاز نیست

مصرف در دوران شیردهی: مقدار ناچیزی از آن در شیر مادر ترشح می شود.

عوارض جانبی: سرگیجه، سردرد، بثورات پوستی، خارش، تهوع، استفراغ، نفخ، سوء هاضمه، سوزش سر دل، زخم معده، بی کفایتی عملکرد کلیوی.



مگلو مین کامپاند

نام تجاری دارو: gastrografen

گروه دارویی: ماده رادیوپک

گروه درمانی: کمک تشخیصی - ماده حاجب

اشکال دارویی: **20** (Meglumine Diatrizoate **66%** + Sodium Diatrizoate **10%**) **76%** Injection: **100ml**

Oral or Rectal Solution: **60%** (Meglumine Diatrizoate **66%** + Sodium Diatrizoate **10%**)

Injection: **60%** (Meglumine Diatrizoate **52.1%** + Sodium Diatrizoate **7.9%**) **20** ml

مصرف در بارداری: گروه D

موارد مصرف: رادیو گرافی دستگاه گوارش - آنژیوگرافی مغزی - رادیو گرافی شریان های کلیوی - رادیوگرافی قلب و عروق

منع مصرف: میلوگرافی، برای آنژیوگرافی مغزی یا توموگرافی کامپیوتری مغز؛ هنگام خونریزی قاعدگی؛ بارداری؛ در موارد سابقه حساسیت مفرط به ید، مواد حاجب ید دار یا پنی سیلین، سابقه آلرژی یا آسم،

عوارض جانبی: درد محل تزریق - سرفه - سمیت قلب - وازودیلاتاسیون آتریولی

توجهات: * قبل از تجویز مقدار اصلی، تزریق داخل وریدی ۱-۵/۰ میلی لیتر از فراورده به منظور آزمون حساسیت توصیه می شود. اگر چه وسایل لازم برای جلوگیری از واکنش های حساسیتی باید در دسترس باشند.

* در میلوگرافی یا معاینه کیست ها یا سینوس های پشتی که ممکن است با فضای زیر عنکبوتیه مرتبط باشند، استفاده از این مواد حاجب توصیه نمی شود



* برای جلوگیری از آسپیراسیون محتویات معده، پیش از انجام آزمون غدامصرف نشود، اما خوردن مایعات رقیق منعی ندارد

* قطع موقتی شیردهی (حداقل 24 ساعت) بعد از تجویز دارو توصیه می شود.

* برای بیماران آسمی یا افراد با سابقه آلرژی، بیماران مبتلا به نارسائی کلیوی یا کبدی و بیماران مستعد به ابتلاء به نارسائی کلیوی با احتیاط مصرف شود.

* نشست محلول هیپراسمولار تزریقی به بافت‌های زیر پوستی ممکن است سبب بروز احساس گزگز زودگذر و نکروز پوستی شود. برای تسریع بازگشت وریدی، استفاده از کمپرس سرد در موضع، بالا نگه داشتن موضع و حرکت دادن انگشتان توصیه می‌شود.

* در صورت مصرف این دارو برای تزریق داخل عروقی، باید باقیمانده مصرف نشده دارو دور ریخته شود.

* در صورت تشکیل کریستال، با قرار دادن ظرف حاوی دارو در آب داغ و تکان دادن آرام آن، کریستالها حل خواهند شد. دمای محلول قبل از تزریق باید معادل دمای بدن باشد.



منیزیم هیدروکساید

گروه دارویی: مسهل نمکی، آنتی اسید

اشکال دارویی: سوسپانسیون ۸٪

گروه مصرف در حاملگی: گروه C

این فراورده در دوزهای پایین به صورت آنتی اسید و در دوزهای بالاتر به صورت ملین نمکی خفیف عمل می کند. در معده با اسید هیدرولیک واکنش داده و تشکیل منیزیم کلراید می دهد که اثر خنثی کننده دارد. منیزیم کلراید سبب احتباس اسموتیک مایعات می شود که کولون را متسع می کند و در نتیجه سبب تحریک مکانیکی فعالیت پرستالتیک می شود.

موارد مصرف: درمان کوتاه مدت یبوست، برای تسکین نشانه های گوارشی همراه ازدیاد ترشح اسید، و به عنوان داروی کمکی در درمان اولسر پپتیک؛ هم چنین در درمان مسمومیت با اسیدهای معدنی و آرسنیک و به صورت دهان شویه برای خنثی سازی اسیدیته مصرف شده است.

موارد منع مصرف: اسهال، اختلال شدید عملکرد کلیه، تجمع مدفوع سخت و متراکم، انسداد یا پرفوراسیون روده، خونریزی مقعد، کولوستومی

عوارض جانبی: تهوع، استفراغ، کرامپ های شکلی، اسهال، قلیایی شدن ادرار، دهیدراتاسیون، ضعف، هیپوتانسیون، برادیکاردی



مولتی ویتامین

گروه دارویی: مولتی ویتامین

گروه درمانی: مکمل غذایی

شکل دارویی: قرص، کپسول، شربت و قطره خوراکی

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: این دارو حاوی ویتامین‌های A, D, E, B1, B2, B6, B12 و نیکوتینیک اسید، ویتامین C، کلسیم و بیوتین است.

میزان مصرف: یک قرص روزانه یا ۵ سی سی شربت یا یک کپسول

موارد منع مصرف: مورد خاصی وجود ندارد.

عوارض جانبی: مصرف خودسرانه ویتامین‌ها ممنوع است. زیرا میزان بالای آن پرعارضه خواهد بود.

توجهات: کودکان با سوء تغذیه، مادران باردار و شیرده نیاز به برنامه خاص دارند.

آموزش: طبق دستور پزشک دارو مصرف شود.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.



میدازولام Dormtcom

گروه دارویی: بنزودیازپین‌ها

گروه درمانی: آرام‌بخش، داروی کمکی در بیهوشی

شکل دارویی: آمپول ۵mg و ۱۵mg

مصرف در دوران حاملگی: گروه D

موارد مصرف: آرام‌بخش، کاهش اضطراب، نگهداری و کمک بیهوشی عمومی، درمان تشنج، سکسکه مقاوم به درمان

میزان مصرف: ۰/۰۷ تا ۰/۰۸ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم - در تزریق عضلانی ۰/۰۳ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، گلوکوم زاویه باریک، شوک، کوما، مسمومیت حاد با الکل، نارسایی کلیه

عوارض جانبی: توقف تنفسی مهمترین عارضه می‌باشد. تحریک‌پذیری، بی‌قراری، لارنگواسپاسم (اسپاسم مجاری هوای)، سردرد، تندی تنفس، لکنت، تاری دید، اختلال چشمی، اختلال تعادل

توجهات: *میزان تجویز دارو در سنین بالا (سالمندان) و اطفال باید پایین تر باشد.

*تزریق عضلانی دارو باید عمیق باشد.

*وسایل احیاء قلبی - ریوی در دسترس باشند .

*اکسیژن به منظور حمایت از راههای هوایی در دسترس باشد .

*این دارو را از بولوس سریع تزریق نکنید .

آموزش: اختلالات روانی و حرکتی بعد از دارو محتمل است.

* تا ۲۴ ساعت بعد از دریافت دارو بیمار نباید به کارهای دقیق مشغول باشد یا رانندگی کند.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.



میزو پروستول (پروستاگلاندین E2)

نام تجاری: Cytotec- prostin E₂- Dinoprostone

گروه دارویی: پروستاگلاندین

گروه درمانی: اکسی توکسیک و ضد اولسر، محافظ مخاط معده

مصرف در دوران حاملگی: گروه X

اشکال دارویی:

tab= ۱۰۰ mcg یا ۲۰۰ mcg Inj: 10mg/ml (0.5ml)

Vag Tab: 3 mg

Vag Gel: 1 mg / 2.5 ml , 2mg/2.5 ml

Cer vical Gel: 500mg / 2.5 ml

مکانیسم اثر: روی عضلات صاف میومتر تاثیر می گذارد و سبب انقباضات پی در پی می شود.

موارد مصرف: دیلاتاسیون سرویکس قبل از شروع زایمان - القای زایمان - تخلیه محتویات رحم در

سقط فراموش شده - جلوگیری از زخم معده ناشی از NSAIDs؛ خاتمه بارداری کمتر از ۴۹ روز (همراه

با mifepristone)؛ القاء درد زایمان و رسیده شدن گردن رحم؛ خونریزی سنگین و غیر طبیعی رحمی

عوارض جانبی: سردرد، سرگیجه، تهوع و استفراغ، آریتمی برونکواسپاسم؛ درد شکمی؛ تهوع و استفراغ؛

مرگ جنین؛ سردرد؛ تب؛ پارگی و تخریب رحمی؛ دیسمنوره، هایپرمنوره، اختلال قاعدگی، خونریزی پس

از یائسگی؛ تندرینس پستان؛ تعریق زیاد؛ راش

نشانه های سمیت: خواب آلودگی؛ ترمور؛ تشنج؛ تنگی نفس؛ درد شکم؛ اسهال؛ کاهش فشار خون؛

برادی کاردی

**موارد منع مصرف:**

- حساسیت به میزوپروستول، پروستاگلاندین ها یا هر ترکیب دیگری در این فرمولاسیون
- بارداری (زمانی که از این دارو جهت کاهش عارضه زخم گوارشی ناشی از NSAIDs استفاده می کنید)
- بارداری های خارج رحمی و خانمی که IUD دارد • بیماری شدید قلبی و یا تنفسی • خونریزی واژینال
- تشخیص داده نشده • پارگی پرده • جفت سر راهی • هرپس ژنیتال فعال • موارد منع زایمان واژینال
- عفونت درمان نشده لگن • آسم • تشنج • واژینیت • گلوکوم • اسکار رحم • سرویسیت

توجهات پرستاری: * سقط پس از ۳۰ ساعت بعد از استعمال این دارو کامل میشود.

* در طی درمان مراقبت بروز عوارض گوارشی و علایم حیاتی بیمار باشید. * در صورتی از این دارو استفاده کنید که امکانات مراقبت ویژه در دسترس باشد. * تا ۱۰ دقیقه پس از قرار دادن شیاف به حالت دراز کش باقی بماند. * دارو را همیشه در زمان مشخصی از روز استفاده کنید.

* اگر میزوپروستول را برای جلوگیری از زخم معده استفاده می کنید معمولاً از طریق اورال و ۴ بار در روز، بعد غذا و قبل از خواب استفاده می شود. * از مصرف آنتی اسید های حاوی منیزیم به همراه میزوپروستول خودداری کنید. (به علت وخیم تر شدن اسهال بیمار)

* نباید از الکل و سایر داروها در طی درمان استفاده شود.

* تنها زمانی می توانید خودتان از این دارو استفاده کنید که انتقال به بیمارستان در ظرف مدت زمان کم امکان پذیر باشد. * در صورت خونریزی شدید و تب حتماً به پزشک مراجعه کنید.

* میزوپروستول با میفپریستول اشتباه می شود. * از تجویز دارو برای خانم ها در سنین باروری تا اطمینان از کاربرد یک روش مناسب جلوگیری از بارداری خودداری کنید. * به بیماران در رابطه با خطرات دارو در صورت شکست روش جلوگیری از بارداری به صورت شفاهی و کتبی اطلاع رسانی نمایید.

* دارو باید در صورت منفی شدن تست بارداری در عرض ۲ هفته قبل از شروع دارو درمانی و در روز دوم یا سوم پس از قاعدگی طبیعی مصرف شود.



*عوامل خطر جهت پارگی رحم عبارتند از: ایام پایانی بارداری، مصرف دوز بالا از دارو، سابقه سزارین،

جراحی رحم یا ۵ و یا بیش از ۵ بار سابقه بارداری.

*مراقب تب باشید که نیم ساعت بعد از بکارگیری شیاف ایجاد می شود

*از روش های کنترل درد مانند انحراف فکر از موضوع استفاده نمائید

*به مدت ۲ هفته از نزدیکی ؛ تامپون و انجام دوش واژینال خودداری کنید

شرایط نگهداری: ژل را در درجه حرارت $15-20^{\circ}\text{C}$ نگهداری کنید . شیاف را در درجه حرارت $20^{\circ}\text{C} -$ و

به صورت منجمد نگهداری کنید .



ناپروکسن

نام تجاری : Anaprox, Naprosyn

گروه دارویی : مشتق اسید پروپیونیک (ضدالتهاب غیراستروئیدی)

گروه درمانی : ضد درد غیر مخدر و ضد تب

مصرف در دوران حاملگی : گروه B

موارد مصرف : درد خفیف تا متوسط، اوستئوآرتریت، آرتریت روماتوئید، آرتریت نقرسی.

موارد منع مصرف :

حساسیت مفرط، آسم، بیماری کلیوی شدید، بیماری کبدی شدید و اوسرپتیک فعال.

عوارض جانبی : وزوز گوش ؛ تاری دید؛ وزوز گوش

توجهات : *اختلالات خونریزی دهنده، اختلالات گوارشی، اختلالات قلبی، حساسیت مفرط به دیگر

ترکیبات ضدالتهاب، پیری بااحتیاط مصرف شود.

*گزارش کردن تاری دید، صدای زنگ و غرش در گوش ها (ممکن است نشانه مسمومیت باشد)

*در صورت بروز سرگیجه یا خواب آلودگی از رانندگی و دیگر اعمال مخاطره آمیز خودداری کند.

*گزارش کردن : تغییر در الگوی ادراری، افزایش وزن، ادم (صورت، اندام های تحتانی)، افزایش درد در

مفاصل، تب، خون در ادرار (نشانه سمیت کلیوی)

*پاسخ درمانی ممکن است تا یک ماه بعد ظاهر شود.

شرایط نگهداری : در دمای اتاق نگهداری شود.



نالوکسان

نام تجاری: Narcan

گروه دارویی: اکسی مورفون

گروه درمانی: ضد اپیوئید ها - ضد مخدر ها

شکل دارویی: تزریقی

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: تشخیص و درمان مسمومیت ها با مواد مخدر یا کومای ناشی از آن ، درمان مهار

تنفسی بعد از جراحی ، خارش ناشی از انسداد صفراوی

میزان مصرف: ۰/۴ تا ۲ میلی گرم وریدی یکجا تزریق می شود.

موارد منع مصرف: در افرادی که وابستگی شدید به مخدر ها دارند، با احتیاط استفاده شود.

عوارض جانبی: تهوع ، استفراغ ، اختلال تمرکز و حواس ، بی اشتهایی ، تغییرات فشار خون

توجهات: این دارو اغلب در مراکز اورژانس و بیمارستانی تزریق می شود.

آموزش: مورد خاصی مطرح نیست.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.



نوافن

شکل دارویی: هر عدد کپسول نوافن دارای ۳۲۵ میلی گرم استامینوفن، ۴۰ میلی گرم کافیین و ۲۰۰ میلی گرم ایپوبروفنمی باشد.

موارد مصرف: دردهای خفیف تا متوسط ناشی از سردرد (عصبی و میگرنی)، دندان درد، دردهای عصبی - ماهیچه ای، دردهای مفصلی و دیس منوره کاربرد دارد

موارد منع مصرف: در صورت سابقه وجود آلرژیک شدید از قبیل آنافیلاکسی یا آنژیوادم ناشی از داروهای ضدالتهاب غیر استروئیدی منع مصرف دارد.

عوارض جانبی: بثورات پوستی، درماتیت آلرژیک، اختلالات خونی، پانکراتیت حاد از عوارض مصرف طولانی مدت استامینوفن است. تهوع، اسهال و گاهی خونریزی و زخم ممکن است در اثر مصرف ایپوبروفن ایجاد شود.

توجهات: *در صورت بروز هرگونه اختلال در بینایی باید با پزشک مشورت شود .

*به دلیل احتمال بروز آسیب کبدی یا کلیوی، نباید این دارو بیش از مقدار توصیه شده مصرف شود.

*مصرف این درو در زمان بارداری و شیردهی توصیه نمی گردد.

*به علت وجود استامینوفن در بیماران دیابتی ، احتمال مثبت شدن کاذب تست قند خون وجود دارد.*در بیماران دچار اختلالات کلیوی به علت وجود ایپوبروفن ، با احتیاط و با کنترل عملکرد کلیه به طور مرتب ، مصرف گردد.

*اگر دچار زخم گوارشی و یا سابقه آن را دارید از مصرف دارو های دارای ایپوبروفن پرهیز کنید

*در بیماران که سابقه حمله آسم -آنژیودم-کهیر یا رینیت ناشی از ضد التهاب غیر استروئیدی

وجود دارد ،مصرف گردد.

*در صورت هر گونه اختلال در بینایی باید با پزشک مشورت گردد زیرا احتمال بروز تنبلی چشم وجود دارد



نور ترپتیلین

گروه داروئی: TCA

گروه درمانی: ضد افسردگی های سه حلقه ای

اشکال دارویی: قرص

مصرف در دوران حاملگی: گروه D

موارد مصرف: اختلال افسردگی؛ میگرن؛ شب ادراری کودکان

موارد منع مصرف: حساسیت مفرط - سکته قلبی اخیر - کوما - دپرسیون شدید تنفسی

عوارض جانبی: سرگیجه - سردرد - ضعف - آرامش زیاد - هیپوتانسیون ارتوستاتیک -

حساسیت به نور - مشکلات گوارشی

توجهات: *در صورت بروز سرگیجه یا خواب آلودگی از رانندگی و دیگر اعمال مخاطره آمیز خودداری

کند. *دارو را همراه با غذا یا شیر مصرف کنید .

*بعد از استفاده طولانی مدت از قطع ناگهانی دارو اجتناب کنید ممکن است تهوع؛ سردرد و

احساس ناخوشی بوجود آید.

* فشار خون بیمار را کنترل کنید

*برای جلوگیری از هیپوتانسیون وضعیتی از تغییر وضعیت ناگهانی پرهیز نمائید.



نیتروگلیسرین

نام تجاری : Nitrostat

گروه دارویی : نیترات

گروه درمانی: گشادکننده عروقی و ضد آنژین

اشکال دارویی: قرص، برچسب پوستی، اسپری؛ پرل؛ آمپول؛ پماد

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: نیتروگلیسرین در آنژین صدری و بحران هیپرتانسیون تجویز می‌شود.

این دارو در سه مورد کاربرد دارد:

(۱) تخفیف یک آنژین صدری با مصرف دارو و پس از شروع درد

(۲) جلوگیری از حمله قلبی با مصرف دارو و درست پیش از بروز حمله

(۳) کاهش تعداد حملات با مصرف دائمی و منظم دارو.

قرص‌های زیر زبانی نیتروگلیسرین، قرص‌هایی که در دهان بین لب یا گونه و لثه‌های فوقانی گذاشته می‌شوند، یا اسپری آئروسول که در زیر زبان زده می‌شود، همگی حملات آنژینی را تخفیف داده یا از آن‌ها جلوگیری می‌کنند.

عوارض جانبی: تاریدید، خشکی دهان، سردرد شدید، یا بثورات جلدی. برافروختگی صورت و

گردن و تهوع

تداخلات دارویی: مصرف همزمان با سایر داروهای هیپرتانسیون؛ می‌تواند هیپرتانسیون شدید ایجاد کند.

توجهات: * بیمار را از نظر هیپوتانسیون ارتوستاتیک و نبض بررسی کنید.



* سردرد؛ احساس سبکی در سر و کاهش میزان فشارخون مواردی هستند که نیاز به کاهش میزان دوز دارو را مطرح می سازد.

* قرص های مخاطی باید مابین گونه و لثه جای گیرند .

* پماد موضعی برای استفاده باید از طریق ورف های اندازه بندی شده ؛ اندازه گیری شود.

* اشکال زیرزبانی دارو را نباید خورد بلکه باید زیرزبان گذاشت تا حل شود و احساس سوزن سوزن شدن غشای مخاطی را بیمار تجربه می نماید .

* اسپری را باید در زیر زبان مورد استفاده قرار داد نباید آنها را استنشاق کرد.

* در طی حمله آنژیینی بهتر است نشسته دارو را مصرف کنید.

* جهت انفوزیون وریدی بهترین سرم ؛ سرم قندی ۵٪ می باشد .

شرایط نگهداری: در درجه حرارت $20-25^{\circ}\text{C}$ نگهداری شود .نوع تزریقی را باید دور از انجماد و نور نگهداری کرد .



نئوستیگمین

نام تجاری: Prostigmin

گروه دارویی: محرک کولینرژیک

گروه درمانی: محرک عضلانی

اشکال دارویی: آمپول 0.5mg/ml و 2.5mg/ml

موارد مصرف: نئوستیگمین در درمان ضعف عضلانی ناشی از بیماری میاستنی گراویس، احتباس غیر انسدادی ادرار بعد از عمل جراحی و به عنوان پادزهر داروهای مسدودکننده عصبی - عضلانی غیر دپولاریزان مصرف می شود.

فارماکوکینتیک: این دارو بعد از تزریق عضلانی، سریع جذب می شود در پلاسما و کبد متابولیزه می شود و دفع آن کلیوی است.

عوارض جانبی: اسهال، تهوع یا استفراغ، کرامپ یا درد معده، افزایش غیر عادی تعریق و افزایش غیر عادی ترشح بزاق

توجهات: *در صورت وجود انسداد مکانیکی روده یا مجاری ادرار با احتیاطی فراوان تجویز شوند.

*در مصرف این دارو پس از جراحی باید احتیاط کرد زیرا ممکن است مشکلات تنفسی ناشی از درد پس از عمل جراحی تسکین، احتباس ترشحات یا آلتکتازی را تشدید کند.



وارفارین

نام تجاری: کمادین

گروه دارویی: مشتق کومارین

گروه درمانی: عوامل ضدانعقاد خون

شکل دارویی: قرص

مصرف در دوران حاملگی: گروه D

موارد مصرف: ترومبوزیا آمبولی عروقی - پس از جراحی قلب باز، سکته قلبی یا مغزی، آمبولی ریه، حمله قلبی، بیماری اختلال دریچه قلب

موارد منع مصرف: حساسیت به وارفارین، سایر داروهای ضد انعقاد، یا هر نوع ماده غذایی، رنگ خوراکی، یا دارو؛ خونریزی فعال؛ کمبود ویتامین کا؛ سرطان های احشائی؛ بیماری شدید کلیه و کبد و ریه

عوارض جانبی: کبودی یا درد انگشتان پا؛ خونریزی خارجی مثل خونریزی از لثه ها هنگام مسواک زدن؛ کبودی وسیع بدون ضربه؛ خون دماغ؛ خونریزی شدید و غیرعادی از بریدگی ها؛ خونریزی شدید و غیرعادی هنگام عادت ماهانه. علائم خونریزی داخلی

توجهات: *مورد مصرف وارفارین باید دقت شود که آن را هر روز در ساعت مشخص و ثابتی مصرف کنید. بهترین زمان مصرف وارفارین ساعت ۶ عصر می باشد. *اگر نصف قرص و یا قرص را مصرف کردید، باقیمانده قرص را می توانید نگه دارید و در نوبت های بعدی مصرف کنید. *یک برگه شناسایی پزشکی همراه داشته باشید که نشان دهد وارفارین مصرف می کنید. *از ورزش یا فعالیت هایی که ممکن است در آنها آسیب ببینید بپرهیزید. *مراقب باشید دستتان را نبرید و از خلال دندان استفاده نکنید. از ماشین ریش تراش (به جای تیغ ریش تراش) و مسواک نرم استفاده کنید

شرایط نگهداری: قرص های وارفارین را در جای خشک و خنک نگهداری کنید ولی لزومی به نگهداری در یخچال نمی باشد و می توان آن را در دمای اتاق، دور از حرارت و گرما، رطوبت و نور مستقیم آفتاب نگهداری کرد. دارو بایستی از یخ زدگی محافظت شود.



والپرووات سدیم

نام تجاری: Orlept -- Depakine

گروه دارویی: مشتق اسید کربوکسیلیک.

گروه درمانی: ضد تشنج.

شکل دارویی: Tablet, ec: 500 mg Injection: 100 mg/ml, (3ml, 5ml)

Syrup: 200 mg/5ml, 300 mg/5ml Capsule: 300 mg

Tablet: 200 mg

مصرف در دوران حاملگی: گروه D

موارد مصرف: تثبیت خلق در اختلال دوقطبی - پیشگیری از میگرن - حملات ساده یا کمپلکس صرع

موارد منع مصرف: حساسیت به دارو - اختلال در سیکل اوره - در بیماری کبدی

عوارض جانبی: سردرد - تب رینیت - فارنژیت - وزوز گوش - پانکراتیت - حساسیت به نور

واکنشهای افزایش حساسیت

توجهات: * آزمون عملکرد کبدی، شمارش پلاکتها، و زمان پروترومبین در ابتدا و سپس هر ماه بخصوص در

شش ماه اول درمان باید انجام شود. * غلظت درمانی دارو در سرم 100 mcg/ml - 50 است.

* مصرف دارو نباید به طور ناگهانی قطع شود. * در صورت بروز لرزش، مقدار مصرف دارو کاهش یابد.

* برای کاهش تحریکات گوارشی می توان دارو را همراه با غذا مصرف کرد. * انفوزیون وریدی در مدت ۶۰

دقیقه و با سرعت حداکثر ۲۰ میلی گرم در دقیقه انجام می شود. * تا مشخص شدن اثر تسکین بخش CNS

دارو، از انجام فعالیتهای نیازمند هوشیاری خودداری کنید. این دارو ممکن است موجب خواب آلودگی و

سرگیجه شود. * مصرف دارو در هنگام خواب می تواند دپرسیون CNS را کمتر کند. * در طول مصرف دارو،

کارت هویت پزشکی خود را که در آن نوع داروها و اختلالات تشنجی ذکر شده، همراه داشته باشید.



وانکومايسين

نام تجاری: Vancocin

گروه دارویی: گلیکوپتید

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

شکل دارویی: تزریقی و محلول خوراکی

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: عفونت های متوسط ، بی هوازی ، گانگرن ، عفونت استخوانی ، عفونت

پوستی و روده ای، عفونت ریوی و پرده مغزی

میزان مصرف: ۴۵ تا ۶۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم در روز

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی ، اختلالات شنوایی و نارسایی کلیوی

عوارض جانبی: عوارض شنوایی و کلیوی، تهوع ، کاهش فشار خون ، اختلالات خونی ،

درد محل تزریق، تشنج

توجهات: آثار سمی روی گوش و کلیه دارد بنابراین عملکرد کلیه به صورت دوره ای در طی

درمان پایش شود. * تزریق عضلانی دارو ممنوع است.

* به خاطر عملکرد ناقص کلیه در نوزادان نارس و شیرخواران با احتیاط مصرف شود.

* یک دوز واحد ۵۰۰ میلی گرم را در مدت ۹۰-۶۰ دقیقه تجویز کنید.

Red Man Syndrom گر گرفتگی همراه باتب و لرز در اثر تزریق وریدی سریع

وانکومايسين ایجاد میشود سرعت انفوزیون را آهسته کنید .

* تزریق سریع دارو به صورت وریدی به علت آزاد نمودن هیستامین باعث کاهش

فشار خون؛ گر گرفتگی؛ فلاشینگ میشود.

* محل تزریق دارو در هر بار انفوزیون باید تغییر داده شود. سابقه حساسیت دارویی را به

پزشک بگویید. * علائم سرگیجه و وز وز گوش را به اطلاع پزشک برسانید.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.



وراپامیل

نام تجاری: Isoptin

گروه دارویی: دی فنیل آلکیل آمین

گروه درمانی: ضد فشار خون ؛ ضد آریتمی ؛ ضد آنژین صدری

شکل دارویی: قرص و نوع تزریقی

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: درد قلبی، فشار خون، بی نظمی قلبی (به ویژه آریتمی PAT)

نکته: عارضه (PAT) یک بی نظمی قلبی است که به علت افزایش تعداد ضربان قلب بروز می کند و این دارو در مراکز درمانی بسیار موثر است.

میزان مصرف: بستگی به نوع آریتمی قلبی دارد.

موارد منع مصرف: مشکلات هدایتی قلب (بلوک درجه ۲ یا ۳)

عوارض جانبی:

تپش قلب، سرگیجه، اختلال خواب، اختلال دید، درماتیت (ضایعات پوستی)، دل درد، خشکی دهان، درد عضلانی و اشکالات تنفسی

توجهات: کنترل علائم حیاتی ضروری است.

*نوار قلبی باید گرفته شود.

آموزش: در صورت تنگی نفس به پزشک اطلاع دهید .

*دارو را همراه غذا میل کنید.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.



ویتامین ب ۶

نام تجاری: Pyridoxine Hcl

گروه دارویی: ویتامین محلول در آب

اشکال دارویی: قرص ۴۰mg و آمپول ۱۰۰ و ۳۰۰ میلی گرم در ۲ میلی لیتر

مصرف در حاملگی: گروه A (در صورت مصرف بیش از حد؛ گروه C)

این دارو کد آنزیمی برای فعالیت های متابولیکی گوناگونی است که بر مصرف پروتئین، چربی و کربوهیدرات اثر می گذارد.

موارد مصرف: پروفیلاکسی و درمان کمبود ویتامین ب۶ در موارد تغذیه ناکافی، کمبود ویتامین ب۶ ناشی از مصرف داروهایی نظیر ایزونیازید و قرص های کنتراستپو خوراکی، همچنین جهت پیشگیری از نوریت اسپتیک ناشی از کلرامفنیکل، برای درمان مسمومیت حاد به خاطر مصرف بیش از حد سیکلوسپورین، هیدرالازین و ایزونیازید، برای پیشگیری از تهوع و استفراغ در حاملگی

موارد منع مصرف و احتیاط: موارد منع مصرف خاصی برای این فراورده ذکر نشده است ولی در حاملگی بایستی از مصرف دوزهای بیش از حد خودداری شود.

عوارض جانبی: پarestزی، خواب آلودگی، برافروختگی خفیف یا احساس گرما، کاهش سطح اسیدفولیک، سوزش یا درد گزشی در محل تزریق.



ویتامین ب کمپلکس

گروه دارویی: ویتامین

گروه درمانی: ویتامین

شکل دارویی: قرص، آمپول، شربت

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: ویتامین ب کمپلکس برای درمان کمبودهای ویتامین بتجویز می‌شود. این کمبودها اغلب تغذیه‌ای هستند. این ویتامین کاربرد زیادی برای ورزشکارانی که عملیات ورزشی سنگین انجام می‌دهند (برای جبران انرژی از دست رفته) بسیار مفید می‌باشد. ویتامین‌های گروه B باعث کاهش استرس و افسردگی، و سلامتی پوست و اعصاب می‌گردند

عوارض جانبی: عوارض جانبی زیادی ندارد و چون محلول در آب است به راحتی قابل دفع است. حساسیت غیر طبیعی به فشار یا لمس و سفتی عضلانی در محل تزریق؛ برافروختگی عمومی، بثورات جلدی و خارش با مصرف این فراورده مشاهده شده‌است.

توجهات: مقدار مصرف این دارو به مقدار ویتامین‌های گروه B موجود در رژیم غذایی، وضعیت بیمار و اینکه فراورده جهت درمان یا پیشگیری بکار می‌رود، بستگی دارد.

*قبل از تجویز این دارو، وضعیت خونسازی بیمار ارزیابی شود.

*افزایش مصرف کربوهیدرات‌ها بدون مصرف کافی ویتامین B کمپلکس ممکن است موجب فقدان حاد و سریع ویتامین شود. *در صورت وجود رسوب در آمپول، از مصرف آن خودداری کنید. *محلول تزریقی ویتامین B کمپلکس به صورت وریدی یا عضلانی تزریق می‌شود، ولی تزریق عضلانی آن ترجیح داده می‌شود.

*باید تداخل دارویی ویتامین B کمپلکس با سایر داروهایی که بیمار مصرف می‌کند، بررسی شود. *برای جلوگیری از عود بیماری، در طی درمان، از رژیم غذایی مناسبی استفاده کنید.

شرایط نگهداری: آمپول و شربت را دور از نور نگهداری کنید.



ویتامین K۱

نام تجاری: Phytonadions

گروه دارویی: ویتامین محلول در چربی

اشکال دارویی: قرص، آمپول ۱mg/ml و ۱۰mg/ml

گروه مصرف در حاملگی: گروه C

این فراورده برای ساخت فاکتورهای انعقادی II و VII و IX و X که برای انعقاد طبیعی خون اساسی هستند، ضروری است.

موارد مصرف: داروی انتخابی به عنوان آنتی دوت برای مصرف بیش از حد ضد انعقادی های خوراکی است. همچنین در درمان هیپوپروتئینمی به خاطر تجویز آنتی بیوتیک های خوراکی کنیدین، کنین، سالیسیلات ها و سولفونامیدها استفاده می شود. به عنوان پروفیلاکسی و درمان برای بیماری هموراژیک نوزادان نیز استفاده می شود.

موارد منع مصرف: در بیماران مبتلا به بیماری شدید کبد، حاملگی منع مصرف دارد.

عوارض جانبی: ناراحتی معده، سردرد، برافروختگی صورت، حرکات تشنجی، لرز، تب، تعریق مفرط، ضعف سرگیجه، احساس فشردگی سینه، شوک، درد، هماتوم و تشکیل ندول، بثورات اریتماتوز پوستی، هیپر بیلی روبینمی، آنمی همولیتیک شدید.



هالوپریدول

نام تجاری: Haldol

گروه دارویی: بوتیروفنون ها

گروه درمانی: ضد سایکوز (اختلالات شدید روانی)

شکل دارویی: قرص و آمپول

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: اختلالات سایکوز در نوع حاد و مزمن ، اضطراب شدید در بیماری اوتیسم فعال ، در استفراغ های شدید و در دیس تونی اندام ها

میزان مصرف: ۱ تا ۵ قرص ۰.۵ میلی گرم حداکثر ۱۰۰ میلی گرم روزانه

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، در بیماران دو قطبی باعث افسردگی می شود.

عوارض جانبی: خشکی دهان ، خواب آوری ، تشنج ، آریتمی قلب

توجهات: * تزریق هالوپریدول باید به صورت عمقی و با سوزن شماره ۲۱ انجام شود. (فقط به صورت عضلانی تزریق شود).

آموزش: * از رانندگی و کارهای دقیق خودداری کنید.

* استفاده از الکل و دارو های خواب آور همزمان اجتناب شود.

* خشکی دهان از عوارض شایع است، مایعات بیشتر مصرف شود.

* بیمار باید در انجام آزمایشهای حین مصرف دارو همکاری کند.

* بیمار نباید در سرما و گرمای شدید قرار بگیرد.

شرایط نگهداری: در جای خشک و دور از نور نگهداری شود.



هیپارین سدیم

نام تجاری: Liqueamin

گروه دارویی: موکوپلی ساکاراید

گروه درمانی: ضد انعقاد

شکل دارویی: تزریقی

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: پروفیلاکسی (پیشگیری) و درمان لخته های وریدی عمقی به ویژه در اندام های تحتانی، درمان آنژین قلبی ناپایدار و درمان کمکی در انفارکتوس میوکارد، تشخیص و درمان انعقاد منتشر داخل عروقی (DIC)، در خانم های باردار که سقط مکرر دارند نیز برای پیشگیری از سقط مجدد استفاده می شود.

میزان مصرف: در پیشگیری با میزان پایین دارو همراه است ۳۰۰ واحد به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، در حملات مغزی ۳ تا ۵ هزار واحد وریدی و به دنبال آن ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ واحد در هر ساعت

موارد منع مصرف: خونریزی شدید، کاهش تعداد پلاکت، در هموفیلی یا بیماری کبد ممنوع است.

عوارض جانبی: خونریزی، درد خفیف، تب، خارش

توجهات: * در مسمومیت شدید، خونریزی علامت بارزی است معمولاً با قطع دارو بهبود می یابد. * در صورت عدم بهبودی از داروی پروتامین سولفات استفاده کنید.
* تزریق وریدی هیپارین بر نوع زیر جلدی یا عضلانی ارجح است.

آموزش: * در صورت خونریزی یا ضایعات جلدی (پوست) به پزشک اطلاع دهید.

* در صورت فراموشی یک وعده دارو، میزان ۲ برابر آن در وعده بعدی پرهیز کنید.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.



هیدرالازین

نام تجاری: Apresoline

گروه دارویی: گشاد کننده عروق

گروه درمانی: ضد فشار خون

شکل دارویی: قرص و آمپول

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: فشار خون بالا، نارسایی احتقانی قلب، نارسایی شدید دریچه آئورت قلب

میزان مصرف: هر ۶ ساعت یک قرص ۱۰ میلی گرمی، این میزان قابل افزایش است ولی در نارسایی قلبی از ۴۰ تا ۳۰۰ میلی گرم ۲ تا ۴ بار در روز قابل افزایش است.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، بیماری عروق کرونر و رماتیسم دریچه میترا قلب

عوارض جانبی: تهوع، استفراغ، سردرد، درد عضلانی، کهیر، خارش، اشکال تنفسی، اختلالات خونی و درد مفاصل

توجهات: * در صورت کاهش فشار خون شدید و سردی اندام ها به فکر مسمومیت دارویی باشید.

* نوع وریدی را به آهستگی تزریق کنید.

آموزش: * قرص را با غذا میل کنید.

* به علت کاهش فشار خون بیمار نباید از حالت دراز کش به طور ناگهانی بایستد.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.



هیدروکلروتیازید

نام تجاری: Esidrex

گروه دارویی: دیورتیک تیازیدی

گروه درمانی: ضدهیپرتانسیون

شکل دارویی: قرص

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: سندرم نفروتیک، گلومرولونفریت حاد و نارسایی مزمن کلیه؛ خیز ناشی از نارسایی احتقانی قلب، سیروز کبدی همراه با آسیت

موارد منع مصرف: حساسیت مفرط؛ هیپوکالمی

عوارض جانبی: کاهش فشار خون وضعیتی - کمی پتاسیم، منیزیم و سدیم خون - زیادی کلسیم خون - زیادی اسیداوریک خون، نفرس، افزایش قند خون - لکوپنی - پانکراتیت

توجهات: *اندازه‌گیری فشار خون در طول درمان با این دارو در فواصل منظم ضروری است.

*احتمال بروز کمی پتاسیم خون وجود دارد (احساس ناخوشی؛ خستگی بیش از حد؛ تاکی کاردی؛ ضعف؛ کرامپ‌های ساق پا)

*مصرف پتاسیم اضافی در رژیم غذایی لازم باشد، بدون مشورت پزشک، رژیم غذایی نباید تغییر یابد.

*به علائم آکالوز متابولیک نظیر خواب‌آلودگی و بی‌قراری توجه نمائید.



هیدروکورتیزون یا کورتیزول

نام تجاری دارو : cortef

گروه دارویی : گلوکوکورتیکوئید - مینرالوکورتیکوئید

گروه درمانی : ضد التهاب غیر استروئیدی ؛ ایمونوساپرسیو

اشکال دارویی : قرص ؛ ویال

مصرف در دوران حاملگی : گروه C

موارد مصرف : نارسایی غده فوق کلیوی ؛ التهاب و آلرژی ؛ سرکوب کردن سیستم ایمنی ، حساسیت های معمول مانند کهیر و آنافیلاکسیکولیت اولسراتیو و ادم مغزی نیز مؤثر است .

عوارض جانبی :

افزایش فشار خون ، آکنه ، پوکی استخوان ، مشکلات گوارشی ؛ هیپوکالمی ؛ هیپرگلیسمی ؛ ادم ؛ پارستری تغییرات رفتاری

توجهات : * کنترل وزن روزانه . دوز روزانه ؛ صبح مورد استفاده قرار بگیرد .

* به منظور پیشگیری از شکستگی استخوان ؛ به بیمارانی که مشکلات استخوانی دارند به هنگام حرکت کمک کنید .

* دارورانایدناگهانی قطع کرد زیرا احتمال بروز بحران آدرنال وجود دارد .

* دارو باید تدریجی قطع گردد .

شرایط نگهداری : در درجه حرارت ۱۵-۳۰ درجه سانتی گراد و دور از نور نگهداری شود .



هیوسین آن بوتیل بروماید

نام تجارتي: بوسکوپان Buscupan

گروه درمانی: آنتی کولینرژیک – آنتی اسپاسمودیک

اشکال دارویی: قرص ۱۰ میلی گرمی – آمپول ۲۰mg/ml و شیاف ۱۰ میلی گرمی

طبقه بندی مصرف در حاملگی: گروه C

این فرآورده اثر استیل کولین را روی ساختارهایی که از گیرنده های پس گانگلیونی عصب گیری می کنند نظیر عضلات صاف، قلب و غدد برون ریز مهار می کند. دوزهای زیاد دارو ممکن است تحرک و فعالیت ترشحي سیستم گوارش و تون حالب و مثانه را کاهش دهند.

موارد مصرف: برای درمان اسپاسم گوارشی یا ادراری تناسلی – قاعدگی دردناک همراه با اسپاسم – کولیک صفراوی یا کلیوی – هم چنین همراه با سایر روش های تشخیصی مانند آندسکوپي معده دوازدهه هنگامی که اسپاسم وجود دارد، تجویز می شود.

موارد منع مصرف: بیماران مبتلا به گلوکوم (بدلیل احتمال بروز اثر گشاد کننده مردمک چشم)

عوارض جانبی: تاکیکاردی؛ کاهش قدرت تطابق و خشکی دهان.



منابع و مآخذ :

- داروهای ژنریک ایران با اقدامات پرستاری ویرایش ۱۳۹۱ - تالیف : مرجان رسولی
- نحوه آماده سازی و ناسازگاریهای شیمیائی داروهای آنتی میکروبیال تزریقی - گردآوری و تدوین : پرستو عباسی
- درسنامه جامع داروهای رسمی ایران - طرح و تالیف اولیه : دکتر سعید شهرآز - دکتر طاهره غازیانی
- داروهای ژنریک ایران - ترجمه و تالیف محمد آبگون
- اطلاعات و کاربرد بالینی داروهای ژنریک ایران
- سایت معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قم
- <http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title> =سایت
- <http://www.zakariapharm.com/> =سایت
- <http://nursecare.blogfa.com/post>
- <http://www.darunama.com/PublicInfo>
- <http://vista.ir/article>
- Powered By: BLOGFA.COM