



Contents

۷.....	مقدمه
۸.....	آب مقطر
۹.....	آتروپین سولفات
۱۰.....	آدنوزین
۱۱.....	آزیترومایسین
۱۲.....	آلومینیوم ام جی اس
۱۳.....	آمپی سیلین
۱۴.....	آموکسی سیلین
۱۵.....	آمینوفیلین
۱۶.....	آمیودارون
۱۷.....	آنتی دی ایمونوگلوبولین
۱۸.....	استامینوفن
۱۹.....	استامینوفن کدئنه
۲۰.....	استیل سالیسیلیک اسید = ASA
۲۱.....	استیل سیستین
۲۲.....	اسید آسکوربیک - ویتامین C
۲۳.....	اسید فولیک
۲۴.....	انسولین
۲۵.....	اپی نفرین
۲۶.....	اریتروپوئین آلفا
۲۷.....	اریترومایسین
۲۸.....	انوکسپارین



- ۲۹..... اکسی توسین
- ۳۱..... Osetamivir اسلتامیویر
- ۳۲..... امپرازول
- ۳۳..... اندانسترون
- ۳۴..... ایبوپروفن
- ۳۵..... ایمونوگلوبولین ضد کزاز
- ۳۶..... HBIG= ایمونوگلوبولین ضد هپاتیت ب
- ۳۷..... بتاهستین
- ۳۸..... بیپریدین
- ۳۹..... بیزاکودیل
- ۴۰..... پانتوپرازول
- ۴۱..... پتاسیم کلراید
- ۴۲..... پتیدین
- ۴۳..... پروپرانولول
- ۴۴..... Protamine Sulfate پروتامین سولفات
- ۴۶..... پرومتازین
- ۴۷..... پلی اتیلن گلیکول
- ۴۸..... پوویدون آیداین
- ۴۹..... تتراسیکلین
- ۵۰..... ترانگزامیک اسید (ترنسید)
- ۵۲..... جنتامایسین
- ۵۳..... داکسپین
- ۵۴..... داکسی سایکلین
- ۵۶..... دایمتیکون



- ۵۷..... دایجستیو
- ۵۸..... دکستروز
- ۵۹..... دگزامتازون
- ۶۰..... دوپوتامین
- ۶۱..... دوپامین
- ۶۲..... دیازپام
- ۶۳..... دیفن هیدرامین
- ۶۴..... دیکلوفناک سدیم
- ۶۵..... دیگوکسین
- ۶۶..... رانیتیدین
- ۶۷..... روغن بادام
- ۶۸..... روغن کرچک
- ۶۹..... زینتوما ZINTOMA
- ۷۰..... سالبوتامول
- ۷۱..... سایمتیدین
- ۷۲..... سدیم بیکربنات
- ۷۳..... سدیم کلراید
- ۷۵..... سرم رینگر و رینگر لاکتات
- ۷۶..... سرم قندی نمکی
- ۷۷..... سرم ۱/۳ و ۲/۳
- ۷۸..... سفازولین
- ۷۹..... سفالکسین
- ۸۰..... سفتازیدیم
- ۸۱..... سفتریاکسون



- ۸۲..... سفیکسیم
- ۸۳..... سولفات منیزیم
- ۸۴..... سولفاستامید (چشمی)
- ۸۵..... سیپروفلوکساسین
- ۸۶..... فروس سولفات
- ۸۷..... فلوکونازول
- ۸۸..... فلومازینیل
- ۸۹..... فنوباریتال
- ۹۰..... فنی توئین
- ۹۱..... فورسماید
- ۹۲..... کاپتوپریل
- ۹۳..... کافئین
- ۹۴..... کتورولاک
- ۹۵..... کلردیازپوکساید
- ۹۶..... کلرفنیرآمین مالئات
- ۹۷..... کلسیم گلوکونات
- ۹۸..... کلوتریمازول
- ۹۹..... کلیندا مایسین
- ۱۰۰..... کلوگزاسیلین سدیم
- ۱۰۱..... کوتریموکسازول
- ۱۰۲..... لوبریکانت
- ۱۰۳..... لوزارتان
- ۱۰۴..... لوکوورین
- ۱۰۵..... لووتیروکسین



- ۱۰۶..... لیدوکائین هیدروکلراید
- ۱۰۷..... مترونیدازول
- ۱۰۸..... متوپرولول
- ۱۰۹..... متوکلورامید
- ۱۱۰..... متیل ارگونوین مالتات
- ۱۱۱..... متیل دوپا
- ۱۱۲..... مروبنم
- ۱۱۳..... مفنایمیک اسید
- ۱۱۴..... منیزیم هیدروکساید
- ۱۱۵..... مورفین
- ۱۱۶..... مولتی ویتامین
- ۱۱۷..... میدازولام Dormtcom
- ۱۱۸..... میزو پروستول (پروستاگلاندین E2)
- ۱۲۰..... ناپروکسن
- ۱۲۱..... نالوکسان
- ۱۲۲..... نوافن
- ۱۲۳..... نور ترپیتیلین
- ۱۲۴..... نیتروفورانتوئین
- ۱۲۵..... نیتروگلیسرین
- ۱۲۷..... نئوستیگمین
- ۱۲۸..... وارفارین
- ۱۲۹..... وانکومایسین
- ۱۳۰..... وراپامیل
- ۱۳۱..... ویتامین B₁ (thiamine HCL)



- ۱۳۲..... ویتامین ب ۶
- ۱۳۳..... ویتامین ب کمپلکس
- ۱۳۴..... ویتامین K۱
- ۱۳۵..... هالوپریدول
- ۱۳۶..... هپارین سدیم
- ۱۳۷..... هیدرالازین
- ۱۳۸..... هیدروکسی زین
- ۱۳۹..... هیدروکورتیزون یا کورتیزول
- ۱۴۰..... هیوسین ان بوتیل بروماید
- ۱۴۱..... هیدروکلروتیازید
- ۱۴۲..... منابع و ماخذ:



مقدمه

یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین مؤلفه ها در درمان بیماریها، داروست که در مورد بیماران بستری این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می کند.

اجرای دستورات دارویی نوشته شده پزشکان برای بیماران یکی از وظایف مهم پرستاران شاغل در بخش های درمانی است که با توجه به طیف وسیع داروها، داشتن آگاهی و اطلاعات فارماکولوژیکی و کلینیکی تمامی داروها کاری بس دشوار است. با توجه به سیاست گذاری های وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در زمینه مدیریت بخش دارویی بیمارستانها و مراکز آموزشی درمانی، کمیته دارو و درمان در بیمارستانها مسئول تدوین دارونامه بیمارستان و انتخاب داروهای مؤثر - ایمن و با کیفیت بالا و با قیمت مناسب؛ هم چنین بروز رسانی دارونامه مذکور است.

مجموعه حاضر لیستی از داروهایی است که در مرکز آموزشی درمانی ایزدی مورد استفاده هستند و سعی شده به اختصار توضیحات کاربردی و قابل استفاده برای هر کدام از داروها در زمینه موارد مصرف و عوارض ناخواسته دارو ذکر گردد.

قطعاً در صورت نیاز به بازنگری و یا افزایش داروهای جدید به این مجموعه، بر اساس فرآیند پیش بینی شده در دستورالعمل های کمیته دارو و درمان بیمارستان، اقدام خواهد شد.

در تهیه این مجموعه از سرکارخانم دکتر میرزائی؛ آقای دکتر شریفی؛ دفتر پرستاری به خصوص مترون محترم سرکار خانم مسروری و خانم مریم بیدگلی کمال تقدیر و تشکر به عمل می آید.

آقای دکتر غفاری (مدیریت دارویی مرکز ایزدی)



آب مقطر

گروه دارویی: حلال

گروه درمانی: حلال

شکل دارویی: تزریقی

فارماکولوژی: آب مقطر عاری از مواد پیروژن می باشد که برای تهیه محلول های قابل تزریق بکار می رود.

موارد مصرف: حلال جهت تزریق

شرایط نگهداری: در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری گردد.



آتروپین سولفات

نام تجاری: Atropin

گروه دارویی: گروه آنتی کولینرژیک ها

گروه درمانی: ضد برادیکاری و آریتمی و ضد مسمومیت ، ضد مواد سمی ارگانو فسفره (حشره کش ها)

شکل دارویی: قرص و آمپول و قطره چشمی

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: کم کاری قلبی (برادیکاری) و بلوک قلبی و مهار رفلکس واگ (تحریک ناحیه گلو که باعث استفراغ می شود)

میزان مصرف: قبل از عمل ۰.۵ تا ۱ میلی گرم از راه وریدی تزریق می شود و هر ۵ دقیقه حداکثر ۲ میلی گرم تزریق شود. مصرف کمتر از ۰.۵/۱ میلی گرم موجب برادیکاردی میشود

موارد منع مصرف: حساسیت شدید ، خونریزی حاد ، آب سیاه چشم و در موارد نارسایی کبدی ، کلیوی و قلبی با احتیاط مصرف شود.

عوارض جانبی: خشکی دهان ، تشنگی ، یبوست ، احتباس ادرار ، سر درد و تپش قلب؛ برادیکاردی

توجهات: علائم حیاتی مثل تعداد ضربان قلب و فشار خون را باید کنترل کنید .
*در سالمندان باید میزان کمتری تجویز شود.

آموزش: در صورت علائم خشکی دهان غر غره آب و مصرف آدامس مفید است.

شرایط نگهداری: دارو در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.



آدنوزین

نام تجاری: Adenocard

گروه دارویی: نوکلئوزید

گروه درمانی: ضد آریتمی

شکل دارویی: تزریقی (آمپول)

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: حملات تاکی کاردی قلبی (PAT)

میزان مصرف: میزان مصرف اولیه ۶ میلی گرم یک جا و سریع طی ۱ تا ۲ دقیقه و در صورت لزوم تکرار شود.

موارد منع مصرف: حساسیت مفرط، بلوک قلبی درجه ۲ و ۳ و بیماری سینوس بیمار، در مورد بیماران آسمی با احتیاط مصرف شود.

عوارض جانبی: تاری دید، سرگیجه، درد قفسه سینه، و مهمترین عارضه آریتمی قلبی می باشد.

توجهات: *وضعیت بیمار باید تحت مانیتورینگ کنترل شود، *دارو باید بیرنگ و شفاف باشد، *محلول آدنوزین باید فاقد بلور باشد

* این دارو فاقد ماده نگهدارنده است و مانده آن باید دور ریخته شود.

آموزش: نوشیدن قهوه بعد از مصرف دارو مفید نیست.

* در صورت بروز درد سینه به پزشک مراجعه شود، پس از مصرف دارو برافروختگی صورت بروز میکند، حملات برونکو اسپاسم ممکن است بروز کند.

شرایط نگهداری: از یخ زدن جلوگیری شود و در زمان مصرف باید در حرارت ۱۵ تا ۳۰ درجه نگهداری شود.



آزیترومایسین

نام تجاری: Zithromax

گروه دارویی: ماکرولید آزاد

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

اشکال دارویی: قرص، کپسول 250 و 500mg، سوسپانسیون 100mg/5ml و 200mg/5ml

موارد مصرف: یک آنتی بیوتیک است که برای گلودرد استرپتوکوکی - برونشیت - برخی انواع پنومونی و عفونت های کلامیدیایی مصرف می شود.

عوارض جانبی: اسهال، دردهای شکمی، تهوع و استفراغ، زخمهای دهانی یا زبان، خارش یا ترشح واژن، پلاک های سفید در دهان یا روی زبان، تب و درد مفصلی.

موارد احتیاط: *در صورت سابقه حساسیت به آزیترومایسین، اریترومایسین یا آنتی بیوتیک های دیگر پزشک را مطلع سازید .

*مصرف داروهای دیگر به ویژه کاربامازپین، سیکلویپورین، ضد انعقادها (رقیق کنند های خون مثل وارفارین)؛ تئوفیلین و آنتی اسیدهای حاوی آلومینیم/ منیزیم، سابقه بیماری کبدی پزشک را مطلع سازید.

*این دارو بهتر است با شکم خالی مصرف شود. (حداقل یک ساعت قبل یا ۲ ساعت بعد از غذا خورده شود).

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود



آلومینیوم ام جی اس

گروه دارویی: آنتی اسید

گروه درمانی: آنتی اسید

شکل دارویی: سوسپانسیون؛ قرص جویدنی

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: درمان اولسر پپتیک، ریفلاکس، زخم دوازدهه و سوءهاضمه

توجه:

آلومینیوم ام جی اس حاوی هیدروکسید آلومینیم، هیدروکسید منیزیوم و سایمتیکون است..

موارد منع مصرف: آپاندیسیت؛ اسهال مزمن؛ خونریزی از مجرای گوارشی یا مقعد، کولیت اولسروز؛ انسداد راه خروجی معده یا روده

عوارض جانبی: یبوست- اسهال- تهوع- دل پیچه

توجهات: *در درمان اولسر، دارو باید ۱ تا ۳ ساعت بعد از غذا و یا هنگام خواب برای افزایش اثربخشی مصرف شود.

*دارو را حداقل با فاصله ۱ تا ۲ ساعت از مصرف دیگر داروها مصرف نمایید.

*در درمان اسیدی شدن معده دارو نباید بیش از ۲ هفته مصرف شود مگر این که پزشک توصیه کرده باشد. *قبل از مصرف سوسپانسیون، آن را به خوبی تکان دهید.

شرایط نگهداری:

دمای کمتر از ۴۰ درجه سانتی گراد (ترجیحاً ۱۵ تا ۳۰ درجه سانتی گراد)



آمپی سیلین

نام تجاری: amcill

گروه دارویی: پنی سیلین ها (آمینوپنی سیلین ها)

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

شکل دارویی: کپسول ، شربت ، ویال تزریقی

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: عفونت های عمومی دستگاه تنفس ، سیستم ادراری ، عفونت پرده مغز (مننژیت)

میزان مصرف: روزانه ۱ تا ۴ گرم از راه خوراکی یا هر ۶ تا ۴ ساعت از راه عضلانی یا وریدی

موارد منع مصرف: حساسیت به پنی سیلین ها و عفونت مونو نوکلئوز

عوارض جانبی: اسهال ، اریتم (قرمزی) پوست ، مشکل خونی ، عارضه کلیوی و تشنج

توجهات: بهتر است محلول تزریقی آماده شده حداکثر طی یک ساعت تزریق شود.

*انفوزیون وریدی طی ۱۰ تا ۱۵ دقیقه صورت گیرد . *تزریق مستقیم وریدی سریع ممکن است منجر به

حملات تشنجی گردد. * با هر محلول حاوی دکستروز از جمله محلول های تغذیه داخل وریدی ناسازگاری

دارد.

آموزش: بیمار میبایست دوره درمان را کامل کند. بهتر است دارو با معده خالی با یک لیوان آب

مصرف شود. در صورت بروز آلرژی به پزشک اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: کپسول و ویال (محلول تزریقی) در دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه نگهداری شود.



آموکسی سیلین

نام تجاری: Amoxil

گروه دارویی: آمینو پنی سیلین

گروه درمانی: آنتی بیوتیک بتا - لاکتام

شکل دارویی: کپسول، قرص، شربت و سوسپانسیون

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: گونوره؛ عفونت های سیستمیک؛ عفونت ادراری؛ عفونت های کلامیدیائی و مایکو

پلاسمائی در طی حاملگی و آبسه حاد دندان؛ تورم دهانی؛ لنفادنوپاتی و تب

موارد منع مصرف: حساسیت به پنی سیلین ها یا سفالوسپورین ها

عوارض جانبی: تهوع و استفراغ، اسهال و واکنش های حساسیتی است. نوع راش پوستی به شکل

ماکولوپاپولر بوده و غیر آلرژیک می باشد و خاص آموکسی سیلین است.

توجهات: * در هنگام مصرف آموکسی سیلین از سایر روشهای جلوگیری از بارداری نیز باید استفاده نمود.

* در صورتی که یک نوبت مصرف دارو فراموش شود، به محض بیدار آوردن آن نوبت باید مصرف شود، ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد، از مصرف آن نوبت خودداری کرده و مقدار مصرف بعدی نیز نباید دو برابر گردد.

* آموکسی سیلین را می توان با معدۀ خالی یا پر مصرف کرد.

* بیمار می بایست دوره درمان را کامل کند.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود و سوسپانسیون تهیه شده در یخچال به مدت ۱۴ روز قابل

مصرف میباشد.



آمینوفیلین

نام تجاری: Amoline

گروه دارویی: مشتقات گزانتین

گروه درمانی: باز کننده ریه (برونش) ، ضد آسم

شکل دارویی: آمپول ۲۵۰mg/10ml

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: آسم ، تنگی راههای هوایی ، نارسایی احتقانی قلب و توقف تنفسی (آپنه) نوزادان.

میزان مصرف: افراد بالغ یک میلی گرم به ازای هر کیلوگرم و در سالمندان ۰٫۶ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم به صورت انفوزیون وریدی

موارد منع مصرف: حساسیت مفرط به گروه گزانتین ها ، نا منظمی قلبی ، کاهش کارکرد تیروئید (هیپوتیروئیدی) ولی در بیماران مبتلا به نارسایی کبدی ، بیمار دیابت قندی ، گلوکوم و فشار خون و زخم معده و روده با احتیاط مصرف شود.

عوارض جانبی: افزایش ضربان قلب ، لرزش دست ، تشنج ، ایست قلبی

توجهات: *نباید دارو سریعاً انفوزیون شود زیرا باعث ایست قلبی می شود .

*در صورت تغییر رنگ نباید مصرف شود.

*در صورت افزایش ضربان قلب به پزشک اطلاع دهید زیرا نشانه مسمومیت دارویی است.

آموزش: بیماران باید استعمال سیگار را قطع کنند.

*همزمان مصرف نوشابه و غذا های حاوی گزانتین ممنوع است.

شرایط نگهداری: در دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه نگهداری شود.



آمیودارون

نام تجاری: Cordaron

گروه دارویی: گروه بنزوفوران

گروه درمانی: ضد آریتمی قلب یا دهلیز (قلبی)

شکل دارویی: قرص و آمپول (۲۰۰ و ۱۵۰ میلی گرمی)

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: بی نظمی ریتم قلبی (آریتمی) در بطن یا فوق بطن، فیبریلاسیون یا فلوتر دهلیزی

میزان مصرف: دوز یا میزان برای شروع اولیه روزانه ۸۰۰ تا ۱۶۰۰ میلی گرم از راه خوراکی به مدت یک تا

سه هفته و میزان مصرف نگهدارنده ۲۰۰ تا ۶۰۰ میلی گرم در روز

موارد منع مصرف: بلوک قلبی درجه ۲ و ۳ کم کاری قلبی (برادیکاردی) و اختلال عملکرد گره SA ولی در

موارد نارسایی کبدی یا ریوی و تیروئید کودکان با احتیاط مصرف شود.

عوارض جانبی: بی نظمی جدید در ریتم قلبی ، آسیب کبدی ، عارضه ریوی نوروپاتی محیطی ، سردرد و

حساسیت به نور ، اختلال بینایی

توجهات: * در مورد علائم گوارشی در ابتدای درمان هشدار دهید.

* در مصرف وریدی (انفوزیون) ، اندازه گیری فشار خون بیمار را باید مد نظر قرار داد.

آموزش: * به بیمار آموزش دهید تا نبض خود را روزانه اندازه بگیرد.

* بیمار تا ۴ ماه پس از قطع دارو نباید در معرض نور قرار گیرد .

* تست ریوی و چشمی بعد از مصرف ضروری است.

شرایط نگهداری: دور از نور و حرارات اتاق نگهداری شود.



آنتی دی ایمونوگلوبولین

نام تجاری: Partobulin- Rhogam - روفیلاک

گروه دارویی: ایمونوگلوبولین انسانی آنتی بادی

گروه درمانی: آنتی بادی ضد Rho D

شکل دارویی: آمپول

موارد مصرف: این فرآورده به منظور جلوگیری از ایجاد واکنش به فاکتور Rh و جلوگیری از بیماری همولیتیک نوزادان در بارداری‌های بعدی استفاده می‌شود. - ملاک تجویز دارو در بارداری عبارتند از: مادر Rh منفی باشد و قبلاً نسبت به فاکتور Rh حساس نشده باشد و نوزاد و یا پدر Rh مثبت باشد.

در افراد Rh منفی که اشتبهاً خون Rh مثبت استفاده کرده‌اند نیز برای جلوگیری از واکنش بر علیه فاکتور Rh استفاده از این ایمونوگلوبین توصیه شده است.

موارد منع مصرف: ۱- در افرادی که سابقه واکنش‌های آنافیلاکتیک یا واکنش‌های شدید سیستمیک نسبت به گلوبولین‌های انسانی دارند نباید مصرف شود. ۲- برای نوزادان بعد از تولد افراد Rh منفی که قبلاً نسبت به فاکتور Rh حساس شده‌اند نباید تجویز شود.

هشدار: این دارو باید عضلانی مصرف و ترجیحاً در عضله دلتوئید تزریق شود.

عوارض جانبی: ناراحتی در محل تزریق، تب، درد عضلانی و خواب‌آلودگی از عوارض جانبی این داروست.

شرایط نگهداری: در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی‌گراد نگهداری و از انجماد آن جلوگیری شود مگر اینکه در بسته‌بندی دارو شرایط نگهداری خاص دیگری ذکر شده باشد.



استامینوفن

نام تجاری: Paracetamol

گروه دارویی: مشتق پارا آمینوفنل

گروه درمانی: ضد درد غیر مخدر ، ضد تب

شکل دارویی: قرص ، شربت ، شیاف ، قطره ، ویال

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: درد های خفیف ، تب

میزان مصرف: بالغین ۳۲۵ تا ۵۰۰ میلی گرم - کودکان ۱۲۰ تا ۲۴۰ میلی گرم

موارد منع مصرف: بیماری های شدید کبدی ، حساسیت دارویی

عوارض جانبی: ضعف ، خواب آلودگی ، زخم دهانی ، راش ، ادرار خونی یا کدر ، درد شکمی ،

مشکلات خونی ، یرقان

توجهات: قرص استامینوفن را میتوان خرد کرد و با مایعات دیگر مخلوط کرد و خورد ، با شیرینی

ها مصرف نشود.

آموزش: دارو با یک لیوان آب مصرف شود.

شرایط نگهداری: شیاف باید در یخچال و بقیه اشکال دارویی در دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه و دور از

نور نگهداری شود.

نکته: در حاملگی و شیر دهی عارضه خاصی گزارش نشده است .



استامینوفن کدئین

گروه دارویی: ترکیب استامینوفن+کدئین

گروه درمانی: ضد درد

شکل دارویی: قرص

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: درد خفیف تا شدید

میزان مصرف: ۱ تا ۲ قرص هر ۴ ساعت تا ۶ ساعت

موارد منع مصرف: حساسیت به دارو، بیماری سیروز کبدی و کتواسیدوز دیابتیک بیماری

التهابی روده، زخم روده بزرگ، نارسایی کلیه،

نکته: برای کودکان زیر ۳ سال قابل تجویز نیست.

عوارض جانبی: درد شکم، اسهال، نفخ

توجهات: دارو باید در آغاز غذا مصرف شود.

آموزش: در صورت بروز عارضه گوارشی به پزشک مراجعه شود.

*وزن کردن منظم نیز توصیه می شود(عوارض کلیوی).

شرایط نگهداری: در دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه نگهداری شود.



استیل سالیسیلیک اسید = ASA

نام تجاری: Aspirin

گروه دارویی: سالیسیلات

گروه درمانی: ضد التهاب / ضد درد غیر مخدر / ضد تب / مهارکننده تجمع پلاکتی

اشکال دارویی: قرص / قرص جویدنی / شیاف

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: انواع دردهای متوسط تا خفیف، تب، بیماریهای التهابی همچون روماتوئید آتریت و کاوازاکی و بعنوان مهار کننده تجمع پلاکتی؛ سکتة قلبی حاد؛ بیماری کرونری بدون علامت؛ آنژین پایدار مزمن و آنژین ناپایدار

موارد منع مصرف: آسم؛ حساسیت مفرط؛ زخم معده؛ اختلالات انعقادی خونریزی دهنده؛ آنژیوادم و کهیر

عوارض جانبی: زخمهای گوارشی و جلوگیری از لخته شدن خون و سردرد و پان سیتوپنی و راش

توجهات: * حداقل یک هفته قبل از انجام عمل جراحی باید قطع شود

* اگر بوئی شبیه به سرکه به مشام رسید قرص دور انداخته شود.

* روزانه وزن - جذب و دفع و ادم را در پاها و ساق های پان کنترل کنید

* به منظور کاهش عوارض گوارشی دارو با غذا یا شیر میل شود.



استیل سیستن

نام تجاری: Mucomyst , Parvalex

گروه دارویی: موکولیتیک

اشکال دارویی: آمپول، قرص و قرص جوشان.

مکانیسم اثر:

با شکستن باندهای دی سولفیدی موکوپروتئین ها باعث کاهش ویسکوزیته ترشحات می شود. افزایش گلوکوتایون کبدی که برای خنثی سازی متابولیست های سمی ناشی از مصرف بیش از حد استامینوفن ضروری است.

موارد مصرف:

مسمومیت با استامینوفن، برونشیت، پنومونی، سپتیک فیبروزیس، آمفیزم، آتلکتکازی، سل، ایلئوس مکنونیوم نوزادان

عوارض جانبی: خواب آلودگی - تهوع - استفراغ - کهیر - راش - برونکواسپاسم

توجهات: * دارو را در یخچال نگه دارید و در عرض ۹۶ ساعت بعد از بازکردن آن را مصرف نمائید.

* به هنگام استفاده از دوز استنشاقی برونکودیلاتور در دسترس داشته باشید تا در صورت برونکواسپاسم مورد استفاده قرار گیرد. * در صورتیکه بیمار به منظور خارج ساختن ترشحات سرفه ناموثر داشته باشد از ساکشن مکانیکی استفاده نمائید.

* در انفوزیون وریدی با سرم % 5 DW رقیق کنید.



اسید آسکوربیک – ویتامین C

نام تجاری: Ascorbicap

گروه دارویی: ویتامین C

اشکال دارویی: آمپول، قرص و قرص جوشان

موارد مصرف: پیشگیری و درمان اسکوروی، کمک به درمان سوختگی های شدید، بهبودی شکستگی یا زخم، بیماریهای مزمن و اسیدی کردن ادرار.

عوارض جانبی: سرگیجه، درد در محل تزریق، اسهال، سوزش سر دل، کرامپ شکمی، تخریب سلول داسی شکل، افزایش دفع ادرار، سوزش ادرار، کریستالوژی، بی خوابی.



اسید فولیک

نام تجاری: Folvite

گروه دارویی: (اسید فولیک VB₉)

گروه درمانی: ویتامین ها

شکل دارویی: قرص ۵ میلی گرمی و تزریقی

مصرف در دوران حاملگی: گروه A

موارد مصرف: کمبود اسید فولیک ، درمان کم خونی

میزان مصرف: در درمان یک قرص روزانه و در پیشگیری ۰٫۲ میلی گرم در روز مفید است.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی

عوارض جانبی: ضایعات تنفسی و پوستی بروز می کند ولی نادر است.

توجهات: این دارو در آنمی مگالوبلاستیک باید همیشه همراه با ویتامین ب_{۱۲} باشد.

*این دارو در زنان حامله و سالمند بسیار مفید است.

آموزش: دارو را خودسرانه استفاده نکنید.

*در صورت احتمال حساسیت به پزشک اطلاع دهید.

*رنگ ادرار ممکن است به زرد روشن تغییر یابد .

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود. دارو را در ظروف مقاوم به نور نگهدارید



انسولین

نام تجاری: Iletin

گروه دارویی: هورمون ها

گروه درمانی: ضد دیابت (قندی)

شکل دارویی: تزریقی

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: کنترل دیابت قندی ، کتواسیدوز دیابتی ، دیابت ناشی از حاملگی

میزان مصرف: طبق دستور متخصص عمل شود. البته 0.5 تا 1 واحد به ازای هر کیلو گرم وزن معمول است.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی و پایین بودن قند از موارد ممنوعیت حساب می شود.

عوارض جانبی: کاهش قند خون ، تورم ، قرمزی ، درد محل تزریق، ضایعات جلدی آتروفی (لاغری) در محل تزریق ، شوک و حساسیت شدید.

توجهات: تنها انسولین رگولار یک ساعت قبل از غذا است *تنها انسولین رگولار میتوان ویریدی تزریق

کرد. *دراوج اثرانسولین ممکن است هیپوگلیسمی رخ دهد و تظاهرات زیرراچک کنید

*هر گاه دو انسولین رگولار و NPH را با هم دیگر می خواهید تزریق کنید همیشه ابتدا انسولین رگولار را به داخل سرنگ بکشید. *جهت درمان موثر دیابت لازم است قندخون ناشتا (نرمال : $130-70$ mg/dl) قندخون

2 ساعت بعد از غذا ($150-80$ mg/dl) و هموگلوبین گلیکوزیله چک شوند. *طی دوره بیماری لازم است کتون

ادراکنترل شود طی دوره های استرس بیمار و جراحی نیاز به انسولین افزایش می یابد. *دراوج اثرانسولین

ممکن است هیپوگلیسمی رخ دهد و تظاهرات زیرراچک کنید: تعریق؛ ضعف؛ گیجی؛ لرز؛ تهوع؛ نبض سریع

و ضعیف؛ خستگی بیش از حد؛ تاکیکاردی؛ اختلالات حافظه ای؛ اختلال در تکلم؛ قدم برداشتن آهسته

و کند؛ اضطراب؛ ترمور و گرسنگی. *مراقب تظاهرات هیپرگلیسمی باشید: استشمام بوی استون از تنفس؛ پلی

اوری؛ خستگی بیش از حد؛ گر گرفتگی؛ پوست خشک؛ خواب الودگی و لتارژی.

بهترین زمان تزریق انسولین رگولار یک ساعت قبل از غذا است. *سطح قند خون را با دستگاههای خانگی

اندازه گیری کنید. *بیمار می بایست برای کنترل قند خون رژیم را نیز رعایت کند.

شرایط نگهداری: انسولین را در درجه حرارت اتاق می توان تا یک ماه نگهداری کرد. دارو نباید در معرض

نور خورشید یا حرارت قرار بگیرد. دمای مناسب 5 تا 38 درجه است.



اپی نفرین

نام تجاری: Adernalin

گروه دارویی: سمپاتومیمیتیک

گروه درمانی: بازکننده ریه ، بالا برنده فشار خون

شکل دارویی: تزریقی

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: ایست قلبی - دراحیای قلب و ریه داروی بسیار حیاتی است و در درمان شوک ناشی از حساسیت دارویی (آنافیلاکسی) یا آسم و حملات ریوی در کودکان و جوانان بسیار مفید است.

میزان مصرف: میزان غلظت آن 0.0001 یا 0.0001 قابل استفاده در آسم به صورت زیر جلدی با غلظت $1000/1$ به میزان 0.1 تا 0.5 میلی گرم تزریق شود.

موارد منع مصرف: آسیب مغزی ، بی نظمی قلب ، نارسایی عروق و حساسیت دارویی

عوارض جانبی: سر درد ، تپش قلب ، تهوع ، افزایش فشار خون ، سنکوپ

توجهات: *در تهیه غلظت طبق دستور عمل شود.

*گاهی برای بی حسی موضعی از ترکیب اپی نفرین و لیدوکائین استفاده می شود. این کار را در انتهای اندام ها (دست و پا) نباید انجام داد.

*ضربان قلب و فشار خون را کنترل کنید.

آموزش: افزایش تعداد ضربان قلب جزء عوارض دارویی است .

*از مصرف خودسرانه به ویژه در سالمندی پرهیز کنید .

*در صورت احتمال حساسیت دارویی به ویژه آنتی بیوتیک ، آن را آماده داشته باشید.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.



اریتروپوئین آلفا

نام تجاری: Eprex

گروه دارویی: اریتروپوئین نو ترکیب انسانی

گروه درمانی: ضد کم خونی

اشکال دارویی: سرنگ های آماده تزریق ۲۰۰۰، ۴۰۰۰، ۱۰۰۰۰ واحد در ۰/۵ میلی لیتر

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: کم خونی ناشی از نارسایی مزمن کلیه - کم خونی (شدید) ناشی از تجویز زیدوودین در بیماران مبتلا به HIV - کم خونی ناشی از شیمی درمانی در بیماران مبتلا به سرطان - کاهش میزان ترانسفیوژن خون (آلوژنیک) در بیمارانی که تحت عمل جراحی (غیر از قلبی - عروقی)

موارد منع مصرف: -هایپرتانسیون کنترل نشده؛ حساسیت به آلبومین انسانی

عوارض جانبی: سردرد؛ هایپرتنشن؛ اسهال؛ خارش، راش؛ واکنش محل تزریق سرفه

توجهات: * به صورت زیرجلدی می باشد * در صورت ابتلای بیمار به بیماری ایسکمیک عروقی،

ترومبوسیتوز، سابقه تشنج، بیماری های بدخیم و نارسایی مزمن کبدی باید با احتیاط مصرف شود.

* قبل و در طول درمان با این دارو، فشارخون، هموگلوبین و الکترولیت ها باید دقیقاً کنترل شوند.

* سایر عوامل ایجاد کننده کم خونی در نارسایی مزمن کلیوی مثل کمبود آهن یا فولات یا ویتامین B12 باید تصحیح شوند. * در صورتی که در هنگام مصرف دارو، درد مداوم شبه میگرنی بروز کرد، علامت افزایش شدید و ناگهانی فشار خون می باشد.

* این دارو ممکن است مقدار مورد نیاز هپارین را افزایش دهد. * وجود همزمان عفونت ها یا بیماری های التهابی

ممکن است موجب تغییر پاسخ درمانی به این دارو شود. * در صورتی که فشارخون بیمار کنترل نگردد،

مصرف این دارو باید قطع شود. * دارو نباید تکان داده شود.

* در طول مدت مصرف این دارو، در صورت نیاز باید مکمل آهن مصرف شود.

شرایط نگهداری: در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد و دور از نور نگهداری شود.



اریترومایسین

نام تجاری : Erythrocin

گروه دارویی: ماکرولید

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

اشکال دارویی: Injection: Tablet, Chewable: 200mg Tablet: 200, 400mg Powder, For Suspension: 200mg/5ml 1g

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: عفونت دستگاه تنفس فوقانی ، گوش ، عفونت ریوی، عفونت های لگنی ، اورتریت غیر گونوکوکی ، تب رماتیسمی

موارد منع مصرف : حساسیت شدید دارویی ، نارسایی کبدی

عوارض جانبی: تهوع ، استفراغ ، اسهال ، مشکلات شنوایی ، کهیر

توجهات: در حساسیت به گروه پنی سیلین ها اریترومایسین جایگزین مناسبی است.

در صورت مصرف مقادیر زیاد دارو، یرقان انسدادی و عوارض قلبی با مصرف این دارو گزارش شده اند

آموزش: * به منظور کاهش عوارض گوارشی دارو با غذا میل شود.

*عوارض کبدی دارو طی چند هفته ظاهر می شوند.



انوکسپارین

نام تجاری: سلکسان

گروه دارویی: ضد انعقاد از دسته هپارین های باوزن مولکولی پائین

گروه درمانی: ضد انعقاد

شکل دارویی: آمپول های زیر جلدی داخل سرنگ در انواع ۲۰۰۰ و ۴۰۰۰ و ۶۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ واحدی

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: یشگیری از لخته خونی در بیماران با بیماریهای خاص - بیماران تحت جراحی جایگزینی هیپ یا زانو یا جراحی معده - پیشگیری از حمله قلبی در آنژین صدری ناپایدار (درد قفسه سینه) - ترومبوز ورید های عمقی - شرایطی که تشکیل لخته خونی در عروق ساق پا میشود

موارد منع مصرف: اولسرپپتیک ، هموفیلی یا سایر اختلالات هموراژیک ، ترومبوسایتوپنی ، خونریزی اخیر مغزی ، هایپرتانسیون شدید ، بیماریهای شدید کبدی ، حساسیت شدید به هپارین

عوارض جانبی: خونریزی ، هایپرکالمی ، ترومبوسایتوپنی ، نکروز پوست در محل تزریق ، واکنشهای حساسیت مفرط ، استئوپروز در صورت مصرف طولانی

توجهات: * اندازه گیری غلظت پتاسیم سرم قبل از شروع و در طول درمان توصیه می گردد - * شمارش تعداد پلاکتها در درمانهای طولانی تر از ۵ روز ضروری است و در صورت بروز ترومبوسایتوپنی یا ۵۰٪ کاهش تعداد پلاکت قطع دارو و اجتناب از مصرف مجدد آن توصیه می شود. * در صورت بروز خونریزی ناشی از مصرف بیش از حد (over dosage دارو) ، تزریق آهسته داخل وریدی پروتامین سولفات با دوز معین توصیه می شود . * سفتی و درد قرمزی و کبود شدگی در محل تزریق با استفاده از کیسه یخ علائم رابرترف می کند .

شرایط نگهداری: دارو را در ۲۵°C نگاهدارید آن را منجمد نسازید



اکسی توسین

نام تجاری: Syntocinon

گروه دارویی: اکسی توسیک

گروه درمانی: محرک انقباض رحم – محرک ترشح شیر

اشکال دارویی: آمپول ۵ و ۱۰ واحدی

مصرف در حاملگی: گروه C

مکانیسم اثر: انقباض عضله صاف رحم را تحریک می کند (تقلید انقباضات طبیعی و خود به خود زایمان). برای افزایش خروج شیر از سینه ها، عضلات صاف پستان را تحریک می کند.

مقدار و روش مصرف:

القاء و تحریک زایمان: ابتدا یک تا دو میلی واحد در دقیقه از راه انفوزیون وریدی تجویز می شود سپس به تدریج با همان مقادیر هر ۱۵ تا ۳۰ دقیقه یک بار افزایش می یابد (به منظور ایجاد الگوی انقباضی مشابه با زایمان خود به خودی) این مقدار نباید از ۲۰ میلی واحد در دقیقه بیشتر شود.

سقط ناکامل و اجتناب ناپذیر: ۱۰ واحد اکسی توسین با سرعت ۲۰-۱۰ میلی لیتر در دقیقه انفوزیون می شود.

کنترل خونریزی بعد از زایمان، ۱۰ تا ۴۰ واحد (حداکثر ۴۰ واحد در یک لیتر)، با سرعت ۲۰ تا ۴۰ میلی واحد در دقیقه پس از خروج نوزاد از کانال زایمان، انفوزیون می شود یا ۱۰ واحد پس از زایمان جفت از راه عضلانی تزریق می شود.

شروع اثر این دارو در تزریق وریدی بلافاصله بعد از تزریق بوده و مدت زمان اثر در تزریق وریدی یک ساعت است و در کبد و کلیه، متابولیزه و تخریب می شود.



موارد منع مصرف:

حساسیت به دارو، عدم تناسب آشکار سری- لگنی یا قرار گرفتن نامطلوب جنین در رحم مادر، پره ماچوریتی سر راهی، جراحی قبلی رحم یا سرویکس، وضعیت های مستعد کننده آمبولی ترومبوپلاستین، زایمانهای متعدد.

عوارض جانبی:

در جنین: برادیکاردی و سایر آرتیمی ها، هیپوکسی، خونریزی داخل جمجمه، تروما ناشی از خروج سریع از لگن، یرقان نوزاد.

مادر: حساسیت مفرط منتهی به هیپرتونیستی رحم، پارگی رحم، خونریزی بعد از زایمان، آرتیمی های قلبی، هماتوم لگن، تهوع، استفراغ، خونریزی زیر عنکبوتیه، افزایش جریان خون.

توجهات: سولفات منیزیم بالای سر بیمار باشد.

* سرم را تکان ندهید تا محتویات آن مخلوط شود بلکه باید آن را بچرخانید.

* به پرزانتاسیون جنین و اقطار لگنی توجه کرده در صورتیکه تغییری در ضربان قلب جنین پدید آمد مادر را به پهلوئی چپ بخوابانید.

* ریتم و عمق تنفس و نبض و فشار خون را اندازه گرفته و تغییرات آن را از نظر خونریزی مد نظر داشته باشید.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.



اسلتامیویر Oseltamivir

گروه داروئی: مهار کننده نوروآمیداز ویروس آنفلوانزا

گروه درمانی: ضد ویروس.

Powder for solution: 60 mg/5ml

اشکال دارویی: Capsule: 75mg

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: بیماری حاد و غیر کمپلیکه ناشی از عفونت آنفلوانزا در بیمارانی که نشانه ها را دو و یا کمتر از دو روز داشته‌اند. - پیشگیری از آنفلوانزا بعد از تماس نزدیک با فرد آلوده، دارو درمانی باید حداکثر تا دو روز بعد آغاز شود.

مکانیسم اثر: عملکرد ضد ویروسی

اسلتامیویر در کبد به فرم فعال اسلتامیویر کربوکسیلاز هیدرولیز می شود. اسلتامیویر کربوکسیلاز آنزیم نورآمینیداز را در ذرات ویروس آنفلوانزا مهار می کند. تصور می شود این عمل جلوی نسخه برداری ویروس را احتمالاً از طریق دخالت در تجمع ذرات ویروس و آزاد سازی از سلول میزبان می گیرد.

عوارض جانبی: سرگیجه ، خستگی، سردرد، بی خوابی، سرگیجه. درد شکمی ، اسهال، حالت تهوع، استفراغ. برونشیت ، سرفه.

مسمومیت و درمان: مصرف یک دوز به مقدار ۱۰۰۰ mg تنها باعث حالت تهوع و استفراغ می شود. دوز کلی در یک دوره ۵ روزه ۷۵۰ mg است.

توجهات: *مصرف اسلتامیویر با غذا باعث تسکین عوارض گوارشی دارو می شود

*تهوع و استفراغ بیشترین عوارض معمول دارو می باشند

*به بیمار توصیه کنید دوره پنج روزه درمان را کامل کنند حتی با احساس بهبودی



امپرازول

نامهای تجاری: Omeazole

گروه دارویی: مشتقات بنزایمیدازول

گروه درمانی: ضد زخم پپتیک. / سرکوب گر اسید معده

اشکال دارویی: کپسول ۲۰ میلی گرمی

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: درمان زخم دئودنوم - درمان ازوفازیت شدید - درمان ریفلاکس گاستروازوفازیال شدید -
درمان سندرم زولینگر-الیسون - درمان زخم معده

موارد منع مصرف: حساسیت مفرط نسبت به دارو و ترکیبات آن

عوارض جانبی: سردرد، اسهال، بثورات جلدی، کهیر و سرگیجه

توجهات: * در صورت بروز سوءهاضمه، اسهال و کهیر طی درمان، به پزشک مراجعه شود.

* در صورت اثبات وجود سرطان معده از مصرف این دارو باید خودداری گردد.

* کپسول دارو باید بلافاصله قبل از غذا و ترجیحاً در صبح مصرف شود

* در صورت ایجاد سرگیجه و خواب‌آلودگی از رانندگی و دیگر فعالیت‌های همراه با حادثه، بپرهیزد.



اندانسترون

نام تجاری: Zofran

گروه داروئی: آنتاگونیست گیرنده سروتونین

گروه درمانی: ضد استفراغ .

اشکال داروئی: قرص روکش دار ۴ میلی گرمی، محلول خوراکی ۴ میلی گرم در ۵ سی سی، آمپول ۲ میلی گرم در سی سی، ۲ سی سی، و ۴ سی سی.

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: جلوگیری و درمان تهوع و استفراغ، بعد از: عمل جراحی، رادیوتراپی، و شیمی درمانی کانسر

موارد منع مصرف: حساسیت مفرط نسبت به دارو .

در نارسایی کبد باید اندانسترون را، با احتیاط تجویز کرد.

عوارض جانبی: سردرد، خستگی، بدحالی، خواب آلودگی، اضطراب، آژیتاسیون، سرگیجه، سندرم خارج

هرمی، تشنجات گراندمال(نادر)، سنکوپ(نادر)، یبوست، دل درد، احتباس ادرار، آریتمی، آنژین

توجهات: ۴۸ ساعت بعد از رقیق سازی در درجه حرارت اتاق قابل نگهداری است .



ایبوپروفن

نام تجاری : Brufen

گروه دارویی : ضد التهاب غیر استروئیدی

گروه درمانی : ضد درد غیر مخدر، ضد تب، ضد التهاب

شکل دارویی : قرص های ۲۰۰ و ۴۰۰ mg ، سافت ژل ۲۰۰ و ۴۰۰ mg و شربت

خوراکی ۱۰۰ mg/5ml

مصرف در دوران حاملگی : گروه C

موارد مصرف : آرتریت روماتوئید، استئوآرتریت، دیسمنوره اولیه، نقرس، درد دندان، اختلالات عضلانی -

اسکلتی؛ کاهش تب

موارد منع مصرف : حساسیت مفرط به آسپرین با داروهای ضد التهاب، سندروم پولیپ نازال، آنژیوادم،

واکنش برونکواسپاسم نسبت به NSAIDS (داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی)، عفونت درمان نشده،

مشکلات کلیوی، خونریزی گوارشی

عوارض جانبی : مصرف دراز مدت بروفن مانند سایر ضدالتهاب‌های غیراستروئیدی خطر حمله قلبی را بالا

می‌برد؛ تهوع ، استفراغ ، دل درد ، خونریزی دستگاه گوارش

توجهات : *بیمار مواردی مانند تاری دید، صدای زنگ یا غرش در گوش‌ها را ممکن است به دلیل

مسمومیت دارویی باشد گزارش کند.

*در صورت ایجاد سرگیجه و خواب‌آلودگی از رانندگی و دیگر فعالیت‌های همراه با حادثه، بپرهیزد.

*گزارش کردن تغییرات ادراری، افزایش وزن، ادم، افزایش درد مفاصل، تب، خون در ادرار که می‌تواند به

علت اثر سمیت کلیوی دارو باشند. *اگر ایبوپروفن را برای درد یا تب می‌خورید و درد ظرف ۱۴ روز و تب

ظرف ۳ روز بهتر نشده یا حتی بدتر شده است با پزشکتان مشورت کنید.

شرایط نگهداری : این دارو در دمای C ° ۱۵-۳۰ و دور از نور نگهداری شود.



ایمونوگلوبولین ضد کزاز

نام تجاری: تتابولین

گروه دارویی: آنتی بادی ضد توکسین کزاز

گروه درمانی: ایمنی پاسیو علیه کزاز

شکل دارویی: ویال

موارد مصرف: این فرآورده برای ایجاد ایمنی انتقالی بر علیه بیماری کزاز در افراد زخمی

عوارض جانبی:

شوک آنافیلاکتیک، کاهش فشار خون، کهیر، اختلال تنفسی و تشنج

هشدارها:

*قبل از تزریق، آزمون حساسیت انجام شود.

*بدلیل کوتاه بودن اثر این پادزهر نباید از آن برای پیشگیری استفاده شود. اگرچه می توان برای کودکان واکسینه نشده و در معرض خطر ابتلا استفاده کرد. در این صورت باید به طور همزمان برای ایجاد ایمنی فعال توکسوئید کزاز نیز تزریق شود.

*آزمون حساسیت: مقدار $0/2$ میلی لیتر از محلول رقیق شده ($10:1$ برای افراد بدون سابقه و $100:1$ برای افراد با سابقه آلرژی) از سرم طبیعی اسب یا پادزهر را باید زیر جلدی تزریق کرد. بعد از 30 دقیقه در صورت عدم واکنش $0/2$ میلی لیتر از فرآورده رقیق نشده باید تزریق شود، در صورت عدم واکنش حساسیتی می توان مقدار کافی از این پادزهر را مصرف کرد.

*این پادزهر فقط سم باکتری Clostridium tetani را خنثی می کند و اثری بر خود باکتری ندارد. بنابراین علاوه بر تزریق پادزهر، سایر درمان های زخم ضروری است. ضد عفونی زخم بوسیله ترکیبات ید اثر تخریبی قابل ملاحظه ای بر سم باکتری نیز دارد.

* در صورتی که فرد به سرم حساسیت داشته یا قبلا با توکسوئید کزاز واکسینه شده باشد، بیمار باید فقط یک نوبت تزریق توکسوئید کزاز دریافت کند و نیازی به تزریق پادزهر نیست.

به منظور درمان بیماری کزاز، علاوه بر مصرف پادزهر، همزمان درمان های جراحی و علامتی شامل مصرف آنتی بیوتیک ها، آرام بخش ها، ضد تشنج ها و شل کننده های عضلانی ضروری می باشد.

شرایط نگهداری: فرآورده را باید در دمای بین $2-8$ درجه سانتیگراد نگهداری و از انجماد آن جلوگیری کرد.



ایمونوگلوبین ضد هپاتیت ب=HBIG

نام تجاری: Immuno HBS

گروه دارویی: ایمونوگلوبین ضد ویروس هپاتیت ب

گروه درمانی: ایمنی سازی پاسیو

مصرف در دوران حاملگی : گروه C

اشکال دارویی: ویالهای ۱۸۰- ۲۳۰ و ۵۴۰ واحدی

موارد مصرف: برای پیشگیری از ابتلای نوزاد متولد شده از مادر دارای هپاتیت B حداکثر تا ۷۲ ساعت بعد از تولد تزریق ایمونوگلوبین با دوز ۱۸۰ یا ۲۳۰ ضروری است. البته تزریق نوبت‌های بعدی واکسن هپاتیت در ۳ دوره نیز توصیه می‌شود.

هم‌چنین در مواردیکه افراد با وسایلی برنده که به خون افراد مشکوک به هپاتیت آغشته شده باشد تماس داشته باشند. (بخصوص پرستاران - کادر درمان شاغل در مراکز درمانی- افراد شاغل در اتاق عمل - آزمایشگاه و ...) تزریق ایمونوگلوبین آنتی هپاتیت ۵۴۰ واحدی حداکثر تا ۷۲ ساعت بعد از تماس با خون مشکوک یا آلوده ضروری است.

شرایط نگهداری: در دمای بین ۲ تا ۸ درجه سانتی‌گراد باید نگهداری شود.



بتاهیستین

نام تجاری: Betaserc

گروه داروئی: آنالوگ هیستامین

گروه درمانی: ضد سرگیجه و ضد منییر

مصرف در دوران حاملگی : گروه C

شکل داروئی: قرص ۸ میلی گرمی

موارد مصرف: بیماری Menier's (سرگیجه، وزوز گوش، کاهش شنوایی) ؛ درمان سرگیجه

موارد منع مصرف: فئوکروموسیتوما ؛ زخم گوارشی فعال

عوارض جانبی: اختلالات گوارشی، سردرد، بثورات پوستی و خارش

توجهات: *در صورت ابتلا بیمار به آسم، سابقه زخم گوارشی با احتیاط مصرف شود.

*این دارو مشابه هیستامین عمل میکند و نباید با آنتی هیستامین تجویز شود .

*باید همراه غذا یا شیر استفاده کرد



بیپرایدین

نام تجاری: آکینتون - Nimuscar- (Akinetone)

گروه دارویی: آنتی کولینرژیک

گروه درمانی: ضد پارکینسونیسم

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

شکل دارویی: قرص 2 mg و آمپول 10 میلی گرم

موارد مصرف: در درمان پارکینسون و برطرف کردن عوارض اکستراپرامیدال داروها به کار می‌رود.

عوارض جانبی: اغتشاش شعور - چشم درد - تاری دید - گرفتگی عضلات - گیجی و منگی

توجهات: * از قطع ناگهانی دارو اجتناب ورزید .

* برای برطرف شدن خشکی دهان از آدامس ؛ آب نبات و نوشیدن جرعه های مکرر آب استفاده نمائید .

* این دارو میزان تعریق را کاهش میدهد.

* مراقب سوء مصرف این دارو جهت ایجاد کردن سرخوشی باشید .



بیزاکودیل

گروه دارویی: ملین

گروه درمانی: ملین محرک

اشکال دارویی: شیاف ۵ و ۱۰ میلی گرمی و قرص.

موارد مصرف: به عنوان ملین یا مسهل محرک جهت درمان کوتاه مدت یبوست، تخلیه رکتوم و کولون قبل از انجام آزمایش و یا جراحی به کار می رود.

موارد منع مصرف: آپاندیسیت یا وجود نشانه های آن، خونریزی و التهاب رکتوم، انسداد روده،

عوارض جانبی: اسهال، تهوع و تحریک مخاط روده، ضربان نامطلوب قلب، کرامپ های عضلانی



پانتوپرازول

نام تجاری: Pantozol

گروه دارویی: مهار کننده پمپ پروتون

گروه درمانی: کاهنده اسید معده

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

شکل دارویی: قرص 20 mg - 40 mg و ویال 40 mg و کپسول 15 mg, 40 mg, 20 mg

موارد مصرف: درمان و پیشگیری رفلکس معده، مری، درمان زخم معده و اثنی عشر

موارد منع مصرف: در صورت هرگونه حساسیت به ماده مؤثر و یا سایر اجزاء قرص مصرف آن منع شده است.

عوارض جانبی: اسهال - سردرد - حساسیت - درد قفسه سینه - تنگی نفس - زردی



پتاسیم کلراید

گروه دارویی : جانشین پتاسیم

گروه درمانی : اصلاح الکترولیتی

اشکال دارویی : Tablet: **500-600 mg** ، ویال $1\text{mEq}/10\text{ml}$, $2\text{mEq}/10\text{ml}$

مصرف در حاملگی: گروه A

موارد مصرف : مسمومیت مزمن با دیگوکسین ؛ هیپوکالمی همراه یا بدون آلكالوز متابولیک ؛

اسهال، استفراغ طولانی

هشدار : این دارو در موارد زیر باید با احتیاط مصرف شود: اسهال طولانی یا شدید، اختلال در عملکرد

مری، طولانی بودن زمان تخلیه معده، انسداد روده، فلج دوره‌ای، انسداد شدید یا کامل قلب و زیادی پتاسیم خون یا حالاتی که منجر به زیادی پتاسیم خون می‌شود.

عوارض جانبی : ضربان نامنظم یا آهسته قلب، بیحسی یا گزگز در دستها، پا یا لب، اشکال در تنفس،

اضطراب، خستگی یا ضعف، ضعف یا احساس سنگینی در پاها

توجهات : * دوره درمان باید کامل شود، بویژه اگر از داروهای مدر یا دیگوکسین استفاده می‌شود.

* در صورت بروز علائم خونریزی گوارشی، مراجعه فوری به پزشک ضروری است

* غلظت‌های پلاسمائی بیش از $5/5\text{mEq/L}$ بعلت احتمال بروز آریتمی خطرناک است.

* پیگیری دقیق وضعیت بیمار، بررسی الکتروکاردیوگرام و اندازه گیری غلظت پتاسیم ممکن است ضروری باشد.

* در صورت بروز اختلال در عملکرد کلیه (کم ادراری یا افزایش کراتینین سرم)، انفوزیون کلرور پتاسیم باید فوراً قطع شود.



پتیدین

نام تجاری: Dolantin

گروه دارویی: فنیل پیریدین

گروه درمانی: مخدر

شکل دارویی: تزریقی ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم

مصرف در دوران حاملگی: گروه B و گروه D در حوالی زمان زایمان

موارد مصرف: درد متوسط و شدید و قبل از عمل و کمک بیهوشی

میزان مصرف: ۲۵ تا ۱۰۰ میلی گرم عضلانی؛ زیر جلدی یا آهسته وریدی هر ۴ ساعت

موارد منع مصرف: در آسم، حساسیت شدید دارویی، تشنج، افراد پیر و نارسایی کبد و کلیه

عوارض جانبی: خواب آلودگی، یبوست، تشنج، خشکی دهان؛ آسیستول؛ دپرسیون تنفسی؛ تشنج؛ دیس

ریتمی قلبی و هیپوتانسیون شدید

توجهات: تزریق زیر جلدی به علت درد توصیه نمی شود.

*علائم حیاتی بیمار را کنترل کنید.

*برای تزریق وریدی سرم در نرمال سالین یا سرم دکستروز رقیق کنید.

آموزش: *به علت خواب آلودگی کار دقیق و رانندگی ممنوع است.

*به منظور جلوگیری از بروز آتلکتازی بیمار را تشویق به سرفه، تنفس عمیق و چرخش در تخت نمائید.

*برای جلوگیری از هیپوتانسیون وضعیتی از تغییر وضعیت ناگهانی پرهیز نمائید.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.



پروپرانولول

نام تجاری: Inderal

گروه دارویی: مهار کننده گیرنده بتا_۱

گروه درمانی: ضد فشار خون ، ضد میگرن

شکل دارویی: قرص ، آمپول

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: فشار خون ، بی نظمی ریتم قلبی، درمان درد قلبی ، پیشگیری سردرد عروقی

میزان مصرف: در فشار خون ۴۰ میلی گرم ۲ بار در روز و در آریتمی ۰,۲ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم

موارد منع مصرف: در مورد شوک قلبی ، نارسایی احتقانی قلبی، آسم ریوی ممنوع است.

عوارض جانبی: خستگی ، کاهش فشار خون ، درد قفسه سینه ، وزوز گوش ، اشکال در صحبت کردن، تهوع

، اسهال، شب ادراری ، کاهش میل جنسی ، عفونت مجاری ادراری ، درد کلیوی ، درد مفاصل و کمر درد و

ضایعات پوستی

توجهات: فشار خون و نوار قلب بیمار باید کنترل شود. *دارو به همراه غذا تجویز شود.

آموزش: *مصرف دارو نباید به طور ناگهانی قطع شود.

*این دارو در سالمندان با احتیاط مصرف شود.

*در موارد اضطراب و تپش قلب هم کاربرد دارد.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.



پروتامین سولفات Protamine Sulfate

گروه دارویی: آنتی‌دوت

گروه درمانی: آنتاگونیست هیپارین

مصرف در حاملگی: گروه C

شکل دارویی: 10mg/ml **Injection:** 1000 UAH/ml (5ml)

موارد مصرف: در مصرف بیش از حد هیپارین به شکل زیر استفاده می‌شود:

بالغین و کودکان: دوزاژ براساس بررسیهای انعقادی خون وریدی تعیین می‌شود. 1mg پروتامین برای خنثی کردن 90U هیپارین بدست آمده از نسج ریه یا 115U هیپارین بدست آمده از مخاط روده، از راه وریدی تزریق می‌شود. تزریق باید به صورت آهسته و در خلال یک تا ۳ دقیقه انجام شود. حداکثر دوزاژ، 50mg در هر دوره ۱۰ دقیقه‌ای است.

مکانیسم اثر: این دارو وقتی در حضور هیپارین تجویز شود. با هیپارین ترکیب شده و یک کمپلکس پایدار تشکیل می‌دهد و مانع اثرات هیپارین می‌شود.

موارد منع مصرف: حساسیت به ماهی؛ بیماریهای قلبی و عروقی؛ کودکان

عوارض جانبی: افت ناگهانی فشارخون، برادیکاردی؛ برافروختگی گذرا، احساس گرمی، تنگی نفس، خونریزی، حساسیت مفرط.

تجویز:

از آنجایی که پروتامین نیمه عمر طولانی‌تر از هیپارین داشته و همچنین خود نیز دارای اثرات ضدانعقادی است، دوزاژ دارو را بدقت تعیین نمائید.



دارو را می توان در محلول نرمال سالین یا دکستروز **5%** رقیق نمود.

توجهات :

* پروتامین را نباید در موارد خونریزی جزئی بدنبال درمان با هپارین تجویز کرد، زیرا این موارد بدنبال قطع هپارین ظرف چند ساعت برطرف خواهند شد.

* فشارخون و نبض بیمار را هر دقیقه یکبار حداقل تا **۳** ساعت بعداز تجویز هر دوز دارو کنترل کنید.

* تست های انعقادی را می توان **۱۵-۵** دقیقه بعداز تجویز پروتامین سولفات اندازه گیری کرد.

* هر یک ساعت که از تجویز هپارین بگذرد؛ دوز محاسبه شده پروتامین سولفات نصف می گردد.

* حساسیت به ماهی را سوال کنید در صورت وجود حساسیت دارو باید با احتیاط مصرف شود .

آموزش بیمار / خانواده :

به بیمار توصیه کنید تا برطرف شدن خطر خونریزی از فعالیتهایی که منجر به خونریزی می گردد پرهیز نماید.

مصرف در دوران شیردهی:

عوارضی برای آن در انسان ثابت نشده، با این وجود منافع دارو باید در برابر ضررهای احتمالی آن سنجیده شود.

شرایط نگهداری: پروتامین سولفات را باید در درجه حرارت **15-30C** نگهداری نمود. از یخ زدن دارو جلوگیری نمائید.



پرومتازین

نام تجاری: Phenergan

گروه دارویی: فنوتیازین ها

گروه درمانی: آرام بخش ، ضد حساسیت ؛ ضد سرگیجه

شکل دارویی: قرص و شربت و آمپول

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: حساسیت و خارش پوستی ، بی خوابی ، تهوع ، استفراغ

میزان مصرف: در بالغین یک قرص و کودکان یک قاشق شربت ۱،۰ میلی گرم هر ۶ ساعت

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی ، صرع ، حملات حاد فشار خون

عوارض جانبی: عوارض خونی ، زردی ، تشنج ، کوما ، سرگیجه ، بی قراری و بی اشتهاپی ،

یبوست ، خشکی دهان ، مشکلات تنفسی ، استفراغ

توجهات: داروی خوراکی با غذا یا شیر یا آب میوه استفاده شود.

*وضعیت تنفسی بیمار باید کنترل شود.

*مرگ ناگهانی در نوزادان و شیر خواران گزارش شده است.

آموزش: به علت خواب آلودگی از رانندگی اجتناب شود.

*بدون تجویز پزشک مصرف نشود.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.



پلی اتیلن گلیکول

نام تجاری: پیدرولاکس

گروه دارویی: پلی اتیلن گلیکول

گروه درمانی: ملین اسموتیک

شکل دارویی: پودر برای مصرف خوراکی

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: ملین برای یبوست حاد و مزمن - تخلیه و پاکسازی دستگاه گوارش قبل از کولونوسکوپی، انجام اعمال رادیولوژی و جراحی های دستگاه گوارش

موارد منع مصرف: در موارد حساسیت به دارو، انسداد دستگاه گوارش، کولیت اولسراتیو، کرون و نارسایی قلبی منع مصرف دارد.

عوارض جانبی: ناراحتی های موضعی دستگاه گوارش مانند نفخ، دردهای شکمی و تهوع

توجهات: * اثر دارو در دوز کم (ملین) ۴۸-۷۲ ساعت بعد و در دوز بالا (تخلیه دستگاه گوارش)

۱-۳ ساعت بعد، آغاز می شود. * بر خلاف ملین های محرک (مانند مشتقات سنا) که مصرف آن ها حداکثر تا یک هفته مجاز است، مصرف مداوم پیدرولاکس تا سه ماه فاقد هرگونه عارضه جانبی است. * پیدرولاکس در بالغین و اطفال بالای ۲ سال کاربرد دارد. * بهتر است به دلیل اختلال در جذب، ۲ ساعت قبل از شروع و بعد از اتمام پیدرولاکس، داروی دیگر خورده نشود.

شرایط نگهداری:

دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید. محلول آماده ی پیدرولاکس را تا ۴۸ ساعت می توانید به صورت دربسته در یخچال نگهداری نمایید



پویدون آیداین

نام تجاری: بتادین

طبقه بندی درمانی: ضد عفونی کننده موضعی

طبقه بندی مصرف در حاملگی: گروه D

اشکال دارویی: دهانشویه ۱٪، بتادین اسکراب ۷/۵٪، محلول موضعی ۱۰٪ در بسته بندی های مختلف، ژل و دوش واژینال ۱۰٪، پماد موضعی ۱۰٪

موارد مصرف: پیشگیری و درمان عفونت های سطحی، به عنوان ضد عفونی کننده موضعی برای سوختگی ها، بریدگی ها و سایر جراحات کوچک و درمان واژینیت

موارد منع مصرف و احتیاط: حساسیت به ید، مصرف به عنوان آنتی سبتیک مهلبلی در حاملگی (گروه D)، در سوختگی های وسیع به ویژه در بیماران دچار اسیدوز متابولیک یا اختلال عملکرد کلیه باید با احتیاط مصرف شود.

عوارض جانبی: اسیدوز متابولیک، اختلال فعالیت کلیه.



تتراسیکلین

نام تجاری: Tetracycln

گروه دارویی: تتراسایکلین

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

شکل دارویی: کپسول ۲۵۰ میلی گرمی، پماد چشمی ۱٪ و پماد جلدی ۳٪

مصرف در دوران حاملگی: گروه D

موارد مصرف: عفونت های عمومی خفیف تا متوسط، بیماری عفونی لگن ، عفونت گونوکوکی ،

بیماری های مقاربتی، سفلیس ، عفونت مجاری ادراری در زنان

میزان مصرف: یک تا ۲ کپسول ۴ بار در روز

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی

عوارض جانبی: تهوع ، استفراغ و اسهال جزء عوارض گوارشی آن می باشد. ناراحتی شدید

گوارشی و زخم مریممکن است بروز کند. اختلالات خونی نیز از عوارض مهم است.

توجهات: ابتدا از کشت و آنتی بیوگرام می بایست مطمئن شوید.

*عوارض گوارشی را با خوردن غذا با دارو کاهش دهید.

آموزش: بیمار نباید در معرض نور قرار بگیرد.

*این دارو نباید تاریخ گذشته باشد زیرا باعث عوارض شدید کلیوی می شود.

*اسهال را جدی بگیرید و به پزشک اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.



ترانگزامیک اسید (ترنسید)

نام تجاری : cyklokapron

گروه دارویی : ضد فیبرینولیز

گروه درمانی : آنتی هموراژیک

مصرف در دوران حاملگی : گروه B

اشکال دارویی : کپسول 500mg و آمپول 50mg

موارد مصرف: خونریزی بعد از جراحی دندان در بیماران مبتلا به هموفیلی (پیشگیری و درمان) - خونریزی بعد از اعمال جراحی - مخروط برداری از بافت گردن رحم - برداشت پروستات یا جراحی رحم - خونریزی ناشی از هیپرفیبرینولیز - خونریزی از بینی - هیپرمنوره - خونریزی درون اتاقک چشم - کهیر غول آسای ارثی

پخش: غلظت دارو در شیر مادر تقریباً یک درصد غلظت سرمی است پیوند پروتئینی این دارو بسیار کم است. ترانگزامیک اسید به آلبومین سرم پیوند نمی یابد.

موارد منع مصرف: وجود لخته فعال داخل عروق (خطر تشکیل ترمبوز شدید و حتی کشنده وجود دارد).

عوارض جانبی: کمی فشار خون (سرگیجه یا منگی، خستگی یا ضعف غیرمعمول) ممکن است از تزریق سریع وریدی باشد - تاری دید یا سایر تغییرات بینایی - اسهال - تهوع - استفراغ - ناراحتی غیرمعمول در قاعدگی (ناشی از لخته شدن خون قاعدگی)



تداخل‌های دارویی: مصرف همزمان با کمپلکس ضد مهار انعقادی یا فاکتور IX کمپلکس

ممکن است خطر بروز عواقب ترومبوتیک را افزایش دهد.

مصرف همزمان با داروهای خوراکی جلوگیری کننده از بارداری حاوی استروژن ممکن است خطر تشکیل ترومبوز را افزایش دهد.

اسید ترانگزامیک متضاد داروهای ترومبولیتیک (مانند استرپتوکیناز، یا اورکیناز) است. اسید ترانگزامیک ممکن است در درمان خونریزی شدید ناشی از داروهای ترومبولیتیک مؤثر باشد

توجهات :

*انجام اقدامات زیر در پیگیری وضعیت بیمار اهمیت دارند:

*معاینات چشمی از جمله آزمونهای صحت بینایی، بینایی رگها، ته چشم و میدان بینایی

*قبل و در حین درمان؛ عملکرد کبدی بیمار را کنترل کنید .



جنتامایسین

نام تجاری: Garamycin

گروه دارویی: آمینو گلیکوزید ها

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

شکل دارویی: تزریقی ۲۰، ۴۰، ۸۰ میلی گرم، پماد و قطره چشمی

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: عفونت های گرم منفی و برخی از گونه های استاف زخم جراحی ، عفونت ادراری ، عفونت ناحیه لگن

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی

عوارض جانبی: عوارض کلیوی که بسیار خطرناک است، مشکلات شنوایی، ضعف عمومی، تشنج

، عوارض پوستی ، خارش ، زخم دهان ، راش ، کهیر

توجهات: در اختلال عملکرد کلیه میزان آن کاهش یابد یا تنظیم شود.

*اسهال و خارش جلدی را جدی بگیرید.

*درمدت ۳۰-۶۰ دقیقه انفوزیون شود تا موجب کاهش احتمال انسدادعصبی - عضلانی شود.

*بیمار باید به اندازه کافی آب یا مایعات مصرف کند تا غلظت زیاد دارو موجب آسیب به مجاری ادراری نشود.

*کلیرانس کراتینین و غلظت سرمی دارو باید به صورت منظم و دوره ای چک شود.

*دارودارای سمیت کلیوی و شنوایی می باشد.

آموزش: دارو ها را طبق دستور پزشک مصرف کنید و عوارض جدی را اطلاع دهید.

*در نوع موضعی جنتامایسین ، بیمار نباید در معرض نور باشد.

نکته: نوع موضعی و چشمی را در عفونت های پوست ، زخم و سوختگی می توان به کار برد.

شرایط نگهداری: در جای خشک و خنک نگهداری شود.



داکسپین

گروه داروئی: TCA

گروه درمانی: ضد افسردگی

شکل دارویی: **10,25mg** tab & cap

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: افسردگی - اضطراب - بی خوابی - سردرد های همراه با افسردگی

موارد منع مصرف: حساسیت مفرط - گلوکوم زاویه بسته - احتباس ادرار

عوارض جانبی: سرگیجه - خواب آلودگی - پارستزی - هیپوتانسیون ارتوستاتیک - کاهش اشتها -

تهوع - راش - واکنش افزایش حساسیت

توجهات:

* BP و نبض را هر ۴ ساعت در دو وضعیت خوابیده و ایستاده کنترل نمائید در صورتی که افت BP بیش از 20mmhg باشد دارو را قطع و به پزشک اطلاع دهید .

* در بیماران مبتلا به بیماریهای قلبی - ریوی علائم حیاتی هر ۴ ساعت کنترل گردد.

* پیش از جراحی ؛ دارو را باید طی چند روز و تدریجی قطع کرد.

* به نشانه های قطع مصرف دارو توجه نمائید : سردرد ؛ تهوع ؛ استفراغ ؛ درد عضلانی ؛ ضعف ؛ . این موارد شایع نیستند مگر آنکه دارو ناگهانی قطع شده باشد .

* دوزاژ دارو را به زمان خواب موکول شود.



داکسی سایکلین

نام تجاری: vibramycin - doxy - doryx

گروه داروئی: تتراسیکلین.

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

اشکال دارویی: Tablet: **100**mg (As Hyclate or Monohydrate

Capsule: **50, 100**mg (monohydrate)

مصرف در دوران حاملگی: گروه D

موارد مصرف: عفونتهای ناشی از ارگانیسیمهای حساس - اسهال مسافرتی - بیماریهای التهابی حاد لگن (PID)

آنتراکس پوستی - درمان کمکی آکنه شدید - ضایعات التهابی (پاپول و پوسچول) - عفونتهای ناشی از کلامیدیا تراکوماتیس، التهاب غیرگونوکوکی پیشابراه، عفونتهای بدون عواقب رکتوم، گردن رحم، پیشابراه

موارد منع مصرف: حساسیت مفرط به دارو - در کودکان کمتر از ۸ سال - در نیمه دوم حاملگی

عوارض جانبی: تغییرات در بینایی شما. اسهال آبکی یا خونی. کبودی یا خونریزی. بی اشتها. تغییر رنگ ناخن. تغییر رنگ دندان. سمیت کلیوی برگشت پذیر

مسمومیت و درمان :

تظاهرات بالینی: اختلالات گوارشی.

درمان: شامل مصرف آنتی اسیدها یا تخلیه معده یا شستشوی معده طی چهار ساعت بعد از بلعیدن دارو می شود.

توجهات: *در ضمن بارداری نیز از این دارو استفاده نشود. چون باعث تأثیرات مخرب روی دندان، رشد عضلانی و استخوانی جنین می شود.

* داکسی سیکلین را می توان در بیماران مبتلا به اختلال عملکرد کلیه مصرف کرد، زیرا این دارو در بدن تجمع نمی یابد و موجب افزایش بارز غلظتهای ازت اوره خون (BUN) نمی شود



*در صورت بروز علائم مسمومیت، حساسیت مفرط یا عفونت ثانویه، بروز اریتم بعد از قرار گرفتن در معرض نور خورشید یا در صورت بروز اسهال شدید که نشان دهنده کولیت سودوممبران باشد، باید مصرف دارو قطع شود.

*کودکان نباید هرگز از داکسی سایکلین استفاده کنند زیرا این دارو می تواند باعث زردی دائم در کودکان کمتر از ۸ سال شود.
*حتی در صورت احساس بهبودی، دارو تا انتها مصرف کنید تا عفونتتان درمان شده، از عود جلوگیری شود .

*روزی ۸ لیوان آب بنوشید، مگر اینکه پزشکتان دستور دیگری داده باشد .
از نور خورشید بین ساعت ۱۰ صبح تا ۳ بعد از ظهر و از لامپ‌های آفتابی و وسایل برنزه کننده اجتناب کنید. مناطق در معرض نور را با کرم‌های ضدآفتاب با قدرت محافظت‌کنندگی (SPF) حداقل ۱۵ پوشانید .

*اگر قرص ضدبارداری مصرف می کنید، درحین استفاده از داکسی سایکلین یک روش جلوگیری دیگر را به تنهایی یا در کنار قرص ضدبارداری بکارگیرید .
*داکسی سایکلین تاریخ مصرف گذشته را دور بریزید. این دارو وقتی فاسد شود سمی می شود.

*شیر، محصولات لبنی، آنتی اسید، مکمل کلسیمی، مکمل آهن یا ملین‌های حاوی منیزیم مصرف کنید.
این مواد غذایی یا داروها را حداقل ۲ ساعت قبل یا ۲ ساعت بعد از مصرف داکسی سایکلین استفاده کنید .



دایمتیکون

نام تجاری : Aeropa, Mylicon

گروه دارویی : مشتق متیل سیلوکسان

گروه درمانی : ضداسپاسم / ضدنفخ

اشکال دارویی : Drops or Solution: 40 mg/ ml -41.2mg/ml

Tablet: 40 mg

مصرف در دوران حاملگی : گروه C

موارد مصرف: نفخ شکم , درمان کمکی در زخم معده , روده تحریک پذیر , کولیک شیرخوارگی ؛ داروی کمکی در سونوگرافی و رادیوگرافی روده

موارد منع مصرف : مورد خاصی وجود ندارد.

عوارض جانبی: عارضه خاصی وجود ندارد.

توجهات : به بیمار پیاموزید که هنگام مصرف قرصها را کاملاً بجود.

*بهتر است دارو بعد از غذا و هنگام خواب مصرف شود

*هرگز دوز دارو را دو برابر نکنید.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود



دایجستیو

نام تجاری: Onoton

گروه دارویی: آنزیم های گوارشی

گروه درمانی: پانکراتین ، سایمیتیکون ، لیپاز

شکل دارویی: قرص

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: بیماری های گوارشی ناشی از کیسه صفرا ، پانکراس، عمل جراحی معده ، درمان

اسهال ناشی از جراحی (برداشتن معده) و درمان نفخ

میزان مصرف: 1 تا 2 قرص همراه با هر وعده غذا

موارد منع مصرف: در حساسیت شدید دارویی یا علائم بروز پانکراتیت حاد منع مصرف دارد.

عوارض جانبی: تهوع ، اسهال و درد شکمی از حمله عوارض است.

توجهات: این دارو با آنتی اسیدها تداخل دارد.

*این دارو آثار ضد نفخ دارد.

آموزش: *ارجح است بیمار پس از مصرف دارو مقداری غذا بخورد .

*قرص نباید جویده شود.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.



دکستروز

گروه درمانی: جانشین مایعات، تأمین کننده کالری

گروه دارویی: محلولهای کریستالوئید جهت جبران کاهش مایعات یا الکترولیتها

طبقه بندی مصرف در حاملگی: گروه C

اشکال دارویی: محلولهای تزریقی ۰.۵٪ و ۱.۰٪، محلولهای تزریقی دکستروز همراه کلرور سدیم، ویالهای ۲۰٪ و ۵۰٪

موارد مصرف: سرم قندی ۰.۵٪: ایزوتونیک بوده، فاقد الکترولیت در بسته های ۵۰۰ و ۱۰۰۰ CC وجود دارد. موارد استفاده: ورزشهای طولانی مدت که گلوکزپلاسما کاهش می یابد. - درمان back pain - تامین انرژی به دنبال فقر غذایی - جراحی ها - درمان دهیدراتاسیون هیپرتونیک _ NPO

سرم قندی 10%: فاقد الکترولیت و خاصیت دیورتیک

موارد استفاده: تامین انرژی - درمان هیپوگلیسمی - بیماران نارسایی کلیوی - مسمومیت با پتاسیم همراه با انسولین - بیمار با تب - ادم ریوی - جانشینی مایع

سرم قندی ۲۰٪ و بالاتر:

کاملاً هیپرتونیک در بیماران آنوری ممنوع است.

موارد استعمال: در شوک هیپوگلیسمی، در مسمومیت با آب، ادم ژنرالیز دارند؛ جهت تأمین کالری در حداقل حجم آب و محلول؛

محلول ۱.۰٪ و ۲.۰٪ و ۵.۰٪ به صورت همراه با سایر مایعات جهت انفوزیون وریدی مرکزی

موارد منع مصرف: هذیان، بیماران دهیدراته، اغمای دیابتی، خونریزی داخل جمجمه ای یا داخل ستون مهره ای، در دیابت ملیتوس با احتیاط مصرف شود. استفاده در اختلالات آب و الکترولیت به تنهایی ممنوع می باشد

عوارض جانبی: سندروم هیپراسمولار، افزایش فشار خون و نارسایی احتقانی قلب-ادم ریوی، دیوز اسموتیک، گلیکوزوری؛ ترومبوز، التهاب موضعی ورید های محیطی از عوارض شایع تزریق محلول های قندی هیپرتونیک می باشد.

از نکاتی که باید به آن توجه شود تاریخ مصرف و باقی مانده محلول مصرف نشود.

تزریق زیر جلدی ممنوع چون دردناک است. قبل از تزریق فشار خون کنترل شود.

این محلول ها در افراد دیابتی به همراه انسولین باید مصرف شود.



دگزامتازون

گروه دارویی: آدرنوکورتیکوئید

گروه درمانی: ضد التهاب، مهار ایمنی

شکل دارویی: آمپول ۸mg، قرص ۵mg و قطره چشمی

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: التهاب دهان، داروی مخصوص تست تشخیص بیماری‌های غده فوق کلیه، ورم

مغزی، استفراغ، التهاب مفاصل، درمان کمکی در مننژیت باکتریال، ورم مجاری هوایی

میزان مصرف: در التهاب مغزی یک تا ۲ آمپول هر ۶ تا ۱۲ ساعت - در مننژیت ۰/۶ میلی گرم به

ازای هر کیلوگرم هر ۶ ساعت در روز اول تا چهارم درمان یا ۱۰ میلی گرم تزریق وریدی و سپس

هر ۴ میلی گرم هر ۶ ساعت

موارد منع مصرف: مشابه دیگر کورتون‌ها

عوارض جانبی: زخم دستگاه گوارش، بیخوابی، احساس انرژی و سرخوشی، تشنج

توجهات: قطع داروی استروئیدی باید به تدریج و طی یک هفته صورت گیرد.

آموزش: قرص خوراکی را باید همراه غذا یا شیر استفاده کرد.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.



دوبوتامین

نام تجاری: Dobutrex

گروه دارویی: آدرنرژیک ها

گروه درمانی: محرک قلب

شکل دارویی: تزریقی (انفوزیون وریدی)

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: درمان نارسایی حاد قلبی و در شوک قلبی یا عفونی یا جراحی قلب و افزایش مدت ضربان قلب

میزان مصرف: ۲ تا ۵ میکروگرم به ازای هر کیلوگرم در دقیقه (انفوزیون وریدی) تا به ۱۰ تا ۱۵ میکروگرم به ازای هر کیلوگرم برسد.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی و بیماری تنگی هیپرتروفیک تحت آئورتی (IHSS)

عوارض جانبی: حملات آسم ، کاهش فشار خون ، حساسیت شدید، تهوع ، سردرد ، تپش قلب ، تنگی نفس

توجهات: مایعات کافی باید برای بیمار تامین شود.

*نوار قلب و فشار خون بیمار کنترل شود.

آموزش: در صورت تشدید علائم به پزشک اطلاع داده شود.

*ممکن است در محل تزریق درد ایجاد شود، در این صورت به پرستار اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: محلول تهیه شده در جای خنک (۲ تا ۱۵ درجه) نگهداری شود.



دوپامین

نام تجاری: Dopastat

گروه دارویی: سمپاتومیمیتیک

گروه درمانی: تنگ کننده عروق

شکل دارویی: تزریقی

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: محرک قلبی است و در درمان کاهش یا افت فشار خون و شوک قلبی و نارسایی قلبی و نارسایی کلیه مفید است.

میزان مصرف: ۴۰۰ تا ۸۰۰ میلی گرم دوپامین در ۲۵۰ سی سی محلول و با غلظت ۱۶۰۰ تا ۳۲۰۰ میکروگرم در هر میلی لیتر انفوزیون شروع شود.

موارد منع مصرف: در بیماری هایفئوکروموسیتوما یا آریتمی فیبریلاسیون بطنی یا تاکی آریتمی ممنوعیت مصرف دارد.

عوارض جانبی: تهوع ، استفراغ ، درد قفسه سینه ، تشدید حمله آسمی

توجهات: از مخلوط کردن دوپامین با محلول سرم بی کربنات سدیم یا فنی توئین سدیم خودداری شود.

* کنترل علائم حیاتی و مونیتورینگ نوار قلبی ضروری است.

* برای تزریق از ورید های بزرگ استفاده کنید.

آموزش: در محل تزریق ممکن است درد ایجاد شود و در صورت بروز این عارضه به پرستار اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.



دiazپام

نام تجاری: Valium

گروه دارویی: بنزودیازپین ها

گروه درمانی: آرام بخش ، ضد اضطراب

شکل دارویی: قرص، آمپول و شیاف

مصرف در دوران حاملگی: گروه D

موارد مصرف: درمان اضطراب ، تشنج ، ضد لرزش ، ضد حملات ترس (پانیک) در اسپاسم عضلانی (به عنوان شل کننده عضلات ، اسپاسم در بیماران مبتلا به کزاز)

میزان مصرف: به نوع بیماری بستگی دارد (۲ تا ۲۰ میلی گرم) Diazپام (IV - IM -)

موارد منع مصرف: حساسیت شدید ، کسانی که در مسمومیت شدید با الکل در کما هستند. آب سیاه چشم (گلوکوم زاویه بسته)

عوارض جانبی: خواب آلودگی شدید ، گیجی خشکی دهان ، یبوست ، زردی ، درد عضلانی ، تنگی نفس ، کم خونی ، اختلالات سلول های خونی و کاهش فشار خون

توجهات: خواب آلودگی شدید از جمله علائم مسمومیت است.

*قطع دارو به طور ناگهانی خطر ناک است.

آموزش: *در تجویز وریدی احتمال کاهش فشار خون و وقفه تنفسی می رود.

*می بایست بیمار از مصرف داروهای آرام بخش دیگر به طور همزمان پرهیز نماید.

*پس از مصرف دارو از انجام کار های نیاز مند دقت و رانندگی خودداری شود.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.



دیفن هیدر آمین

نام تجاری: Diphen

گروه دارویی: آنتاگونیست گیرنده H₁ از مشتقات اتانول آمین

گروه درمانی: آرامبخش - خواب آور ، ضد دیسکنزی (آنتی کولینرژیک)

شکل دارویی: آمپول - قرص - الگزیر

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: رینیت آلرژیک؛ واکنش‌های آلرژیک نسبت به خون یا پلاسما (آنتی هیستامین)؛ بی‌خوابی

؛سرفه ؛ بیماری حرکت (sickness motion) یا سرگیجه

موارد منع مصرف: حساسیت مفرط به این دارو و سایر آنتی هیستامین‌ها با ساختمان شیمیایی مشابه ،

حمله حاد آسم ، مصرف همزمان با مهارکننده‌های منوآمین اکسیداز.

عوارض جانبی: خواب‌آلودگی؛ هیپوتانسیون، طپش قلب، تاکیکاردی، کهیر؛ خشکی بینی و حلق تهوع،

استفراغ، اسهال، یبوست

توجهات: * به بیمار توصیه کنید دارو را مطابق دستور مصرف نموده و از زیاد نمودن دوز تجویز شده پرهیز نماید.

* به بیمار تذکر دهید در طی درمان از مصرف داروهای تضعف سیستم اعصاب مرکزی پرهیز نماید.

* بیماران مسن نسبت به اثرات آرامبخش دارو و هیپوتانسیون ناشی از آن حساس تر هستند.

* در صورت تجویز وریدی دارو در افرادی که مشکلات فشارخون دارند، لازم است بیمار را بدقت تحت کنترل قرار داد.

* بهتر است دارو را همراه با غذا و یا شیر تجویز نمائید

شرایط نگهداری: محلول تزریقی و الگزیر دارو را باید در ظروف مقاوم به نور نگهداری نمود.

دارو را باید در درجه حرارت C ° ۱۵-۳۰ نگهداری نمود.



دیکلوفناک سدیم

نام تجاری: Voltaren

گروه دارویی: اسید فنیل استیک

گروه درمانی: ضد درد ، ضد التهاب

شکل دارویی: قرص ، شیاف ، آمپول ؛ژل پوستی و قطره چشمی

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: آرتروز (استئوآرتروز) ، رماتیسم مفصلی، التهاب بورس و تاندون ها ، درد کلیوی

میزان مصرف: یک تا ۲ قرص یا یک شیاف یک تا ۴ بار در روز

موارد منع مصرف: حساسیت به دارو ، زخم معده فعال ، بیماری پورفیری

عوارض جانبی: تشنج ، فشار خون بالا و افزایش قند خون ، خونریزی از دستگاه گوارش ، کهیر و

عوارض پوستی ، تنگی نفس

توجهات: برای کاهش تحریک معده قرص را با یک لیوان آب مصرف کنید.

*برای جذب بهتر دارو آن را تا ۱ ساعت قبل یا بعد از غذا مصرف کنید.

*از مصرف همزمان داروهای ضد درد دیگر مثل آسپیرین خودداری کنید.

آموزش: *از رانندگی به علت خواب آلودگی ناشی از مصرف دارو پرهیز شود.

*مصرف به شکل تزریقی با فلج عصب سیاتیک همراه است و به جزء در موارد ضروری و در بیمارستان

شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.



دیگوکسین

نام تجاری: Lanoxine

گروه دارویی: گلیکوزیدها

گروه درمانی: ضد آریتمی قلبی، نارسایی قلبی

شکل دارویی: قرص، آمپول، قطره، شربت

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: نارسایی قلبی، بی نظمی های ریتم قلبی (نوع سوپراونتریکولار)

میزان مصرف: در نوزادان تا بالغین میزان مصرف متفاوت است. و برای شروع درمان باید میزان خاصی را تجویز کرد که به آن دیزیتالیزاسیون بیمار گفته می شود.

موارد منع مصرف: در صورت ابتلای بیمار به آریتمی قلبی و مسمومیت با گلیکوزید قلبی منع مصرف دارد.

عوارض جانبی: عوارض گوارشی، تغییر بینایی، ترس از نور و هذیان جزء عوارض شدید دارویی است.

توجهات: * غذا هیچ اثری بر میزان جذب دارو ندارد.

* در صورت کاهش تعداد ضربان قلب (برادیکاری) تزریق را متوقف کنید.

* اغلب برای پیش گیری از مسمومیت دارویی ۱ تا ۲ روز در هفته مصرف دارو حذف می شود. (مثلا دو شنبه و جمعه)

آموزش: به دستور پزشک توجه کافی شود.

* بیمار از سبزی کافی و سیب زمینی استفاده کند.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.



رانیتیدین

نام تجاری: Zantac

گروه دارویی: مهار کننده گیرنده H_2

گروه درمانی: ضد زخم معده ؛ ضد ترشح اسید

شکل دارویی: قرص، آمپول و شربت

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: زخم های معده و دوازدهه ، برگشت مواد اسید معده به مری، زخم مری

میزان مصرف: میزان مصرف آن ۲ قرص روزانه می باشد و فرم تزریقی با توجه به دستور پزشک

مصرف می شود.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی

عوارض جانبی: سردرد ، سر گیجه ، اسهال ، درد عضلانی ، مشکلات خونی

توجهات: *بهبتر است ۲ ساعت قبل از غذا مصرف شود.

*میزان تجویز در نارسایی کلیه کاهش یابد.

*تجویز B12 در درمان دراز مدت ضروری است .

*تست های کبدی ضروری است.

آموزش: دارو منظم استفاده شود.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.



روغن بادام

روغن بادام را از انواع دانه ی بادام تهیه می کنند. این روغن همان اولئات گلیسرید است که بوی ملایمی داشته و مزه آجیل می دهد. این روغن در الکل نامحلول است، اما در کلروفرم یا اتر کاملاً حل می شود. این روغن، جانشین خوبی برای روغن زیتون می باشد. بادام، ۳۵ درصد ویتامین E دارد و میزان چربی های اشباع نشده ی آن بسیار بالاست. این نوع چربی قادر است که میزان کلسترول LDL را کاهش دهد. روغن بادام سرشار از ویتامین D و کلسیم و منیزیم است. دو نوع روغن بادام وجود دارد - شیرین و تلخ . روغن بادام شیرین دارای خواص پزشکی و همچنین منافع زیبایی است

==روغن بادام تلخ==

*برای درمان ریزش مو و مو خوره از روغن بادام تلخ استفاده میشود.از آن جا که بادام تلخ دارای اسید سیانیدریک است باید در مصرف آن احتیاط کرد.

*روغن بادام تلخ سرفه را بهبود بخشیده و ضدسرماخوردگی است اما در مصرف آن باید دقت کرد.

*روغن بادام تلخ برای تنگی نفس، سرفه و ورم ریه مفید است.

*بادام تلخ، سنگ کلیه و قولنج را برطرف می کند. روغن بادام خاصیت مسهلی دارد.

*روغن بادام، خشکی و چین و چروک پوست را برطرف می کند.

==روغن بادام شیرین و محصولات آرایشی و زیبایی==

عصاره ی مغز بادام نقش بسیار موثری در تغذیه و آبرسانی پوست ایفا می کند. روغن بادام شیرین به عنوان خوشبوکننده محصولات آرایشی و خوشبوکننده های هوا استفاده می شود. متخصصان توصیه می کنند مادر برای برقراری ارتباط اولیه با نوزاد به بدن او روغن بادام شیرین مالیده و بدنش را به آرامی ماساژ دهد این ماده در آرامش بخشیدن به کودک اهمیت دارد. روغن بادام منبع مهم و شناخته شده ای در به وجود آمدن آلرژی ها به خصوص در زنان باردار و مادران شیرده است. زنان باردار بر این باورند که با مصرف روغن بادام شیرین می توانند چروک ها و ترکیدگی های ناشی از بارداری را از بین ببرند باید گفت خطوط بعد از زایمان بر بدن ناشی از یک کشیدگی سریع و خشن پوست است که بر قابلیت الاستیک فیبرهای کلاژن پوست اثر می گذارد. روغن بادام به ظاهر پوست را نرم می کند اما نمی تواند روی فیبرهای کلاژن که در ساختار عمیق پوست قرار دارد اثر بگذارد. اما استفاده از آن برای زنان باردار و پوست حساس کودکان سفارش نمی شود چرا که این ماده اثر مستقیمی بر پوست نوزاد داشته و آلرژی را در او بالا می برد.



روغن کرچک

روغن کرچک از فشردن دانه‌های بدون پوسته گیاه *Ricinus Communis* در سرما به دست می‌آید که پس از تصفیه، بی‌رنگ کردن و عبور بخار آب تبدیل به روغن کرچک دارویی می‌شود.

اشکال دارویی: روغن - کپسول

موارد مصرف: روغن کرچک عمدتاً به‌عنوان مسهل به ویژه در تخلیه روده قبل از معاینه کولون یا عکس‌برداری از حفره شکمی یا سونوگرافی و به‌عنوان ملین در درمان یبوست حاد نیز کاربرد دارد.

موارد منع مصرف: روغن کرچک در بیماری‌های التهابی حاد روده، انسداد روده، آپاندیسیت و دردهای شکمی با منشاء ناشناخته منع مصرف دارد و مصرف آن در دوران بارداری، شیردهی و در اطفال زیر ۱۲ سال نیز توصیه نمی‌شود.

عوارض جانبی: مصرف کپسول روغن کرچک در دوزهای توصیه شده توسط پزشک و در کوتاه مدت عوارض جانبی ندارد. مهم‌ترین عارضه مصرف طولانی مدت این دارو مختل شدن حرکات طبیعی روده و ایجاد حالت وابستگی به ملین برای اجابت مزاج است.



ZINTOMA زینتوما

اشکال دارویی: کپسول ۳۵۰ میلی گرمی

موارد مصرف: این فرآورده در پیشگیری از بیماری حرکت (motion sickness) و تهوع دوران بارداری خانمها مصرف می شود .

اجزاء فرآورده: زینتوما حاوی ۲۵۰ میلی گرم پودر ریشه زنجبیل *Zingiber officinale* می باشد .

موارد منع مصرف: سنگ صفاوی

عوارض جانبی: آلرژی در افراد حساس به گیاه - رقیق شدن خون - سوزش سر دل افزایش فعالیت ترشحات دستگاه گوارش - افزایش خونریزی - ممانعت از تجمع پلاکت ها



سالبو تامول

نام تجاری: Ventolin

گروه دارویی: تحریک سمپاتیک

گروه درمانی: باز کننده مجاری هوایی ریه

شکل دارویی: قرص ، شربت ، تزریقی ، اسپری ونبولایزر

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: آسم (به ویژه حملات حاد آسم) ، بیماری های انسدادی ریه ، برونشیت ،

پیشگیری از زایمان زودرس

میزان مصرف: اسپری آن هر ۶ ساعت یک پاف ، در آسم مزمن ۴ میلی گرم شربت هر ۶ تا ۸ ساعت میزان

مصرف فرم تزریقی بر اساس نیاز

موارد منع مصرف: در بی نظمی های ریتم قلبی - حساسیت مفرط - هیپرتانسیون - BPH

عوارض جانبی: تهوع ، لرزش دست ، بی قراری ، خشکی دهان ، بی خوابی ، تپش قلب ، افزایش ضربان

قلب ، استفراغ

توجهات: *به بیمار تذکر داده شود که با مصرف این دارو لرزش دست شایع است.

*بی خوابی گاهی مشکل آفرین است.*در صورت عدم اصلاح مشکل تنفسی بیمار به پزشک اطلاع دهید.

*احتمال سرگیجه و منگی را به بیمار تذکر دهید. از تماس دارو با چشم ها اجتناب شود و در صورت لزوم

به هنگام استنشاق آئروسول، چشم ها بسته شود. در صورت تماس اتفاقی با چشم ها ممکن است باعث

تحریک یا تیرگی دید شود. در این صورت چشم ها باید با آب سرد شسته شوند .

*تکان دادن آن قبل از مصرف (آماده سازی پمپ اسپری با ۷ بار تحریک کردن آن)

*ایجاد فاصله یک دقیقه ای بین فواصل استنشاقی دارو.

*روزانه وسایل استنشاقی به کار رفته را با آب داغ شستشو دهید .

شرایط نگهداری: قرص و شربت در دمای معمولی و نوع اسپری آن را دور از نور نگهداری کنید.



سایمتیدین

نام تجاری: tagamet

گروه دارویی: آنتاگونیست گیرنده (H2)

گروه درمانی: ضد زخم و اسید معده

شکل دارویی: قرص ، آمپول ۲۰۰ میلی گرمی

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: زخم معده ، برگشت مواد معده به مری ، التهاب و اختلال در معده

میزان مصرف: ۲ قرص ۲ بار در روز

موارد منع مصرف: حساسیت شدید

عوارض جانبی: سردرد ، اسهال ، سرگیجه ، کاهش میل جنسی ، درد عضلانی ، بلوک قلبی،

ژینکوماستی

توجهات: بهتر است دارو با غذا مصرف شود.

*آزمایش خون (CBC) در حین درمان انجام شود.

آموزش: بهتر است از رانندگی اجتناب شود

*تا زمان بهبودی کامل ، مصرف دارو را ادامه دهید.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.



سدیم بیکربنات

نام تجاری : سودوبیکا

گروه دارویی : قلیا

گروه درمانی : قلیائی کننده ادراری و سیستمیک

مصرف در دوران حاملگی : گروه C

اشکال دارویی : ویال ۷/۵٪

موارد مصرف : قلیائی کردن ادرار ؛ CPR ؛ اسیدوز متابولیک شدید اسیدوز متابولیک غیر اورژانس

موارد منع مصرف: افزایش فشارخون، زخم پپتیک، بیماری کلیوی؛ هیپوکلسمی

عوارض جانبی: تشکیل سنگ؛ ترمور؛ نفخ ؛ تشنج ناشی از آلکالوز؛ احتباس آب ؛

توجهات: * در نارسائی احتقانی قلب، سیروز، مسمومیت خونی، بیماری کلیوی با احتیاط مصرف شود.

* نشت خارج عروقی را در تجویز وریدی دارو بررسی کنید (بافت مرده، زخم شدن و نکروز بافت)

* توزین روزانه با شروع درمان.

* در طی درمان، الکترولیت‌ها، PH خون، PO₂ و بی‌کربنات را بررسی کنید.

* تعداد تنفس و تعداد ضربان قلب، ریتم و عمق تنفس را بررسی کنید و در صورت غیرطبیعی بودن، پزشک را آگاه کنید .

* با شیر نباید مصرف شود زیرا احتمال بروز سندرم شیر قلیا وجود دارد .

شرایط نگهداری : دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری گردد. از یخ زدگی محافظت گردد.



سدیم کلراید

گروه داروئی: کلرید سدیم

گروه درمانی: شستشو دهنده و جانشین سدیم و کلر

اشکال داروئی: sol for Irrigation = 0/9% inf=0/45% (500ml – 1000ml)

nasal drops = 0/65%

inf = 0/9% (500ml – 100ml – 5ml)

inf = 5% (50ml – 500ml)

نوع شستشو:

موارد مصرف:

این محلول استریل و آپیروژن است که برای شستشوی حفرات بدن، بافت یا زخم، لوله-های درناژ در جراحی هم‌چنین برای شستن وسایل و نمونه‌های آزمایشگاهی و به طور کلی در مواردی که شستشو با محلول استریل و آپیروژن حاوی الکترولیت مجاز باشد مصرف می‌شود. هم‌چنین برای رقیق کردن یا به عنوان حامل داروهایی که برای شستشو به کار می‌رود نیز استفاده می‌شود و شستشوی بینی جهت حفظ رطوبت و رفع احتقان بینی

موارد منع مصرف:

- ۱- در جراحی‌هایی که مستلزم به کاربردن جریان الکتریکی هستند نباید استفاده شود.
- ۲- نباید به بیمار تزریق شود.

**نوع تزریقی: (جانشین سدیم و کلر)**

محلول ایزوتونیک (محلول ۰/۹٪) به عنوان جانشین شونده در حالاتی که با از دست رفتن کلرور سدیم یا آب بدن همراه است مصرف می‌شود. محلول هیپرتونیک (۰/۵٪) در کمی سدیم خون و کمی کلرو خون به علت از دست رفتن الکترولیت‌ها، رقیق شدن شدید مایعات بدن به علت مصرف بیش از حد آب و همچنین در درمان فوری تخلیه شدید نمک بدن به کار می‌رود. نوزادان ناخوشی که CPR شده اند اغلب نیاز به حجم افزائی با محلول های ایزوتونیک دارند که محلول انتخابی کلرور سدیم ۰/۹٪ (نرمال سالین) است

مقدار مصرف:

در نوزادان ۱۰ ml/kg که در عرض ۲۰ الی ۱۰ دقیقه انفوزیون می شود.

موارد منع مصرف:

محلول ۰/۵٪ در صورت افزایش و یا حتی طبیعی بودن غلظت سرمی سدیم و کلر نباید استفاده شود.

نارسائی احتقانی قلب - اختلال کلیوی شدید - سیروز - ادم همراه با احتباس سدیم

عوارض جانبی: تحریک پذیری - سردرد - سرگیجه - ادم - هیپرتانسیون - هیپرناترمی

توجهات: * جهت جلوگیری از بروز ادم ریوی و عوارض موضعی محلول هیپرتونیک را آرام انفوزیون کنید

* در صورت تجویز محلول های فاقد پتاسیم؛ احتمال بروز علائم هیپوکالمی را در نظر داشته باشید

* ست تزریق وریدی را حداقل هر ۴۸ ساعت یکبار تعویض کنید

* طبیعی بودن غلظت سرمی سدیم و کلر نباید استفاده شود.



سرم رینگر و رینگر لاکتات

گروه دارویی: محلولهای کریستالوئید جهت جبران کاهش مایعات یا الکترولیتها

اشکال دارویی: باکسترهای ۵۰۰ml و ۱۰۰۰ml

محلول تزریقی رینگر:

محلول تزریقی رینگر با غلظت ایزوتونیک $NaCl, K, CA$

موارد مصرف: در بیماران گاسترو آنتریت، شوک هیپوولمیک و جلوگیری از هیپوکالمی، جایگزین مایعات از دست رفته در حین عمل جراحی (در صورت نبودن رینگر لاکتات) در تغذیه پارانتال کوتاه مدت به همراه سایر محلول ها.

نکات قابل بررسی: در صورت تغییر رنگ و کدر بودن منع مصرف دارد.

افزودن محلول هیپرتونیک بیکربنات سدیم به داخل رینگر ممنوع است چون باکلسیم در رینگر رسوب کلسیم می دهد.

محلول رینگر لاکتات:

این سرم چند الکترولیتی CA, K, NA, CL ، لاکتات.

(محتویات محلول رینگر لاکتات تشابه بیشتری با محتوی خون دارد یون لاکتات موجود در این فرآورده که به سرعت به یون بی کربنات متابولیزه می شود، در تنظیم تعادل اسید - باز دخالت دارد و اثر آن طی ۱-۲ ساعت کامل می شود.)

موارد مصرف: در بیماران NPO استفاده می شود؛ اختلال تعادل آب و الکترولیت ها؛ قبل و پس از جراحی، اسیدوز، اسهال و سوختگی ها

موارد منع مصرف: نارسایی کبدی، کلیوی، قلبی؛ هپاتیت؛ خیز، اسیدوز متابولیک و آکالوز، در هیپوکالمی (چون لاکتات به بیکربنات تبدیل می شود و بیکربنات باعث انتقال K از خارج به داخل می شود).



سرم قندی نمکی

سرم قندی نمکی : dextrose saline

گروه دارویی : محلولهای کریستالوئید جهت جبران کاهش مایعات یا الکترولیت‌ها

اشکال دارویی : سرم ۵۰۰ یا ۱۰۰۰ سی سی

مصرف در دوران حاملگی : مصرف در بارداری و شیردهی مجاز است

موارد مصرف : دکستروز سالین ۵٪ ایزوتونیک است و از نظر ترکیب شیمیایی مثل قندی ۵٪ و مانند نرمال سالین ۹٪ حاوی کلرید سدیم است تفاوت در حجم آب تزریقی می باشد. تامین آب و الکترولیت های مورد نیاز؛ گاستروآنتریت و مسمومیت ها ؛ انفوزیون این محلول در حین اعمال جراحی بیماران از احتباس سدیم مصون خواهند بود. در اطفال بیشتر کاربرد دارد

مکانیسم اثر : این سرم شامل الکترولیت‌های سدیم، کلر و گلوکز می باشد. این میزان در ترکیبات مختلف متفاوت است مثلاً در سرم یک سوم دو سوم دکستروز ۳ و ۳٪ و سدیم کلراید ۳ و ۰٪ است. این نسبت در سرم قندی نمکی دکستروز ۵٪ و سدیم کلراید ۹ و ۰٪ است.

موارد منع مصرف : در بیمارانی که دچار ادم هستند، در هیپرناترمی، نارسایی کبدی و قلبی و کلیوی، در مورد بیماران کلیوی چیز خاصی دیده نشدو بیماران تحت درمان با کورتون و دیابتی ممنوع است..



سرم ۲/۳ و ۱/۳

گروه دارویی: محلولهای کریستالوئید جهت جبران کاهش مایعات یا الکترولیت‌ها

اشکال دارویی: سرم ۵۰۰ یا ۱۰۰۰ سی سی

مصرف در دوران حاملگی: مصرف در بارداری و شیردهی مجاز است

۱/۳ نرمال سالین و ۲/۳ دکستروز ۵٪ ایزوتونیک است

موارد مصرف: دیابتی، نارسایی کلیوی، کبدی، قلبی، آنفزیون این محلول در حین اعمال جراحی بخصوص اطفال از خطر احتباس NA مصون خواهند بود.



سفازولین

نام تجاری: Kefzol

گروه دارویی: سفالوسپورین نسل اول

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

شکل دارویی: آمپول (ویال)

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: عفونت های تنفسی ، دستگاه ادراری ، پوستی ، مجاری صفراوی ، عفونت خون

(سپتی سمی)، عفونت دریچه قلبی و پیشگیری قبل از عمل

میزان مصرف: ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلی گرم هر ۸ ساعت وریدی یا ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلی گرم هر ۶ تا ۸

ساعت عضلانی

موارد منع مصرف: حساسیت شدید به گروه پنی سیلین ها

عوارض جانبی: واکنش حساسیت ، عوارض کلیوی ، عوارض خونی ، توهم ، تشنج

توجهات: * بیمار بعد از مصرف سفالوسپورین مستعد خونریزی می شود.

* تزریق وریدی سریع دارو علاوه بر آسیب به جدار رگ باعث تهوع و استفراغ شدید می شود .

* کنترل کردن سطح BUN – Crat بیمار

آموزش: هر گونه خون دماغ شدن را به پزشک اطلاع دهید.

* هر گونه اسهال و علائم عفونت ثانویه را اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.



سفالکسین

نام تجاری: Keflex

گروه دارویی: سفالوسپورین نسل اول

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

شکل دارویی: کپسول و شربت

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: عفونت های تنفسی ، عفونت های گوش میانی ، عفونت های پوستی استخوان و مفاصل و عفونت ادراری – تناسلی

میزان مصرف: روزانه ۱ تا ۴ گرم : هر ۶ ساعت ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلی گرم معمول است.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید به پنی سیلین ها

عوارض جانبی: آلرژی ، کهیر ، اسهال ، خارش

توجهات: در صورت مصرف طولانی مدت عملکرد کلیه و کبد کنترل شود .

*بیمار از نظر واکنش آلرژیک مانند خارش و کهیر بررسی شود.

آموزش: هر گونه علائم نشان دهنده حساسیت را به پزشک اطلاع دهید.

* دارو را در ساعات معین مصرف کنید.



سفتازیدیم

نام تجاری: ceftazid- Fortum

گروه دارویی: سفالوسپورین نسل سوم

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

شکل دارویی: ویال ۰/۵ و یک و دو گرم

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: عفونت ریوی ، عفونت ادراری - پوستی ، عفونت استخوان ، آبسه های داخل شکم ، عفونت پرده مغز (مننژیت)

میزان مصرف: ۰/۵ تا ۱ گرم سفتازیدیم از راه عضلانی

موارد منع مصرف: حساسیت شدید ، افراد مستعد خونریزی ، ولی در افراد با سابقه کم خونی و تشنج یا مشکلات کلیوی با احتیاط مصرف شود.

عوارض جانبی: خارش ، کهیر ، ادم ، عارضه کلیوی، درد محل تزریق

توجهات: در صورت اسهال شدید دارو را قطع کنید.

*دارو باید در زمان خاصی مصرف گردد .

*دورهء درمان کامل باید رعایت شود.

آموزش: هر گونه عفونت در محل جدید را به پزشک اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: در دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه نگهداری شود.



سفتریاکسون

نام تجاری: Rocephin

گروه دارویی: سفالوسپورین نسل سوم

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

شکل دارویی: ویال ۲۵۰ میلی گرمی ، ۵۰۰ میلی گرمی ، و ۱ گرمی

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: عفونت های تنفسی، عفونت پوست و استخوان و کلیه

میزان مصرف: ۱ تا ۲ گرم هر ۱۲ ساعت تا ۴ گرم حداکثر مصرف روزانه است . در مورد عفونت گونوره تزریق

یک بار ۱۲۵ تا ۲۵۰ میلی گرم به همراه مصرف ۷ روز داکسی سیکلین

موارد منع مصرف: حساسیت شدید ، افراد مستعد خونریزی ، ولی در افراد با سابقه کم خونی و تشنج یا مشکلات کلیوی با احتیاط مصرف شود.

عوارض جانبی: آلرژی ، عوارض خونی ، اسهال ، ضایعات کیسه صفرا ، درد محل تزریق

توجهات: * این دارو تمایل به خونریزی را افزایش می دهد. * انفوزیون وریدی در نوزادان حداقل طی ۶۰

دقیقه و در سنین بالاتر حداقل طی ۳۰ دقیقه انجام شود. * تزریق این فرآورده صرفاً در مراکز مجهز به

سیستم احیا انجام گردد . * نباید با محلولهای حاوی کلسیم مانند رینگرقیق شود.

* مصرف همزمان سفتریاکسون با محلولهای حاوی کلسیم حتی به صورت انفوزیون از رگهای متفاوت ممنوع میباشد.

* محلولهای حاوی کلسیم تا ۴۸ ساعت پس از آخرین دوز سفتریاکسون مصرف نشود.

* در نوزادان هیپر بیلی روبینمی به ویژه در نوزادان نارس منع مصرف دارد.

* در صورت نیاز به مصرف همزمان سفتریاکسون با داروهای مانند وانکومايسين؛ سفالوسپورینها؛ پنی سیلین و آمینو گلیکوزیدها باید در دو محل جداگانه (دورگ مجزا) تزریق شوند.

آموزش: هر گونه اسهال یا شل شدن مدفوع را به پزشک اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.



سفیکسیم

نام تجاری: Cephoral

گروه دارویی: سفالوسپورین نسل سوم

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

شکل دارویی: کپسول - سوسپانسیون - قرص

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: سوزاک، عفونت گوش میانی، فارنژیت، عفونت های بخش تحتانی دستگاه تنفس و عفونت های مجاری ادراری

موارد منع مصرف: در صورت وجود سابقه حساسیت به پنی سیلین ها ، سفالوسپورین ها یا پنی سیلامین یا ابتلای به پورفیری این دارو نباید مصرف شود .

عوارض جانبی: درد شکم - کاهش اشتها - تهوع - استفراغ - کهیر - راش - واژینیت - خارش تناسلی - تب دارویی - آنافیلاکسی

توجهات: *در صورت اسهال شدید دارو را قطع کنید.

*دارو باید در زمان خاصی مصرف گردد .

*دارو باید به مدت ۱۴-۱۰ روز ادامه یابد تا از ریشه کن شدن میکروارگانیسم و عدم سوار شدن عفونت ثانویه اطمینان حاصل گردد .

*سوسپانسیون این دارو را قبل از مصرف خوب تکان دهید و تا ۱۴ روز در یخچال قابل نگهداری است



سولفات منیزیم

نام تجاری: Sulmages

گروه دارویی: سولفات منیزیم

گروه درمانی: ضد تشنج (به ویژه در حاملگی)

شکل دارویی: ویال

مصرف در دوران حاملگی: گروه D

موارد مصرف: در مسمومیت حاملگی (کلامپسی و پره اکلامپسی) ، در خانم حامله و کسانی که از راه دهان تغذیه نمی کنند و مجبوریم دارو و مواد ضروری را از راه ورید های محیطی به آنها برسانیم.

میزان مصرف: در کنترل تشنج و پیشگیری آن ۴ گرم محلول ۱۰ یا ۲۰ درصد در عرض ۳ تا ۴ دقیقه در بدن یا در سرم دکستروز طی نیم ساعت انفوزیون وریدی شود.

موارد منع مصرف: در انفارکتوس قلبی و بلوک قلبی منع مصرف دارد.

عوارض جانبی: سردرد ، گرگرفتگی ، کاهش فشار خون ، فلج تنفسی ، تعریق ، تهوع ، خواب آلودگی ، احساس تشنگی

توجهات: علائم حیاتی بیمار حین تزریق کنترل شود.

* سطح سرمی منیزیم بررسی شود. * حتما آمپول کلسیم گلوکونات وریدی را در دسترس و آماده داشته باشید.

* هنگام تزریق وریدی این دارو علائم حیاتی را هر ۱۵ min چک کنید.

* برونده ادراری در هر ۴ ساعت باید حداقل ۱۰۰ cc باشد.

* از بین رفتن رفلکس زانو پاتلا اولین علامت مسمومیت دارویی است.

آموزش: در صورت بروز تهوع و استفراغ ، مشکلات قلبی و تنفسی اطلاع به پزشک ضروری است چون علائم مسمومیت است.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.



سولفاستامید (چشمی)

نام تجاری: AK-Sulf

گروه دارویی: سولفاستامید

گروه درمانی: آنتی بیوتیک چشمی

شکل دارویی: قطره چشمی

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: عفونت چشمی ، کراتیت چشمی

میزان مصرف: ۱ تا ۲ قطره هر ۱ تا ۳ ساعت

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی و عفونت های ویروسی آبله مرغان و تب خال ،

عفونت قارچی چشم

عوارض جانبی: سر درد ، تورم ، حساسیت موضعی چشم ، حساسیت جلدی

توجهات: یک آنتی بیوتیک وسیع الطیف است.

آموزش: طی شیردهی و حاملگی با احتیاط تجویز شود.

شرایط نگهداری: در جای خنک (۱۵ تا ۸ درجه) و دور از نور نگهداری شود.



سیپروفلوکساسین

نام تجاری: Ciproxin

گروه دارویی: فلوروکینولون

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

شکل دارویی: قرص و تزریقی

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: عفونت های ادراری، عفونت ریوی، پوستی و التهابی مجاری ادراری و استخوانی.

موارد منع مصرف: حساسیت به فلوروکینولونها و نالیدیکسیک اسید

عوارض جانبی: عوارض گوارشی مثل سوء هاضمه، تهوع، تشنج، خواب آلودگی، ضایعات پوستی مثل راش،

آسیب کلیوی، کندی بالا رفتن فشار خون، کم خونی

توجهات: در صورت بروز اسهال باید بیمار را از نظر آب و الکترولیت اداره کرد. *مصرف مایعات کافی به

همراه دارو توصیه می شود. *در نارسایی کلیه میزان دارو باید کاهش یابد.

*انفوزیون سایر داروها در حین انفوزیون سیپروفلوکساسین باید قطع شود .

*دارو حساسیت به نور می دهد در طول مصرف دارو از معرض قرارگیری در مقابل نور مستقیم خورشید

پرهیز نموده و یا از ضد آفتاب و لباس پوشیده استفاده شود.

*در صورت بروز هرگونه واکنش روانی - نورولوژیک یا حساسیت مفرط با مصرف اولین مقدار دارو مصرف

آن را باید قطع کرد . *بین مصرف سیپرو و آنتی اسید باید ۴ ساعت فاصله باشد. *افرادی که سابقه تشنج

(صرع) دارند قبل از مصرف دارو با پزشک مشورت کنند.

شرایط نگهداری: در دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه نگهداری شود.



فروس سولفات

نام تجاری: Apo – Ferrous sulfate

گروه دارویی: ترکیب آهن

گروه درمانی: ضد کم خونی

شکل دارویی: قرص ، شربت ، قطره

مصرف در دوران حاملگی: گروه A

موارد مصرف: به عنوان مکمل غذایی، خونساز و کم خونی فقر آهن

میزان مصرف: در درمان کم خونی فقر آهن یک قرص ۲ تا ۴ بار در روز برای پیشگیری یک قرص روزانه استفاده شود.

موارد منع مصرف: هموکروماتوزیس و هموسیدوز ، زخم حاد معده، بیماری کرون

عوارض جانبی: دل درد ، بی اشتهاپی ، اسهال

توجهات: *ویتامین C جذب آهن را افزایش می دهد.

*این دارو در کم خونی طی حاملگی کاربرد وسیع دارد.

آموزش: بهتر است قرص را با آب میوه یا شربت معده میل کنید.

*مصرف همزمان آهن با تخم مرغ ، قهوه ، یا چای جذب آن را کاهش می دهد.

*برای جلوگیری از تغییر رنگ دندان ها ، شربت را با نی مصرف کنید.

*میزان اندک دارو (چند تا قرص) هم میتواند باعث مسمومیت در کودکان شود.

* برای جلوگیری از یبوست با غذا سبزی بیشتری مصرف کنید.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.



فلوکونازول

گروه دارویی: مشتق بیس تری آزول

گروه درمانی: ضد قارچ

شکل دارویی: Table or Caps: 50, 100, 150mg inj=200mg/100ml

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: عفونت مجاری ادرار یا پریتونیت - کاندیدیاز سیستمیک - کاندیدیاز مهبل -

کاندیدیاز حلق دهانی و مری - مننژیت کریپتوکوکی - پیشگیری در بیماران تحت عمل پیوند مغز استخوان - نارسایی کلیه - عفونت کاندیدیایی در بیماران دچار HIV

موارد منع مصرف: حساسیت مفرط به دارو و سایر داروهای هم گروه

عوارض جانبی: سردرد - راش - تهوع - استفراغ - سمیت کبدی - آنافیلاکسی

در صورت بروز هر یک از علائم زیر به پزشک اطلاع دهید: تب؛ لرز؛ قرمزی پوست یا تاول؛ از دست رفتن اشتها؛ مدفوع کمرنگ یا ادرار تیره؛ معده درد؛ خستگی، زردی چشم‌ها یا پوست؛ خونریزی یا کبودی غیرعادی

توجهات: *در بیماران مبتلا به نارسایی کلیه با احتیاط مصرف شود. *در صورت نیاز به درمان طولانی مدت (بیش از ۱۴ روز) با این دارو، وضعیت کار کبد به‌طور بالینی و بیوشیمیایی حتما باید قبل از شروع درمان، دو هفته پس از شروع درمان و پس از آن به‌طور ماهانه پیگیری شود. *فلوکونازول تزریقی با سایر داروهای تزریقی وریدی ناسازگار است. * هنگام مصرف فلوکونازول نباید پیش از اتمام دارو مصرفش را قطع کنید؛ مگر به دستور پزشکتان. *بیمار را از نظر عفونت و پاک شدن CSF و دیگر کشت‌ها از وجود عفونت در طول درمان بررسی نمایید. *در مان عفونت‌های قارچی به زمان طولانی نیازمند است. *مطابق دستورالعمل نوشته شده روی بسته دارو رقیق سازی انجام شود و بسیار آهسته تزریق ادامه یابد. نباید از میکروست پلاستیکی برای انفوزیون استفاده شود. نشت دارو را از کناره‌های کیسه بررسی نمایید. از پمپ انفوزیون استفاده نموده و هر ۲ ساعت محل تزریق را از لحاظ نشت و نکروز بررسی کنید.



فلوماز نیل

نام تجاری: Anexate

گروه دارویی: آنتاگونیست بنزودیازپین.

گروه درمانی: آنتی دوت

مصرف در دوران بارداری: گروه C

شکل دارویی: Injection: 0.1 mg/ml, (5ml)

موارد مصرف: درمان مسمومیت با بنزودیازپین ها ؛ آنسفالوپاتی کبدی و رفع اثر بنزودیازپینها پس از پایان بیهوشی

موارد منع مصرف: حساسیت مفرط به فلوماز نیل یا بنزودیازپینها؛ وجود علائم مصرف بیش از حد ضدافسردگیهای سه حلقه‌ای

عوارض جانبی: تهوع ، استفراغ ، سردرد ، سرگیجه ، تشنج ، بی نظمی ریتم قلب ، لرزش دست و پا ، خواب آلودگی

توجهات: *بیمار می بایست از نظر عملکرد کبدی بررسی شود.

* محل تزریق ممکن است درد ناک باشد.

*بعد از دریافت دارو ، از رانندگی اجتناب کنید

*در زمان مصرف ممکن است تشنج رخ دهد، امکانات لازم را آماده نمایید مخصوصا بیماران که تحت درمان با آرام بخش ها بوده و به طور ناگهانی قطع کرده اند .

*واکنش های آلرژیک رامد نظر داشته باشید : گر گرفتگی ؛ راش ؛ کهیر و خارش .

*بررسی بیمار از نظر افزایش ICP ویا تروما به سر لازم است .

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.



فنوباربتال

نام تجاری: luminal

گروه دارویی: باربیتورات ها

گروه درمانی: ضد تشنج

شکل دارویی: قرص و آمپول

مصرف در دوران حاملگی: گروه D

موارد مصرف: درمان تشنج (صرع)، تشنج نوزادی یا تشنج به دنبال ضربه، تشنج زمان حاملگی

و به عنوان بی حس کننده موضعی

میزان مصرف: در کنترل تشنج ۱۵ تا ۲۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم طی ۱۰ تا ۳۰ دقیقه

انفوزیون شود.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، نارسایی کلیه و کبد، پورفیری

عوارض جانبی: اختلال هوشیاری، خواب آلودگی، اختلال خونی، ضایعات حساسیتی موضعی،

سردرد، بی قراری، اضطراب

توجهات:

* کاهش فشار خون و اختلال تنفس و افزایش ضربان قلب جزء علامت مسمومیت است.

* قرص نباید جویده شود.

آموزش: نوع تزریقی برای افرادی استفاده می شود که قادر به استفاده خوراکی نیستند.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.



فنی توئین

نام تجاری: Dilantin

گروه دارویی: هیدانتوئین ها

گروه درمانی: ضد تشنج- ضد صرع

شکل دارویی: شربت ، کپسول، آمپول

مصرف در دوران حاملگی: گروه D

موارد مصرف: تشنج ، بی نظمی های ریتم قلبی (آریتمی) ، تشنج در حاملگی ، سکسکه مقاوم

نکته: کامپاند آن ترکیب فنی توئین و فنوباربیتال می باشد. نوع کرم موضعی آن در زخم بستر ، خراش پوستی و آبسه های بزرگ مفید است.

میزان مصرف: در انواع صرع متفاوت است.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، اختلال قلبی (بلوک قلبی)، نارسایی کبدی

عوارض جانبی: تزریق عضلانی آن به علت درد و آسیب محل تزریق توصیه نمی شود. مهار توانایی مغز و کاهش فشار خون ، سردرد ، کاهش اشتها

توجهات: *بدون تجویز پزشک نباید مصرف شود.

*جا به جایی دارو های ضد تشنج باید طبق دستور پزشک انجام شود.

*در انفوزیون وریدی فقط میتوان با سرم نرمال سالین رقیق و انفوزیون نمود (مابقی سرمها رسوب تشکیل می شود).

آموزش: شربت را قبل از مصرف به خوبی تکان دهید.

*این دارو باعث خواب آلودگی می شود.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی و دور از نور نگهداری شود.



فورسماید

نام تجاری: Lasix

گروه دارویی: دیورتیک

گروه درمانی: ضد فشار خون

شکل دارویی: قرص ۴۰mg و آمپول ۴۰mg و ۲۰mg

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: کنترل فشار خون، نارسایی مزمن کلیوی، سیروز کبدی، نارسایی احتقانی قلب

میزان مصرف: ۰/۵ تا یک قرص روزانه استفاده شود. در ادم ریوی شدید به صورت وریدی با یک آمپول شروع و اثر آن بررسی می‌شود. در فشار خون بالا حداکثر میزان مصرف ۶۰۰ میلی‌گرم در روز است.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی و افرادی که امکان ادرار کردن ندارند. (آنوری دارند)

عوارض جانبی: سردرد، سرگیجه، تاری دید، دل درد، اسهال، بی‌اشتهایی، اختلال الکترولیت‌ها، زردی، ضایعات پوستی، مشکلات خونی و نارسایی کبد.

توجهات: این دارو ادرارآور سریع‌الاثراست.

*بیمار باید وزن شود. *در صورت تهوع یا استفراغ شدید به پزشک اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: دور از نور و در دمای اتاق نگهداری شود.



کاپتوپریل

گروه دارویی: ضد هیپرتانسیون، داروی کمکی در درمان نارسایی احتقانی قلب.

اشکال دارویی: قرص 25mg و 50mg

مصرف در حاملگی: گروه C

مکانیسم اثر: این دارو با مهار آنزیم آنژیوتانسین فشار خون (از مسیر مربوط به عروق کلیه) را پایین می آورد.

مقدار مصرف: در فشار خون بالغین 25mg – $6/25$ از راه خوراکی سه بار در روز ممکن است تا 50mg سه بار در روز افزایش یابد.

موارد منع مصرف: در حاملگی گروه C است. مصرف بی ضرر در دوران شیردهی و کودکان ثابت نشده است.

عوارض جانبی: سردرد، سرگیجه، بی خوابی، خستگی، افزایش خفیف سرعت ضربان قلب، تهوع، استفراغ، درد شکمی، یبوست، اسهال، خشکی دهان، کم اشتها، هیپرکاپنی، بشورات پوستی، درد مفاصل



کافئین

گروه دارویی: آلکالوئید

گروه درمانی: محرک ملایم سیستم عصبی

شکل دارویی: آمپول و به صورت ترکیب در داروهای دیگر

مصرف در دوران حاملگی: مطالعه نشده.

موارد مصرف: افزایش بیداری، هوشیاری و تسریع کارکرد عضلات و افزایش عملکرد سیستم

تنفسی - به همراه ضد دردها (آسپیرین یا کدئین) مصرف می شود.

نکته: در بیماران با زخم معده باید با احتیاط مصرف شود.

میزان مصرف: در ترکیبات متفاوت است.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید

عوارض جانبی: تهوع سر درد، بی خوابی، تشنج، وزوز گوش، توهم بینایی و باعث افزایش ناراحت

گوارشی می شود.

توجهات: در صورت بروز علائم مسمومیت، شستشوی معده و تخلیه آن مفید است.

آموزش: مصرف بیش از حد آن خطرناک می باشد.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.



کتورولاک

شکل دارویی: قرص 10mg و آمپول 30mg

مصرف در بارداری: جزو گروه C

موارد مصرف:

این دارو از دسته داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی (NSAIDs) مهارکننده سیکل اکسیژناز می باشد که برای درمان کوتاه مدت (نهایتاً ۵ روز) دردهای نسبتاً شدید و حاد که نیاز به مسکن-هایی در سطح داروهای مخدر دارند استفاده می شود. هم چنین اثربخشی این دارو در درمان حملات حاد و شدید میگرن نیز مشاهده شده است.

میزان مصرف:

بیماران با سن کمتر از ۶۵ سال: یک دوز دارو به مقدار 60 mg به صورت عضلانی یا 30 mg به صورت وریدی حداقل در مدت ۱۵ ثانیه تزریق می شود.

بیماران با سن بیشتر از ۶۵ سال: افراد با وزن کمتر از 50 kg و افراد مبتلا به نارسایی کلیوی تک-دوز دارو به مقدار 30 mg به صورت عضلانی یا 15 mg به صورت وریدی در مدت ۱۵ ثانیه تزریق می شود.

موارد منع مصرف:

- ۱- حساسیت به آسپرین یا سایر داروهای NSAIDs که می توانند شامل آسم - آنژیوادم - کهیر و رنیت باشد.
- ۲- بیماری انعقادی
- ۳- بیماری قلبی - عروقی از قبیل نارسایی قلب - بیماریهای ایسکمیک قلب - اختلالات عروقی مغز و اختلال شریانهای محیطی
- ۴- بیماران دارای علائم نارسایی کلیوی - یا کبدی شدید و بیماران مبتلا به فشار خون بالا

عوارض جانبی:

(شدید) خونریزی رکتوم - خونریزی یا زخم های درشت در ناحیه لب - سیاه شدن لبها و ناخن ها - درد قفسه سینه - تشنج - ضعف شدید - کوتاه شدن تنفس - تنفس سریع، نامنظم و صدادار (در صورت بروز این علائم مصرف دارو باید قطع شود)

عوارض خفیف تر شامل: تورم در نقاط مختلف بدن - تب - درد شکم یا معده - تهوع - آبریزش بینی - بی قراری و ...



کلردیازپوکساید

نام تجاری: Librium

گروه دارویی: بنزودیازپین‌های طویل‌الاثر

گروه درمانی: ضد اضطراب - آرام‌بخش - خواب‌آور

شکل دارویی: قرص

مصرف در دوران حاملگی: گروه D

موارد مصرف: اضطراب و بیخوابی - قطع مصرف الکل - اضطراب قبل از جراحی

موارد منع مصرف: حساسیت مفرط ؛ شوک ؛ کوما ؛ گلوکوم ؛ نوزادان

عوارض جانبی: سرگیجه، خواب‌آلودگی، سردرد، تحریک‌پذیری، ضعف و خستگی، یبوست، خشکی دهان، تهوع، استفراغ، بی‌اشتهایی، خارش، کاهش فشارخون، تاری دید و وزوز گوش

توجهات: * پس از مصرف دارو، از رانندگی و کارهایی که نیاز به دقت و هوشیاری دارد، خودداری کنید.

* در صورتی که هنگام مصرف کلردیازپوکساید دچار مشکلات گوارشی می‌شوید، سعی کنید دارو را با غذا یا شیر میل کنید.

* همچنین اگر بیمارتان نمی‌تواند قرص کامل را بلع کند، آن را خرد کنید.

* در صورت خشک شدن دهان متعاقب مصرف دارو، از آب‌نبات، آدامس و یا مزه‌مزه کردن آب استفاده کنید.

* از وضعیت خوابیده به نشسته یا ایستاده و یا از حالت نشسته به ایستاده آرام تغییر وضعیت دهید تا دچار سرگیجه، سیاهی رفتن چشم یا غش نشوید.



کلرفنیر آمین مالئات

گروه دارویی: الکیل آمین

گروه درمانی: ضد حساسیت، ضد تهوع؛ آرام بخش

شکل دارویی: قرص و فرم تزریقی

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: درمان علامتی حساسیت‌ها، کهیر، آنژیوادم، آب ریزش و بیماری‌های التهابی

پوستی

میزان مصرف: ۴ میلی‌گرم هر ۴ تا ۶ ساعت و نوع تزریقی ۱۰ تا ۲۰ میلی‌گرم تزریق شود.

موارد منع مصرف: حساسیت به آنتی‌هیستامین‌ها ولی در آسم با احتیاط مصرف شود.

عوارض جانبی: خواب‌آلودگی، گیجی، خشکی دهان، مشکلات خونی و گوارشی

توجهات: در افراد با زخم معده، آب سیاه‌چشم و احتباس ادراری با احتیاط مصرف شود.

آموزش: * این دارو را می‌بایست به میزان کمتری در سالمندان استفاده کرد.

* رانندگی بعد از مصرف دارو ممنوع است.

* مصرف همزمان داروهای خواب‌آور ممنوع می‌باشد.

* از مایعات کافی استفاده شود.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.



کلسیم گلوکونات

نام تجاری: Kalciunate

گروه دارویی: جایگزین کلسیم

گروه درمانی: اختلالات الکترولیتی

شکل دارویی: قرص و آمپول

مصرف در دوران حاملگی: گروه A

موارد مصرف: درمان کمبود کلسیم حاد، بالا بودن پتاسیم، بالا بودن منیزیم، ایست قلبی

میزان مصرف: روزانه ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلی‌گرم خوراکی

موارد منع مصرف: بالا بودن کلسیم خون و سنگ کلیوی

عوارض جانبی: یبوست، خشکی دهان، بی‌اشتهایی

توجهات: *در صورت مشاهده رسوب دارو را تزریق نکنید. *در ایست قلبی توصیه نمی‌شود مگر اینکه هیپرکالمی یا هیپوکالمی وجود داشته باشد. *تزریق وریدی در اطفال باید با احتیاط صورت بگیرد. *تزریق باید با استفاده از سوزنی دهانه باریک؛ درون وریدی بزرگ تزریق گردد؛ *در صورتی که نشت به وجود آید ممکن است نکرور ایجاد شود. *بعد از تزریق داخل وریدی به مدت نیم ساعت بیمار را در وضعیت به پشت خوابیده نگه دارید.

آموزش: در صورت ناراحتی گوارشی نیم ساعت بعد از غذا دارو را مصرف کنید. *مواد غذایی غنی از کلسیم (لبنیات؛ گوشت ماهی؛ سبزیجات برگ سبز) بکاربرید و مواد غذایی سرشار از اگزالات و روی (لوبیا؛ عدس؛ نخود؛ شکلات؛ اسفناج) را بکار نبرید.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی و در جای خشک نگهداری شود.



کلوتریمازول

نام تجاری : Lotrimin

گروه دارویی: مشتق صناعی ایمیدازول

گروه درمانی: ضدقارچها

شکل دارویی: قرص واژینال، کرم جلدی و واژینال

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: کاندیدیاز Vulvovaginitis؛ کاندیدیاز پوستی؛ کچلی تنه / پا/ ران

عوارض جانبی:

کلوتریمازول به ندرت موجب عوارض جانبی می شود. کرم های پوستی و شیاف های واژن گاهی اوقات سوختگی یا تحریک موضعی ایجاد می کنند.

موارد منع مصرف: حساسیت مفرط

توجهات: قبل و بعد از بکارگیری دارو موازین آسپتیک را رعایت کنید و دست هارا بشوئید.

*به منظور پیشگیری از عفونت مجدد دوره درمان را کامل کنید.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی و در جای خشک نگهداری شود.



کلیندا مایسین

نام تجاری: Dalacin

گروه دارویی: آنتی بیوتیک

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

شکل دارویی: کپسول ، محلول و پوستی و آمپول، کرم و شیاف واژینال

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: عفونت های ریوی ، پوستی و استخوانی ، درمان کمکی ایدز و عفونت های میکروبی واژن و مالاریا

موارد منع مصرف: حساسیت شدید، نارسایی کلیه

عوارض جانبی: ضایعات پوستی ، خارش ، تهوع ، استفراغ ، کاهش وزن ، التهاب مری و معده ، اسهال شدید ، احساس طعم فلز در دهان

توجهات: * کلیندامایسین را هیچگاه نباید به سرعت وارد ورید بیمار کرد (بولوس) .

* تست های کبدی برای بیمار می بایست انجام شود. * تست های شمارش سلول خون انجام شود. * کنترل BP و تعداد ضربان قلب اهمیت دارد چون دارو باعث هیپوتانسیون میشود. * افت فشار خون جزء عوارض احتمالی است مد نظر داشته باشید. تزریق عضلانی باید به شکل عمیق صورت گیرد * سرعت تجویز وریدی دارو نباید بیش تر از ۱۲۰۰ میلی گرم در ساعت تجاوز کند هرچه سرعت تزریق کمتر باشد خطر آریتمی قلبی کاهش می یابد. * مصرف در نوزادان و زنان باردار ممنوع است. * طی درمان شیردهی باید متوقف شود. * از مصرف همزمان اریترومایسین و کلیندامایسین خودداری شود. * محل تزریق وریدی مرتباً تعویض شود.

آموزش: دارو (کپسول) را با یک لیوان کامل آب مصرف کنید. * دوره درمانی خوراکی یا تزریقی را کامل کنید. * بروز اسهال را به پزشک اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: محلول را در یخچال نگهداری کنید . کپسول را در دمای اتاق نگهداری کنید.



کلوگز اسیلین سدیم

نام تجاری: Orbenim

گروه دارویی: آنتی بیوتیک

گروه درمانی: پنی سیلین مقاوم به پنی سیلیناز

شکل دارویی: کپسول و تزریقی

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: عفونت های میکروبی با استاف طلائی (میکروبی است که تولید کننده پنی

سیلیناز است)، عفونت های پوستی و دستگاه تنفس

میزان مصرف: ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلی گرم هر ۶ ساعت

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی

عوارض جانبی: کهیر ، تهوع و اسهال و عوارضی دیگر مشابه پنی سیلین ها

توجهات:

* دوره درمان می بایست کامل باشد.

* تاریخچه حساسیت به پنی سیلین ها را از بیمار پرسید.

* در دوره مصرف طولانی مدت آزمایش های خونی انجام شود.

* عملکرد کلیوی می بایست بررسی شود.

* اثربخشی قرص های ضد بارداری را کاهش می دهد.

* آنفوزیون وریدی باید در مدت بیش از ۴۰ دقیقه انجام گردد.

شرایط نگهداری :

داروی خشک را در دمای زیر ۳۰^{oC} درون جعبه و دور از نور نگهداری شود.



کوتریموکسازول

نام تجاری : Bac ter im

گروه دارویی : سولفونامید و آنتاگونیست اسید فولیک

گروه درمانی : آنتی بیوتیک

اشکال دارویی : قرص، شربت ؛ آمپول 400mg/5ml

مصرف در دوران حاملگی: گروه B - در اواخر حاملگی گروه D

موارد مصرف: آنتی بیوتیک پرمصرفی است که اغلب در درمان عفونتهای ادراری ؛ گوارشی و تنفسی ، اوتیت میانی ؛ اسهال مسافران ؛ وبا

دوز معمول آن در بزرگسالان دو قرص هر دوازده ساعت است. کوتریموکسازول به طور کامل در دستگاه گوارش جذب شده و پس از چهار ساعت به اوج اثر می رسد.

منع مصرف: در مبتلایان به فاویسم و آنمی مگالوبلاستیک باید اجتناب کرد

عوارض جانبی: سندرم استیون جانسون

توجهات : * محلول در مدت ۹۰-۶۰ دقیقه تجویز شود .

* با سایر داروها ناسازگاری دارد .

* نباید در دمای یخچال نگهداری شود .

* از تزریق بولوس یا سریع دارو اجتناب کنید .

* در زمان مصرف دارو از قرار گرفتن در معرض نور آفتاب خودداری کرده و یا از ضد آفتاب استفاده نموده.

* مایعات فراوان میل نمائید.



لوبریکانت

اشکال دارویی: ژل

ژل لوبریکانت: شفاف-قابل حل در آب است و به جهت روان کنندگی در معاینات و عمل های جراحی زنان استفاده میگردد . مناسب برای انواع معاینات پزشکی -توشه واژینال و رکتان-سونداژ-الکترو تراپیو...می باشد .

این ژل به بافت بدن آسیب نمیرساند و حساسیت ایجاد نمیکند و از همه مهم تر باعث سقط جنین نمی شود



لوزارتان

نام تجاری: Losar

گروه دارویی: آنتاگونیست رسپتور آنژیوتانسین II

گروه درمانی: ضد هایپرتانسیون

اشکال دارویی: قرص

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: درمان هایپرتانسیون - نروپاتی در دیابت های تیپ ۲ - کاهش خطر سکته مغزی در

بیمارن مبتلا به هایپرتانسیون و هیپرتروفی بطن چپ

عوارض جانبی: سرگیجه - اسهال - درد عضلانی - سرفه - سینوزیت

موارد منع مصرف: بارداری ، شیردهی ، حساسیت به لوزارتان

توجهات: * کنترل غلظت پتاسیم سرم بخصوص در بیماران مسن و بیماران دچار نارسایی کلیوی توصیه می شود.

* کاهش دوز دارو در نارسایی کبدی توصیه می شود.

* کلیه رانندگان و افرادی که کارهای پرمخاطره انجام می دهند باید هنگام مصرف این دارو از فعالیت های مربوطه دست بکشند.

* روزانه وزن - جذب و دفع و ادم را در پاها و ساق های پاکت کنترل کنید .

* هنگام تغییر وضعیت به آهستگی تغییر وضعیت دهید .

شرایط نگهداری : در دمای معمولی نگهداری شود



لوکورین

نام تجاری: Folinic Acid – Calcium folinate

گروه دارویی: مشتق آمینوپیریدین (آنتاگونیست اسید فولیک).

گروه درمانی: آنتی دوت

اشکال دارویی: قرص، آمپول

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: مسمومیت با آنتگونیست های اسیدفولیک مانند پیریمتامین، متوترکسات یا تری متوپریم - کم خونیهای مگالوبلاستیک - مسمومیت شدید ناشی از مصرف بیش از اندازه متوترکسات در برنامه‌های شیمی درمانی سرطان

موارد منع مصرف: کم خونی پرنیسیوز یا کمبود ویتامین **B12**

عوارض جانبی: بثورات ، کهیر، خارش و خس خس سینه ناشی از مصرف دارو و واکنش آنافیلاکسی

توجهات: * در نقص کار کلیه به علت اشکال در دفع متوترکسات خطر مسمومیت افزایش خواهد یافت و

ممکن است منجر به تضعف شدید مغز استخوان و التهاب مخاط ها گردد .

* لوکورورین ممکن است دفعات بروز حملات صرعی را در کودکان مستعد افزایش دهد

* جهت کاهش عوارض گوارشی دارو همراه با غذا تجویز شود و روزانه ۳ لیتر مایعات بنوشد.

شرایط نگهداری: در دمای °C ۸-۲ نگهداری شود.



لووتیروکسین

نام تجاری : Levoxine

گروه دارویی : هورمون تیروئید (T4)

گروه درمانی : جایگزین هورمون تیروئید

اشکال دارویی : قرص

مصرف در دوران حاملگی : گروه A

موارد مصرف : کم کاری غده تیروئید، گواتر و کرتینیسم نوزادان ؛ هیپوتیروئیدی مادرزادی

موارد منع مصرف: درمان چاقی – نارسائی تصحیح نشده آدرنال

عوارض جانبی : سردرد ، عصبی شدن، تحریک پذیری، کم خوابی و مشکلات خواب ، تعریق و عدم تحمل گرما، تب، تهوع، استفراغ، اسهال، کاهش وزن، افزایش اشتها، اختلال قاعدگی زنان و ریزش مو. درد سینه، تپش قلب و ضربان قلب تند یا غیر طبیعی.

توجهات: *جذب این دارو در حالت ناشتا بیشتر است. پس سعی کنید صبحها و حداقل نیم ساعت قبل از صبحانه، آن را مصرف کنید.

*برای کنترل دوز داروی مصرفی خود، باید هر چند وقت یکبار آزمایش خون TSH دهید.

*لووتیروکسین می تواند روی سطح خونی بسیاری از داروها تاثیر بگذارد. به هر پزشکی که مراجعه می کنید حتما مصرف لووتیروکسین را یادآوری کنید.

گاهی حتی این دارو و برای بچه‌هایی تجویز می شود که تازه به دنیا آمده‌اند. این درمان ممکن است برای سالها برای کودک ادامه پیدا کند این دارو نباید به هیچ عنوان در دسترس بچه‌ها قرار گیرد

شرایط نگهداری : داروی را در دمای زیر 30°C درون جعبه و دور از نور نگهداری شود.



لیدوکائین هیدروکلراید

نام تجاری: Xylocaine

گروه دارویی: مشتقات آمیدها

گروه درمانی: بی حس کننده موضعی

شکل دارویی: تزریقی، پماد؛ اسپری

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: بی حس کننده منطقه‌ای، بلوک اعصاب محیطی و بلوک عصب سمپاتیک در بی-

حسی‌های نخاعی (اسپانیال) و ترکیبات مخدر و آریتمی قلبی.

میزان مصرف: بنا بر ضرورت متفاوت است.

نکته: این دارو با اپی نفرین، پریلوکائین مخلوط هم می‌شوند.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، این دارو با داروهای ایندرال، سایمتدین، فنی توئین،

باربیتورات‌ها، دیوریتک‌ها و مهارکننده‌های مغز و اعصاب تداخل دارویی دارد.

عوارض جانبی: تهوع، استفراغ، تشنج، انقباض مردمک

توجهات: تجویز مقدار زیاد آن باعث تشنج می‌شود.

آموزش: در مصرف دندانپزشکی بلع غذا را مختل می‌کند.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.



مترونیدازول

نام تجاری: Flagyl

گروه دارویی: نیترو ایمیدازول

گروه درمانی: ضد باکتری ، ضد آمیب

شکل دارویی: شربت ، آمپول ، ژل پوستی ، شیاف واژینال ، ویال تزریقی

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: عفونت های میکروبی (بی هوازی) ، اسهال خونی ، اندوکاردیت ، عفونت شکمی

میزان مصرف: ۱۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم طی یک ساعت به عنوان میزان اولیه و ۷,۵ میلی گرم به

ازای هر کیلوگرم طی ۶ ساعت و حداکثر مصرف ۲۴ ساعت ۴ گرم می باشد.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی ، اختلالات خونی یا بیماری مغز

عوارض جانبی: مشکلات کبدی و کلیوی ، تهوع ، احساس سوزش مجاری ادراری ، سرگیجه ،

سنکوپ، ضایعات پوستی ، کهیر

توجهات: *آزمایشهای خونی باید انجام شود. * این دارو با لیتیوم تداخل دارویی دارد.

*درشیردهی بااحتیاط کامل مصرف شود.

*تزریق وریدی به آرامی باسرعت کم درطی یک ساعت انجام شود.

*نگهداری آن دردمای یخچال احتمال رسوب دارد

*مترونیدازول تزریقی فقط بایدبه صورت انفوزیون آهسته وریدی مصرف شودکه دراینصورت

انفوزیون محلول ها یا سرمهای دیگر باید قطع شود.

آموزش: بهتر است دارو با معده خالی مصرف شود. *در عفونت زنان با میکروب (تریکوموناس)

می بایست همسر وی نیز درمان شود. *تشنج و علائم منگی نشانه مسمومیت بیمار است، به

پزشک مراجعه شود.

شرایط نگهداری: محلول مترونیدازول به مدت سه شبانه روز قابل نگهداری در دمای معمولی

است.



متوپرولول

نام تجاری: متورال

گروه دارویی: بتا بلاکر

گروه درمانی: ضد هیپرتانسیون - درمان کمکی در MI حاد

شکل دارویی: قرص؛ آمپول

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: درمان آنژین صدری مزمن، کنترل زیادی فشا رخن و پیشگیری از انفارکتوس مجدد میوکارد؛ درمان کمکی در MI حاد

موارد منع مصرف: این دارو در شوک قلبی، نارسایی آشکار قلب، بلوک قلبی درجه دو یا سه دهلیزی - بطنی، برادی کاردی سینوسی و کاهش فشار خون سیستولیک به کمتر از ۱۰۰ میلی‌متر جیوه (برای پیشگیری از انفارکتوس مجدد میوکارد) نباید مصرف شود.

عوارض جانبی: برادی کاردی علامتی (سرگیجه)، اسپاسم برونش (اشکال در تنفس یا خس خس سینه)، نارسایی احتقانی قلب (تورم مچ و اندامهای تحتانی)، تنگی نفس، افسردگی روانی و کاهش گردش خون محیطی (سردی دستها و پاها)

توجهات: *اگر بعد از یک دوره درمان طولانی با این دارو قطع مصرف آن ضرورت پیدا کند، باید بتدریج و حداقل طی سه روز تا دو هفته مصرف دارو قطع شود.

*در طول مصرف این دارو، پیگیری عملکرد قلب، تعیین نبض، اندازه‌گیری فشار خون و ثبت نوار قلبی و اندازه‌گیری ضربان قلب ضروری است.

*به علت احتمال بروز سرگیجه، خواب‌آلودگی و منگی، هنگام رانندگی یا کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری دارند، باید احتیاط نمود.

*در طول مصرف این دارو لازم است وزن کنترل شده؛ رژیم غذایی و برنامه ورزشی رعایت گردد.



متوکلوپر امید

نام تجاری: Plasil

گروه دارویی: پاراسماتومیمیتیک

گروه درمانی: ضد تهوع ، ضد استفراغ

شکل دارویی: قرص ، آمپول و قطره

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: برگشت اسید معده به مری ، درمان یا پیشگیری از استفراغ و شیمی درمانی

میزان مصرف: یک قرص هر ۸ ساعت

موارد منع مصرف: خونریزی ، انسداد روده ، تشنج

عوارض جانبی: علائم پارکینسون ، سردرد ، بی خوابی ، تشنج ، توهم ، اسهال ، تکرر ادرار ،

علائم چشمی و مغزی

توجهات: * در صورت تکرار تزریق باید دارو رقیق شود.

*رنگ دارو قبل از تزریق نباید عوض شود.

آموزش: رانندگی بعد از مصرف دارو خطر ناک است.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.



متیل ارگونوین مالئات

نام تجاری: Methergine

گروه دارویی: اکسی توسیک

اشکال دارویی: قرص و آمپول

مکانیسم اثر: انقباضات رحمی را تحریک کرده و خونریزی را کاهش می دهد.

موارد مصرف: درمان خونریزی بعد از زایمان یا سقط

میزان مصرف:

تزریق عضلانی 0.2mg هر ۲ تا ۵ ساعت حداکثر ۵ دوز، تزریق وریدی 0.2mg که در مدت یک دقیقه تجویز می شود؛ 0.2mg - 0.4mg خوراکی هر ۶ تا ۱۲ ساعت به مدت ۲ تا ۷ روز بعد از دوز اولیه عضلانی یا وریدی

موارد منع مصرف: حساسیت شدید به فرآورده های ارگوت، اندیکاسیون های زایمان، قبل از خروج جفت بیماری تنفسی - قلبی و بیماری عروق محیطی

عوارض جانبی: سردرد، سرگیجه، درد قفسه سینه، طپش قلب، افزایش فشار خون، تعریق



متیل دوپا

نام تجاری: Aldomet

گروه دارویی: آنتی آدرنرژیک

گروه درمانی: ضد فشار خون

شکل دارویی: قرص ۲۵۰ میلی گرمی

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: فشار خون ، سندرم رینود

میزان مصرف: ۱ تا ۳ قرص روزانه مصرف شود.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی ، بیماران کبدی

عوارض جانبی: خواب آلودگی ، اسهال ، درد قلبی، زردی ، درد عضله و مفصل

توجهات : * فشار خون بیمار باید کنترل شود.

* آزمایشهای خونی بررسی شود.

نکته : در بیماری رینود به علت مشکل عروقی در انتهای (دست و پا) در تماس با آب سرد یا

هوای سرد تغییر رنگ اندام ایجاد می شود.

آموزش: خشکی دهان با مصرف مایعات یا آدامس بر طرف می شود.

* ضعف و سرگیجه ، اسهال یا یبوست علائم مسمومیت اند، به پزشک اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.



مروپنم

نام تجاری دارو : Meronem

گروه دارویی : مشتق کارباپنم

گروه درمانی : آنتی بیوتیک

اشکال دارویی : ویال **500-1000mg**

مصرف در بارداری: گروه B

موارد مصرف : آپاندیسیت؛ پریتونیت؛ مننژیت باکتریائی

عوارض جانبی : واکنش های افزایش حساسیت ؛ سپسیس؛ شوک؛ آپنه

منع مصرف : هر نوع حساسیت به پنی سیلین ها، سفالوسپورینها و سایر مشتقات آن

توجهات : * در صورت داشتن اختلالات کلیوی (دوز دارو باید محاسبه و تنظیم گردد). * در صورت داشتن سابقه صرع، بیماریهای مغزی، کلیوی، کبدی و آسم به پزشک اطلاع داده شود* تزریق این فرآورده باید در مراکز درمانی مجهز به امکانات لازم برای درمان های اوژرانس انجام گیرد. * از مخلوط نمودن این دارو با سایر آنتی بیوتیک ها از جمله آمینوگلیکوزیدها به منظور تزریق وریدی خودداری گردد* در صورت بروز حساسیت (آسم، اگزما، تب و کهیر) فوراً مصرف دارو را قطع و اقدامات لازم برای درمان و مقابله با شوک آنافیلاکتیک انجام گیرد. *به واکنش های آلرژیک که ممکن است چند روز پس از اتمام درمان بوجود بیاید توجه داشته باشید

* انفوزیون وریدی مروپنم در عرض ۱۵-۳۰ دقیقه انجام شود .

* مروپنم شبیه ایمی پنم بوده اما عوارض عصبی و افزایش ریسک تشنج ناشی از آن بسیار کمتر از ایمی پنم است.* در مننژیت ها برخلاف ایمی پنم قابل استفاده است
* در صورت وقوع تشنج دوز را کاهش یا متوقف کنید.



مفنامیک اسید

گروه دارویی: ضد التهاب غیر استروئیدی

اشکال دارویی: کپسول ۲۵۰ میلی گرمی

موارد مصرف:

- جهت برطرف کردن کوتاه مدت (حداکثر ۷ روز) قاعدگی دردناک و درد
 - حملات حاد نقرس یا بیماری نقرس کاذب
 - دردهای همراه با التهاب غیر روماتیسمی
 - سردردهای عروقی و پیشگیری از میگرن همراه با قاعدگی
 - ضد التهاب و ضد درد برای برطرف کردن علائم آرتريت روماتوئید و دردهای عضلانی
 - درد در اثر ضربه، دندان درد، دردهای پس از اعمال جراحی و پس از زایمان
- موارد منع مصرف:** حساسیت به دارو، آسم، کهیر، آلرژی، در بیماران با زخم ها یا التهاب های مزمن در دستگاه گوارش و در بیماران با سابقه بیماری های کلیوی
- مصرف در دوران بارداری مجاز نیست

مصرف در دوران شیردهی: مقدار ناچیزی از آن در شیر مادر ترشح می شود.

عوارض جانبی: سرگیجه، سردرد، بثورات پوستی، خارش، تهوع، استفراغ، نفخ، سوء هاضمه، سوزش سر دل، زخم معده، بی کفایتی عملکرد کلیوی.



منیزیم هیدروکساید

گروه دارویی: مسهل نمکی، آنتی اسید

اشکال دارویی: سوسپانسیون ۸٪

گروه مصرف در حاملگی: گروه C

این فراورده در دوزهای پایین به صورت آنتی اسید و در دوزهای بالاتر به صورت ملین نمکی خفیف عمل می کند. در معده با اسید هیدرولیک واکنش داده و تشکیل منیزیم کلراید می دهد که اثر خنثی کننده دارد. منیزیم کلراید سبب احتباس اسموتیک مایعات می شود که کولون را متسع می کند و در نتیجه سبب تحریک مکانیکی فعالیت پرستالتیک می شود.

موارد مصرف: درمان کوتاه مدت یبوست، برای تسکین نشانه های گوارشی همراه ازدیاد ترشح اسید، و به عنوان داروی کمکی در درمان اولسر پپتیک؛ هم چنین در درمان مسمومیت با اسیدهای معدنی و آرسنیک و به صورت دهان شویه برای خنثی سازی اسیدیتته مصرف شده است.

موارد منع مصرف: اسهال، اختلال شدید عملکرد کلیه، تجمع مدفوع سخت و متراکم، انسداد یا پرفوراسیون روده، خونریزی مقعد، کولوستومی

عوارض جانبی: تهوع، استفراغ، کرامپ های شکلی، اسهال، قلیایی شدن ادرار، دهیدراتاسیون، ضعف، هیپوتانسیون، برادیکاردی



مورفین

نام تجاری: morphitec

گروه دارویی: اپیوئیدی

گروه درمانی: مخدر، ضد درد

شکل دارویی: Injection : 10 mg/ml Tablet : 10 mg

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: ضددرد برای بیماران بستری - دردهای بیماران قلبی - درد ناشی از بیماری خونی - سلول‌های داسی شکل - درد ناشی از جراحی و پس از جراحی - دردهای مزمن شدید - درد ناشی از جراحی - سرطان - سنگ کلیه - کمر درد شدید - داروی کمکی به همراه داروهای بیهوشی - ضدسرفه در سرفه‌های شدید - ضداسهال در اسهال‌های مزمن (از جمله اسهال بیماران مبتلا به ایدز)

موارد منع مصرف: در نارسایی تنفسی، انسداد راه هوایی، حساسیت شدید دارویی، اختلالات تشنجی، ضربات سر، ضربه مغزی (اختلال هوشیاری)، آسم

عوارض جانبی: استفراغ، تهوع، خواب آلودگی، خارش، مهار تنفسی، شوک، کوما، احتباس ادراری، کاهش فشار خون

توجهات: *توقف تنفسی، شلی شدید عضلات و کاهش فشار خون علائم مسمومیت اند و باید به پزشک اطلاع داده شود. *در موارد زیر مصرف این دارو با احتیاط کامل انجام شود: کمی فشارخون، کم کاری غده تیروئید، آسم، کمبودن ذخیره تنفسی، نارسایی کبدی، نارسایی کلیوی، بزرگی پروستات، اختلالات تشنجی، سالمندان و بیماران ناتوان.

*در مواردی که کنترل درد ضروری باشد مثلاً در بیماران نزدیک به مرگ، رعایت احتیاط‌های فوق ضرورتی ندارد.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.



مولتی ویتامین

گروه دارویی: مولتی ویتامین

گروه درمانی: مکمل غذایی

شکل دارویی: قرص، کپسول، شربت و قطره خوراکی

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: این دارو حاوی ویتامین‌های A, D, E, B1, B2, B6, B12 و نیکوتینیک اسید، ویتامین C، کلسیم و بیوتین است.

میزان مصرف: یک قرص روزانه یا ۵ سی سی شربت یا یک کپسول

موارد منع مصرف: مورد خاصی وجود ندارد.

عوارض جانبی: مصرف خودسرانه ویتامین‌ها ممنوع است. زیرا میزان بالای آن پرعارضه خواهد بود.

توجهات: کودکان با سوء تغذیه، مادران باردار و شیرده نیاز به برنامه خاص دارند.

آموزش: طبق دستور پزشک دارو مصرف شود.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.



میدازولام Dormtcom

گروه دارویی: بنزودیازپین ها

گروه درمانی: آرام بخش، داروی کمکی در بیهوشی

شکل دارویی: آمپول ۵mg و ۱۵mg

مصرف در دوران حاملگی: گروه D

موارد مصرف: آرام بخش، کاهش اضطراب، نگهداری و کمک بیهوشی عمومی، درمان تشنج، سکسکه مقاوم به درمان

میزان مصرف: ۰/۰۷ تا ۰/۰۸ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم- در تزریق عضلانی ۰/۰۳ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، گلوکوم زاویه باریک، شوک، کوما، مسمومیت حاد با الکل، نارسایی کلیه

عوارض جانبی: توقف تنفسی مهمترین عارضه می باشد. تحریک پذیری، بی قراری، لارنگواسپاسم (اسپاسم مجاری هوای)، سردرد، تندی تنفس، لکنت، تاری دید، اختلال چشمی، اختلال تعادل

توجهات: *میزان تجویز دارو در سنین بالا (سالمندان) و اطفال باید پایین تر باشد.

*تزریق عضلانی دارو باید عمیق باشد.

*وسایل احیاء قلبی - ریوی در دسترس باشند .

*اکسیژن به منظور حمایت از راههای هوایی در دسترس باشد .

*این دارو را از بولوس سریع تزریق نکنید .

آموزش: اختلالات روانی و حرکتی بعد از دارو محتمل است.

*تا ۲۴ ساعت بعد از دریافت دارو بیمار نباید به کارهای دقیق مشغول باشد یا رانندگی کند.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.



میزو پروستول (پروستاگلاندین E2)

نام تجاری: Cytotec- prostin E₂- Dinoprostone

گروه دارویی: پروستاگلاندین

گروه درمانی: اکسی توکسیک و ضد اولسر، محافظ مخاط معده

مصرف در دوران حاملگی: گروه X

tab= ۲۰۰ mcg یا ۱۰۰ mcg

Inj: 10mg/ml (0.5ml)

اشکال دارویی:

Vag Tab: 3 mg

Vag Gel: 1 mg / 2.5 ml , 2mg/2.5 ml

Cer vical Gel: 500mg / 2.5 ml

مکانیسم اثر: روی عضلات صاف میومتر تاثیر می گذارد و سبب انقباضات پی در پی می شود.

موارد مصرف: دیلاتاسیون سرویکس قبل از شروع زایمان - القای زایمان - تخلیه محتویات رحم در

سقط فراموش شده - جلوگیری از زخم معده ناشی از NSAIDs؛ خاتمه بارداری کمتر از ۴۹ روز(همراه

with mifepristone)؛ القاء درد زایمان و رسیده شدن گردن رحم؛ خونریزی سنگین و غیر طبیعی رحمی

عوارض جانبی: سردرد، سرگیجه، تهوع و استفراغ، آریتمی برونکواسپاسم؛ درد شکمی؛ تهوع و استفراغ؛

مرگ جنین؛ سردرد؛ تب؛ پارگی و تخریب رحمی؛ دیسمنوره، هایپرمنوره، اختلال قاعدگی، خونریزی پس

از یائسگی؛ تندر نس پستان؛ تعریق زیاد؛ راش

نشانه های سمیت: خواب آلودگی؛ ترمور؛ تشنج؛ تنگی نفس؛ درد شکم؛ اسهال؛ کاهش فشار خون؛

برادی کاردی

موارد منع مصرف: حساسیت به میزوپروستول، پروستاگلاندین ها یا هر ترکیب دیگری در این

فرمولاسیون • بارداری (زمانی که از این دارو جهت کاهش عارضه زخم گوارشی ناشی از NSAIDs استفاده

می کنید) • بارداری های خارج رحمی و خانمی که IUD دارد • بیماری شدید قلبی و یا تنفسی •

خونریزی واژینال تشخیص داده نشده • پارگی پرده • جفت سر راهی • هرپس ژنیتال فعال • موارد منع

زایمان واژینال • عفونت درمان نشده لگن • آسم • تشنج • واژینیت • گلوکوم • اسکار رحم • سرویسیت



توجهات پرستاری: *سقطت پس از ۳۰ ساعت بعد از استعمال این دارو کامل میشود.

*در طی درمان مراقبت بروز عوارض گوارشی و علایم حیاتی بیمار باشید. *در صورتی از این دارو استفاده کنید که امکانات مراقبت ویژه در دسترس باشد. *تا ۱۰ دقیقه پس از قرار دادن شیاف به حالت دراز کش باقی بماند. *دارو را همیشه در زمان مشخصی از روز استفاده کنید.

*اگر میزوپروستول را برای جلوگیری از زخم معده استفاده می کنید معمولاً از طریق اورال و ۴ بار در روز، بعد غذا و قبل از خواب استفاده می شود. *از مصرف آنتی اسیدهای حاوی منیزیم به همراه میزوپروستول خودداری کنید. (به علت وخیم تر شدن اسهال بیمار)

* تنها زمانی می توانید خودتان از این دارو استفاده کنید که انتقال به بیمارستان در ظرف مدت زمان کم امکان پذیر باشد. *در صورت خونریزی شدید و تب حتماً به پزشک مراجعه کنید.

*میزوپروستول با میفپریستول اشتباه می شود. *از تجویز دارو برای خانمها در سنین باروری تا اطمینان از کاربرد یک روش مناسب جلوگیری از بارداری خودداری کنید. *به بیماران در رابطه با خطرات دارو در صورت شکست روش جلوگیری از بارداری به صورت شفاهی و کتبی اطلاع رسانی نمایید.

*دارو باید در صورت منفی شدن تست بارداری در عرض ۲ هفته قبل از شروع دارو درمانی و در روز دوم یا سوم پس از قاعدگی طبیعی مصرف شود. *نباید از الکل و سایر داروها در طی درمان استفاده شود.

*عوامل خطر جهت پارگی رحم عبارتند از: ایام پایانی بارداری، مصرف دوز بالا از دارو، سابقه سزارین،

جراحی رحم یا ۵ و یا بیش از ۵ بار سابقه بارداری. *مراقب تب باشید که نیم ساعت بعد از بکارگیری

شیاف ایجاد می شود *از روش های کنترل درد مانند انحراف فکر از موضوع استفاده نمائید

*به مدت ۲ هفته از نزدیکی؛ تامپون و انجام دوش واژینال خودداری کنید

شرایط نگهداری: ژل را در درجه حرارت ۱۵-۲۰°C نگهداری کنید. شیاف را در درجه حرارت ۲۰°C- و به صورت منجمد نگهداری کنید.



ناپروکسن

نام تجاری : Anaprox, Naprosyn

گروه دارویی : مشتق اسید پروپیونیک (ضدالتهاب غیراستروئیدی)

گروه درمانی : ضد درد غیر مخدر و ضد تب

مصرف در دوران حاملگی : گروه B

موارد مصرف : درد خفیف تا متوسط، اوستئوآرتريت، آرتريت روماتوئید، آرتريت نقرسی.

موارد منع مصرف :

حساسیت مفرط، آسم، بیماری کلیوی شدید، بیماری کبدی شدید و اوسرپتیک فعال.

عوارض جانبی : وزوز گوش ؛ تاری دید؛ وزوز گوش

توجهات : *اختلالات خونریزی دهنده، اختلالات گوارشی، اختلالات قلبی، حساسیت مفرط به دیگر

ترکیبات ضدالتهاب، پیری بااحتیاط مصرف شود.

*گزارش کردن تاری دید، صدای زنگ و غرش در گوش‌ها (ممکن است نشانه مسمومیت باشد)

*در صورت بروز سرگیجه یا خواب‌آلودگی از رانندگی و دیگر اعمال مخاطره‌آمیز خودداری کند.

*گزارش کردن : تغییر در الگوی ادراری، افزایش وزن، ادم (صورت، اندام‌های تحتانی)، افزایش درد در

مفاصل، تب، خون در ادرار (نشانه سمیت کلیوی)

*پاسخ درمانی ممکن است تا یک ماه بعد ظاهر شود.

شرایط نگهداری : در دمای اتاق نگهداری شود.



نالوکسان

نام تجاری: Narcan

گروه دارویی: اکسی مورفون

گروه درمانی: ضد اپیوئید ها - ضد مخدر ها

شکل دارویی: تزریقی

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: تشخیص و درمان مسمومیت ها با مواد مخدر یا کومای ناشی از آن ، درمان مهار تنفسی بعد

از جراحی ، خارش ناشی از انسداد صفراوی

میزان مصرف: ۰/۴ تا ۲ میلی گرم وریدی یک جا تزریق می شود.

موارد منع مصرف: در افرادی که وابستگی شدید به مخدر ها دارند، با احتیاط استفاده شود.

عوارض جانبی: تهوع ، استفراغ ، اختلال تمرکز و حواس ، بی اشتهایی ، تغییرات فشار خون

توجهات: این دارو اغلب در مراکز اورژانس و بیمارستانی تزریق می شود.

آموزش: مورد خاصی مطرح نیست.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

نوافن

شکل دارویی: هر عدد کپسول نوافن دارای ۳۲۵ میلی گرم استامینوفن، ۴۰ میلی گرم کافیین و ۲۰۰ میلی گرم ایپوبروفن می باشد.

موارد مصرف: دردهای خفیف تا متوسط ناشی از سردرد (عصبی و میگرنی)، دندان درد، دردهای عصبی - ماهیچه ای، دردهای مفصلی و دیس منوره کاربرد دارد

موارد منع مصرف: در صورت سابقه وجود آلرژیک شدید از قبیل آنافیلاکسی یا آنژیوادم ناشی از داروهای ضدالتهاب غیر استروئیدی منع مصرف دارد.

عوارض جانبی: بثورات پوستی، درماتیت آلرژیک، اختلالات خونی، پانکراتیت حاد از عوارض مصرف طولانی مدت استامینوفن است. تهوع، اسهال و گاهی خونریزی و زخم ممکن است در اثر مصرف ایپوبروفن ایجاد شود.

توجهات: * در صورت بروز هرگونه اختلال در بینائی باید با پزشک مشورت شود .

* به دلیل احتمال بروز آسیب کبدی یا کلیوی، نباید این دارو بیش از مقدار توصیه شده مصرف شود.

* مصرف این درو در زمان بارداری و شیردهی توصیه نمی گردد.

* به علت وجود استامینوفن در بیماران دیابتی ، احتمال مثبت شدن کاذب تست قند خون وجود دارد.* در بیماران دچار اختلالات کلیوی به علت وجود ایپوبروفن ، با احتیاط و با کنترل عملکرد کلیه

به طور مرتب ، مصرف گردد.

* اگر دچار زخم گوارشی و یا سابقه آن را دارید از مصرف دارو های دارای ایپوبروفن پرهیز کنید

* در بیماران که سابقه حمله آسم - آنژیوادم - کهیر یا رینیت ناشی از ضد التهاب غیر استروئیدی

وجود دارد ، مصرف گردد.

* در صورت هر گونه اختلال در بینایی باید با پزشک مشورت گردد زیرا احتمال بروز تنبلی چشم وجود دارد



نور ترپتیلین

گروه داروئی: TCA

گروه درمانی: ضد افسردگی‌های سه حلقه ای

اشکال دارویی: قرص

مصرف در دوران حاملگی: گروه D

موارد مصرف: اختلال افسردگی؛ میگرن؛ شب ادراری کودکان

موارد منع مصرف: حساسیت مفرط - سکته قلبی اخیر - کوما - دپرسیون شدید تنفسی

عوارض جانبی: سرگیجه - سردرد - ضعف - آرامش زیاد - هیپوتانسیون ارتوستاتیک - حساسیت به نور - مشکلات گوارشی

توجهات:

*در صورت بروز سرگیجه یا خواب‌آلودگی از رانندگی و دیگر اعمال مخاطره‌آمیز خودداری کند.

*دارو را همراه با غذا یا شیر مصرف کنید .

*بعد از استفاده طولانی مدت از قطع ناگهانی دارو اجتناب کنید ممکن است تهوع؛ سردرد و احساس ناخوشی بوجود آید.

* فشار خون بیمار را کنترل کنید

*برای جلوگیری از هیپوتانسیون وضعیتی از تغییر وضعیت ناگهانی پرهیز نمائید.



نیتروفورانتوئین

نام تجاری: Furadantin

گروه داروئی: مشتق صنعتی نیتروفوران

گروه درمانی: ضد عفونت ادراری

اشکال دارویی: قرص و سوسپانسیون

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: درمان عفونت‌های دستگاه ادراری، پروفیلاکسی عفونت‌های ادراری

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، نارسایی کلیه؛ آنوری؛ G6PD؛ ترم طی زایمان

عوارض جانبی: تهوع، استفراغ، نورپاتی محیطی (بی‌حسی یا کرختی در اندام‌ها)، درد سینه، تب،

ضایعات پوستی، تغییر رنگ ادرار

توجهات:

*قبل از شروع درمان نمونه را کشت دهید و آنتی‌بیوگرام را انجام دهید.

*دو مسئله مهم مثل تغییر رنگ ادرار و دندان ممکن است بروز کند.

*بهتر است دارو با مایعات میل شود.

*ضعف عضلانی را به پزشک اطلاع دهید.

*دارو را همراه غذا میل کنید

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.



نیتروگلیسرین

نام تجاری : Nitrostat

گروه دارویی : نیترات

گروه درمانی: گشادکننده عروقی و ضد آنژین

اشکال دارویی: قرص، برچسب پوستی، اسپری؛ پرل؛ آمپول؛ پماد

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: نیتروگلیسرین در آنژین صدری و بحران هیپرتانسیون تجویز می‌شود.

این دارو در سه مورد کاربرد دارد:

- (۱) تخفیف یک آنژین صدری با مصرف دارو و پس از شروع درد
- (۲) جلوگیری از حمله قلبی با مصرف دارو و درست پیش از بروز حمله
- (۳) کاهش تعداد حملات با مصرف دائمی و منظم دارو.

قرص‌های زیر زبانی نیتروگلیسرین، قرص‌هایی که در دهان بین لب یا گونه و لثه‌های فوقانی گذاشته می‌شوند، یا اسپری آئروسول که در زیر زبان زده می‌شود، همگی حملات آنژینی را تخفیف داده یا از آنها جلوگیری می‌کنند.

عوارض جانبی: تاری دید، خشکی دهان، سردرد شدید، یا بثورات جلدی. برافروختگی صورت و گردن و

تهوع

تداخلات دارویی: مصرف همزمان با سایر داروهای هیپرتانسیون؛ می‌تواند هیپرتانسیون شدید ایجاد کند



توجهات :

- * بیمار را از نظر هیپوتانسیون ارتوستاتیک و نبض بررسی کنید.
 - * سردرد؛ احساس سبکی در سر و کاهش میزان فشارخون مواردی هستند که نیاز به کاهش میزان دوز دارو را مطرح می سازد.
 - * قرص های مخاطی باید مابین گونه و لثه جای گیرند .
 - * پماد موضعی برای استفاده باید از طریق ورف های اندازه بندی شده؛ اندازه گیری شود.
 - * اشکال زیرزبانی دارو را نباید خورد بلکه باید زیرزبان گذاشت تا حل شود و احساس سوزن سوزن شدن غشای مخاطی را بیمار تجربه می نماید .
 - * اسپری را باید در زیر زبان مورد استفاده قرار داد نباید آنها را استنشاق کرد.
 - * در طی حمله آنژیینی بهتر است نشسته دارو را مصرف کنید.
 - * جهت انفوزیون وریدی بهترین سرم ؛ سرم قندی ۵٪ می باشد .
- شرایط نگهداری:** در درجه حرارت $20-25^{\circ}\text{C}$ نگهداری شود. نوع تزریقی را باید دور از انجماد و نور نگهداری کرد .



نئوستیگمین

نام تجاری: Prostigmin

گروه دارویی: محرک کولینرژیک

گروه درمانی: محرک عضلانی

اشکال دارویی: آمپول ۰/۵mg/ml و ۲/۵mg/ml

موارد مصرف: نئوستیگمین در درمان ضعف عضلانی ناشی از بیماری میاستنی گراویس، احتباس غیر انسدادی ادرار بعد از عمل جراحی و به عنوان پادزهر داروهای مسدودکننده عصبی - عضلانی غیر دیپولاریزان مصرف می شود.

فارماکوکینتیک: این دارو بعد از تزریق عضلانی، سریع جذب می شود در پلاسما و کبد متابولیزه می شود و دفع آن کلیوی است.

عوارض جانبی: اسهال، تهوع یا استفراغ، کرامپ یا درد معده، افزایش غیر عادی تعریق و افزایش غیر عادی ترشح بزاق

توجهات: *در صورت وجود انسداد مکانیکی روده یا مجاری ادرار با احتیاطی فراوان تجویز شوند.

*در مصرف این دارو پس از جراحی باید احتیاط کرد زیرا ممکن است مشکلات تنفسی ناشی از درد پس از عمل جراحی تسکین، احتباس ترشحات یا آتلکتازی را تشدید کند.



وارفارین

نام تجاری: کمادین

گروه دارویی: مشتق کومارین

گروه درمانی: عوامل ضدانعقاد خون

شکل دارویی: قرص

مصرف در دوران حاملگی: گروه D

موارد مصرف: ترومبوز یا آمبولی عروقی - پس از جراحی قلب باز، سکته قلبی یا مغزی، آمبولی ریه، حمله قلبی، بیماری اختلال دریچه قلب

موارد منع مصرف: حساسیت به وارفارین، سایر داروهای ضد انعقاد، یا هر نوع ماده غذایی، رنگ خوراکی، یا دارو؛ خونریزی فعال؛ کمبود ویتامین کا؛ سرطان های احشائی؛ بیماری شدید کلیه و کبد و ریه

عوارض جانبی: کبودی یا درد انگشتان پا؛ خونریزی خارجی مثل خونریزی از لثه ها هنگام مسواک زدن؛ کبودی وسیع بدون ضربه؛ خون دماغ؛ خونریزی شدید و غیرعادی از بریدگی ها؛ خونریزی شدید و غیرعادی هنگام عادت ماهانه. علائم خونریزی داخلی

توجهات: *مورد مصرف وارفارین باید دقت شود که آن را هر روز در ساعت مشخص و ثابتی مصرف کنید. بهترین زمان مصرف وارفارین ساعت ۶ عصر می باشد. *اگر نصف قرص و یا قرص را مصرف کردید، باقیمانده قرص را می توانید نگه دارید و در نوبت های بعدی مصرف کنید. *یک برگه شناسایی پزشکی همراه داشته باشید که نشان دهد وارفارین مصرف می کنید. *از ورزش یا فعالیت هایی که ممکن است در آنها آسیب ببینید بپرهیزید. *مراقب باشید دستتان را نبرید و از خلال دندان استفاده نکنید. از ماشین ریش تراش (به جای تیغ ریش تراش) و مسواک نرم استفاده کنی

شرایط نگهداری: قرص های وارفارین را در جای خشک و خنک نگهداری کنید ولی لزومی به نگهداری در یخچال نمی باشد و می توان آن را در دمای اتاق، دور از حرارت و گرما، رطوبت و نور مستقیم آفتاب نگهداری کرد. دارو بایستی از یخ زدگی محافظت شود.



وانکومايسين

نام تجاری: Vancocin

گروه دارویی: گلیکوپپتید

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

شکل دارویی: تزریقی و محلول خوراکی

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: عفونت های متوسط ، بی هوازی ، گانگرن ، عفونت استخوانی ، عفونت پوستی و روده ای، عفونت ریوی و پرده مغزی

میزان مصرف: ۴۵ تا ۶۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم در روز

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی ، اختلالات شنوایی و نارسایی کلیوی

عوارض جانبی: عوارض شنوایی و کلیوی، تهوع ، کاهش فشار خون ، اختلالات خونی ، درد محل تزریق، تشنج

توجهات: آثار سمی روی گوش و کلیه دارد بنابراین عملکرد کلیه به صورت دوره ای در طی درمان پایش شود. * تزریق عضلانی دارو ممنوع است.

* به خاطر عملکرد ناقص کلیه در نوزادان نارس و شیرخواران با احتیاط مصرف شود.

* یک دوز واحد ۵۰۰ میلی گرم را در مدت ۹۰-۶۰ دقیقه تجویز کنید.

Red Man Syndrom گر گرفتگی همراه باتب ولرز در اثر تزریق وریدی سریع وانکومايسين ایجاد می شود سرعت انفوزیون را آهسته کنید .

* تزریق سریع دارو به صورت وریدی به علت آزاد نمودن هیستامین باعث کاهش فشار خون؛ گر گرفتگی؛ فلاشینگ میشود. * محل تزریق دارو در هر بار انفوزیون باید تغییر داده شود.

* سابقه حساسیت دارویی را به پزشک بگویید.

* علائم سرگیجه و وز وز گوش را به اطلاع پزشک برسانید.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.



وراپامیل

نام تجاری: Isoptin

گروه دارویی: دی فنیل آلکیل آمین

گروه درمانی: ضد فشار خون ؛ ضد آریتمی ؛ ضد آنژین صدری

شکل دارویی: قرص و نوع تزریقی

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: درد قلبی، فشار خون، بی نظمی قلبی (به ویژه آریتمی PAT) **نکته:** عارضه (PAT) یک بی نظمی قلبی است که به علت افزایش تعداد ضربان قلب بروز می کند و این دارو در مراکز درمانی بسیار موثر است.

میزان مصرف: بستگی به نوع آریتمی قلبی دارد.

موارد منع مصرف: مشکلات هدایتی قلب (بلوک درجه ۲ یا ۳)

عوارض جانبی:

تپش قلب، سرگیجه، اختلال خواب، اختلال دید، درماتیت (ضایعات پوستی)، دل درد، خشکی دهان، درد عضلانی و اشکالات تنفسی

توجهات: کنترل علائم حیاتی ضروری است.

*نوار قلبی باید گرفته شود.

آموزش: در صورت تنگی نفس به پزشک اطلاع دهید.

*دارو را همراه غذا میل کنید.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.



ویتامین B₁ (thiamine HCL)

گروه دارویی: ویتامین محلول در آب

گروه درمانی: ویتامین

شکل دارویی: inj = 100mg tab= 100-300mg

مصرف در حاملگی: گروه A (در صورت مصرف بیش از حد؛ گروه C)

موارد مصرف: بری بری - سندروم ورنیکه

موارد منع مصرف: حساسیت

عوارض جانبی: سیانوز - ادم ریوی - ایست قلبی - کهیر - خارش - بی قراری - تهوع - اسهال -

آنژیوادم - GIB

توجهات:

* تجویز تیامین؛ باید پیش از انفوزیون محلول های دارای گلوکز باشد .

* این دارو را با محلول های قلیائی مخلوط نکنید

* اگر راه خوراکی مفید واقع نشد راه تزریقی تجویز می گردد .

* محلول رقیق نشده را میتوان در عرض ۵ دقیقه داخل وریدی تزریق کرد

* می توان در محل تزریق از کمپرس سرد استفاده کرد تا درد را کاهش دهد .

* مواد غذایی زیر را در رژیم غذایی خود بگنجانید : قارچ ؛ گوشت ؛ بنشن و حبوبات

* رژیم غذایی مناسب مانع از عود کمبود ویتامین تیامین می شود.



ویتامین ب ۶

نام تجاری: Pyridoxine Hcl

گروه دارویی: ویتامین محلول در آب

شکل دارویی: قرص ۴۰mg و آمپول ۱۰۰ و ۳۰۰ میلی گرم در ۲ میلی لیتر

مصرف در حاملگی: گروه A (در صورت مصرف بیش از حد؛ گروه C)

این دارو کد آنزیمی برای فعالیت های متابولیکی گوناگونی است که بر مصرف پروتئین، چربی و کربوهیدرات اثر می گذارد.

موارد مصرف: پروفیلاکسی و درمان کمبود ویتامین ب_۶ در موارد تغذیه ناکافی، کمبود ویتامین ب_۶ ناشی از مصرف داروهای نظیر ایزونیاژید و قرص های کنتراسپتیو خوراکی، همچنین جهت پیشگیری از نوریت اسپتیک ناشی از کلرامفنیکل، برای درمان مسمومیت حاد به خاطر مصرف بیش از حد سیکلوسپورین، هیدرالازین و ایزونیاژید، برای پیشگیری از تهوع و استفراغ در حاملگی

موارد منع مصرف و احتیاط: موارد منع مصرف خاصی برای این فرآورده ذکر نشده است ولی در حاملگی بایستی از مصرف دوزهای بیش از حد خودداری شود.

عوارض جانبی: پارستزی، خواب آلودگی، برافروختگی خفیف یا احساس گرما، کاهش سطح اسیدفولیک، سوزش یا درد گزشی در محل تزریق.

ویتامین ب کمپلکس

گروه دارویی: ویتامین

گروه درمانی: ویتامین

شکل دارویی: قرص، آمپول، شربت

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: ویتامین B کمپلکس برای درمان کمبودهای ویتامین B تجویز می‌شود. این کمبودها اغلب تغذیه‌ای هستند. این ویتامین کاربرد زیادی برای ورزشکارانی که عملیات ورزشی سنگین انجام می‌دهند (برای جبران انرژی از دست رفته) بسیار مفید می‌باشد. ویتامین‌های گروه B باعث کاهش استرس و افسردگی، و سلامتی پوست و اعصاب می‌گردند

عوارض جانبی: عوارض جانبی زیادی ندارد و چون محلول در آب است به راحتی قابل دفع است. حساسیت غیر طبیعی به فشار یا لمس و سفتی عضلانی در محل تزریق؛ برافروختگی عمومی، بثورات جلدی و خارش با مصرف این فرآورده مشاهده شده‌است.

توجهات: * مقدار مصرف این دارو به مقدار ویتامین‌های گروه B موجود در رژیم غذایی، وضعیت بیمار و اینکه فرآورده جهت درمان یا پیشگیری بکار می‌رود، بستگی دارد.
* قبل از تجویز این دارو، وضعیت خونسازی بیمار ارزیابی شود.
* افزایش مصرف کربوهیدراتها بدون مصرف کافی ویتامین B کمپلکس ممکن است موجب فقدان حاد و سریع ویتامین شود.

* محلول تزریقی ویتامین B کمپلکس به صورت وریدی یا عضلانی تزریق می‌شود، ولی تزریق عضلانی آن ترجیح داده می‌شود.

* باید تداخل دارویی ویتامین B کمپلکس با سایر داروهایی که بیمار مصرف می‌کند، بررسی شود.

* برای جلوگیری از عود بیماری، در طی درمان، از رژیم غذایی مناسبی استفاده کنید.

* در صورت وجود رسوب در آمپول، از مصرف آن خودداری کنید.

شرایط نگهداری آمپول و شربت را دور از نور نگهداری کنید.



ویتامین K₁

نام تجاری: Phytonadions

گروه دارویی: ویتامین محلول در چربی

اشکال دارویی: قرص، آمپول 1mg/ml و 10mg/ml

گروه مصرف در حاملگی: گروه C

این فراورده برای ساخت فاکتورهای انعقادی II و VII و IX و X که برای انعقاد طبیعی خون اساسی هستند، ضروری است.

موارد مصرف: داروی انتخابی به عنوان آنتی دوت برای مصرف بیش از حد ضد انعقادی های خوراکی است.

همچنین در درمان هیپوپروتئینمی به خاطر تجویز آنتی بیوتیک های خوراکی کنیدین، کنین، سالیسیلات ها و سولفونامیدها استفاده می شود. به عنوان پروفیلاکسی و درمان برای بیماری هموراژیک نوزادان نیز استفاده می شود.

موارد منع مصرف: در بیماران مبتلا به بیماری شدید کبد، حاملگی منع مصرف دارد.

عوارض جانبی: ناراحتی معده، سردرد، برافروختگی صورت، حرکات تشنجی، لرز، تب، تعریق مفرط، ضعف

سرگیجه، احساس فشردگی سینه، شوک، درد، هماتوم و تشکیل ندول، بثورات اریتماتوز پوستی، هیپر بیلی روبینمی، آنمی همولیتیک شدید.



هالوپریدول

نام تجاری: Haldol

گروه دارویی: بوتیروفنون ها

گروه درمانی: ضد سایکوز (اختلالات شدید روانی)

شکل دارویی: قرص و آمپول

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: اختلالات سایکوز در نوع حاد و مزمن ، اضطراب شدید در بیماری اوتیسم فعال ، در استفراغ های شدید و در دیس تونی اندام ها

میزان مصرف: ۱ تا ۵ قرص ۰,۵ میلی گرم حداکثر ۱۰۰ میلی گرم روزانه

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، در بیماران دو قطبی باعث افسردگی می شود.

عوارض جانبی: خشکی دهان ، خواب آوری ، تشنج ، آریتمی قلب

توجهات: * تزریق هالوپریدول باید به صورت عمقی و با سوزن شماره ۲۱ انجام شود. (فقط به صورت عضلانی تزریق شود).

آموزش: * از رانندگی و کارهای دقیق خودداری کنید.

* استفاده از الکل و دارو های خواب آور همزمان اجتناب شود.

* خشکی دهان از عوارض شایع است، مایعات بیشتر مصرف شود.

* بیمار باید در انجام آزمایشهای حین مصرف دارو همکاری کند.

* بیمار نباید در سرما و گرمای شدید قرار بگیرد.

شرایط نگهداری: در جای خشک و دور از نور نگهداری شود.



هپارین سدیم

نام تجاری: Liquaemin

گروه دارویی: موکوپلی ساکاراید

گروه درمانی: ضد انعقاد

شکل دارویی: تزریقی

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: پروفیلاکسی (پیشگیری) و درمان لخته های وریدی عمقی به ویژه در اندام های تحتانی، درمان آنژین قلبی ناپایدار و درمان کمکی در انفارکتوس میوکارد، تشخیص و درمان انعقاد منتشر داخل عروقی (DIC)، در خانم های باردار که سقط مکرر دارند نیز برای پیشگیری از سقط مجدد استفاده می شود.

میزان مصرف: در پیشگیری با میزان پایین دارو همراه است ۳۰۰ واحد به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، در حملات مغزی ۳ تا ۵ هزار واحد وریدی و به دنبال آن ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ واحد در هر ساعت

موارد منع مصرف: خونریزی شدید، کاهش تعداد پلاکت، در هموفیلی یا بیماری کبد ممنوع است.

عوارض جانبی: خونریزی، درد خفیف، تب، خارش

توجهات: * در مسمومیت شدید، خونریزی علامت بارزی است معمولا با قطع دارو بهبود می یابد.

* در صورت عدم بهبودی از داروی پروتامین سولفات استفاده کنید.

* تزریق وریدی هپارین بر نوع زیر جلدی یا عضلانی ارجح است.

آموزش: * در صورت خونریزی یا ضایعات جلدی (پوست) به پزشک اطلاع دهید.

* در صورت فراموشی یک وعده دارو، میزان ۲ برابر آن در وعده بعدی پرهیز کنید.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.



هیدرلازین

نام تجاری: Apresoline

گروه دارویی: گشاد کننده عروق

گروه درمانی: ضد فشار خون

شکل دارویی: قرص و آمپول

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: فشار خون بالا، نارسایی احتقانی قلب، نارسایی شدید دریچه آئورت قلب

میزان مصرف: هر ۶ ساعت یک قرص ۱۰ میلی گرمی، این میزان قابل افزایش است ولی در نارسایی قلبی از ۴۰ تا ۳۰۰ میلی گرم ۲ تا ۴ بار در روز قابل افزایش است.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، بیماری عروق کرونر و رماتیسم دریچه میترال قلب

عوارض جانبی: تهوع، استفراغ، سردرد، درد عضلانی، کهیر، خارش، اشکال تنفسی، اختلالات خونی و درد مفاصل

توجهات: * در صورت کاهش فشار خون شدید و سردی اندام ها به فکر مسمومیت دارویی باشید.
* نوع وریدی را به آهستگی تزریق کنید.

آموزش: * قرص را با غذا میل کنید.

* به علت کاهش فشار خون بیمار نباید از حالت دراز کش به طور ناگهانی بایستد.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.



هیدروکسی زین

نام تجاری: Anxanil , Atarax

گروه دارویی: آنتاگونیست گیرنده H₁ (آنتی هیستامین) از مشتقات پی پرازین

گروه درمانی: ضدخارش ، ضداضطراب ، ضداستفراغ ، آرامبخش ، آنتی اسپاسمودیک

شکل دارویی: قرص و شربت

مصرف در دوران حاملگی: گروه C (ماههای اول حاملگی: گروه X)

موارد مصرف: اضطراب، Tension ؛ هیپرکینزی ؛ خواب آور ؛ کنترل خارش ناشی از کهیر مزمن یا درماتوز اتوپیک و تماسی؛ خارش ناشی از هیستامین ؛ ضداستفراغ

موارد منع مصرف: حساسیت مفرط،، گلوکوم زاویه باز ، احتباس ادراری ؛ حمله حاد آسم

عوارض جانبی: راش ؛ خشکی دهان، تاری دید؛ واکنش افزایش حساسیت؛ تشنج در دوزهای بالا؛ احتباس ادراری

توجهات: * در صورت ایجاد واکنش افزایش حساسیت، ترمور یا تشنج، مصرف دارو باید قطع گردد

*دارو را می توان همراه با غذا تجویز کرد.

شرایط نگهداری: دارو را باید دور از نور و درجه حرارت C^o ۱۵-۳۰ نگهداری نمود.



هیدروکورتیزون یا کورتیزول

نام تجاری دارو : cortef

گروه دارویی : گلوکوکورتیکوئید - مینرالوکورتیکوئید

گروه درمانی : ضد التهاب غیر استروئیدی ؛ ایمونوساپرسیو

اشکال دارویی : قرص ؛ ویال

مصرف در دوران حاملگی : گروه C

موارد مصرف : نارسایی غده فوق کلیوی ؛ التهاب و آلرژی ؛ سرکوب کردن سیستم ایمنی، حساسیت‌های معمول مانند کهیر و آنافیلاکسی کولیت اولسراتیو و ادم مغزی نیز مؤثر است.

عوارض جانبی :

افزایش فشار خون، آکنه، پوکی استخوان، مشکلات گوارشی؛ هیپوکالمی ؛ هیپیرگلیسمی ؛ ادم ؛ پارسستی تغییرات رفتاری

توجهات : * کنترل وزن روزانه . دوز روزانه ؛ صبح مورد استفاده قرار بگیرد .

* به منظور پیشگیری از شکستگی استخوان ؛ به بیمارانی که مشکلات استخوانی دارند به هنگام حرکت کمک کنید .

* دارورانابیدناگهانی قطع کرد زیرا احتمال بروز بحران آدرنال وجود دارد .

* دارو باید تدریجی قطع گردد.

شرایط نگهداری : در درجه حرارت ۱۵-۳۰ درجه سانتی گراد و دور از نور نگهداری شود .



هیوسین آن بوتیل بروماید

نام تجاری: بوسکوپان Buscupan

گروه درمانی: آنتی کولینرژیک - آنتی اسپاسمودیک

اشکال دارویی: قرص ۱۰ میلی گرمی - آمپول ۲۰mg/ml و شیاف ۱۰ میلی گرمی

طبقه بندی مصرف در حاملگی: گروه C

این فرآورده اثر استیل کولین را روی ساختارهایی که از گیرنده های پس گانگلیونی عصب گیری می کنند نظیر عضلات صاف، قلب و غدد برون ریز مهار می کند. دوزهای زیاد دارو ممکن است تحرک و فعالیت ترشحات سیستم گوارش و تون حالب و مثانه را کاهش دهند.

موارد مصرف: برای درمان اسپاسم گوارشی یا ادراری تناسلی - قاعدگی دردناک همراه با اسپاسم - کولیک صراوی یا کلیوی - هم چنین همراه با سایر روش های تشخیصی مانند آندسکوپی معده دوازدهه هنگامی که اسپاسم وجود دارد، تجویز می شود.

موارد منع مصرف: بیماران مبتلا به گلوکوم (بدلیل احتمال بروز اثر گشاد کننده مردمک چشم)

عوارض جانبی: تاکیکاردی؛ کاهش قدرت تطابق و خشکی دهان.



هیدروکلروتیازید

نام تجاری: Esidrex

گروه دارویی: دیورتیک تیازیدی

گروه درمانی: ضد هیپرتانسیون

شکل دارویی: قرص

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: سندرم نفروتیک، گلومرولونفریت حاد و نارسایی مزمن کلیه؛ خیز ناشی از نارسایی احتقانی قلب، سیروز کبدی همراه با آسیت

موارد منع مصرف: حساسیت مفرط؛ هیپوکالمی

عوارض جانبی: کاهش فشار خون وضعیتی - کمی پتاسیم، منیزیم و سدیم خون - زیادی کلسیم خون -
زیادی اسیداوریک خون، نقرس، افزایش قند خون - لکوپنی - پانکراتیت

توجهات: * اندازه گیری فشار خون در طول درمان با این دارو در فواصل منظم ضروری است.

* احتمال بروز کمی پتاسیم خون وجود دارد (احساس ناخوشی؛ خستگی بیش از حد؛ تاکی کاردی؛ ضعف؛
کرامپ های ساق پا)

* مصرف پتاسیم اضافی در رژیم غذایی لازم باشد، بدون مشورت پزشک، رژیم غذایی نباید تغییر یابد.

* به علائم آلكالوز متابولیک نظیر خواب آلودگی و بی قراری توجه نمائید.



منابع و ماخذ :

- داروهای ژنریک ایران با اقدامات پرستاری ویرایش ۱۳۹۱ - تالیف : مرجان رسولی
- نحوه آماده سازی و ناسازگاریهای شیمیائی داروهای آنتی میکروبیال تزریقی - گردآوری و تدوین : پرستو عباسی
- درسنامه جامع داروهای رسمی ایران - طرح و تالیف اولیه : دکتر سعید شهرآز - دکتر طاهره غازیانی
- داروهای ژنریک ایران - ترجمه و تالیف محمد آبگون
- اطلاعات و کاربرد بالینی داروهای ژنریک ایران
- سایت معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قم
- <http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title> =سایت
- <http://www.zakariapharm.com/> =سایت
- <http://nursecare.blogfa.com/post>
- <http://www.darunama.com/PublicInfo>
- <http://vista.ir/article>
- Powered By: BLOGFA.COM